

B. FRANCISCI DE LE BOË, SYLVII, HANOVIENSIS,  
quondam apud Amstelodamenses Practici felicissimi, famigeratissimi; tandem  
vero Lugduni Batavorum Medicinæ Professoris publici, longeque  
celeberrimi, desideratissimi

# CASUS MEDICINALES,

Sive

## HISTORIÆ ÆGROTORUM,

Quorum curam An. 1659. 60. & 61. in Nosocomio Leydensi proprio  
Marte & Arte (i. e. remediis sibi usualibus & propriis, hicque  
in fine appositis) singularis informationis ergò  
industrius suscepit;

Quamque Curam

JOACHIMUS MERIAN, Philos. & Med. Doct. nec non pro nunc  
Phyf. Mœno - Francofurtensis Patrius Ordinarius; tum temporis autem  
Medicinæ Candidatus ex ore Præceptoris sui perpetuò venerandi  
volante calamo excepit.



can

clo

STREET

STREET

STREET

STREET

STREET

STREET

STREET

STREET

STREET

# CANDIDO BENEVOLOQUE LECTORI SALUTEM

καὶ εὐπρόσδετον!

**D**Esideras omni procul dubio Benevole Candideque Lector aliquod CASIBUS hisce MEDICINALIBUS B. SYLVII præmissum alloquium. Verùm re ipsa loquente nullis certè opus esse verborum ambagibus, in confesso est apud omnes cum nec Vinum per se vendibile hederà indigeat suspensà. Ne autem in ipso statim opusculi hujus limine Benevolum te Candidumque Lectorem insalutatum planè relinquam, paucis, quæ dicenda sunt, tibi aperiam mentem meam. B. Sylvius (Franciscus de le Boë alias dictus,) quis Natione, Stirpe, Studio, Eruditione & Professione, uno verbo: quis Vitâ denique & Morte fuerit olim, Opera ejus omnia in Belgio uno volumine comprehensa, typis mandata, inque publicam edita lucem abundè testantur. Præceptor fuit quondam meus, nunc desideratissimus, omnique honoris titulo semper & ubique nominandus, & quidem An. 1659. 60 & 61. cujus in Medicinâ per totum vitæ meæ curriculum (sint hinc laudes DEO T. O. Trino & Uni infinitæ!) nec inter vivos nec mortuos proh dolor! habui parem, multò minus superiorem. Summæ ergò & perpetuæ Gratitude in tesseram, Memoriam atque Monumentum non perituum DIARIUM hocce Ægrotorum, sive COLLEGIUM Casuale Præcticum & Medicum piis, probis atque industriis, imò VERITATEM verè amantibus Praxeos Medicæ tandem Candidatis & jam Initiatis (non autem Veterinariis, qui se super ipsum SALOMONEM sape-

re firmiter & indubitato, sed vanissimè sibi persuadentes neminem, nisi semetipsos pertinaciter & malevolè decipiunt, ) Christiano & misericordià Divinam per gratiam pleno ( absit jactantia verbis ) ex affectu & corde publicè communicare volui, debui; Omne enim Verum Bonum, quod desuper à Patre Luminum descendit, sui est communicativum! Accipe igitur Candide Benevoleque Lector hocce donum meum, ( quod certè totum B. SYLVII Opus, quamvis à se non conscriptum, est, & quidem proprium, cui ut aliquid de meo addam, vel de suo demam, mihi ut Viro Bono non licet ) qualecunque, nec aspernare, sed eo utens fruire, quàm tibi prodesse potest atque proderit semper & ubique, quàmque prædita est virtute, quam etiam ipse perpetuis extollam & commendabo laudibus; animum verò meum, proximo suo juxta DEI præcepta nullo non tempore inserviendi cupidissimum, promptissimum ( quem operis hujus fructus non contemnendus, quemque animitus & toto ex corde tibi opto, ubertim tandem propalabit, ) hisce tibi habeas quàm commendatissimum. Vale, & benè semper Age!

B. FRAN-



# B. FRANCISCI DE LE BOE, SYLVII, HANOVIENSIS, CASUS MEDICINALES,

Sive

## HISTORIÆ ÆGROTORUM.

### CASUS I.

**V**Ir quidam conquerens de ventristorminibus & febre quartanâ, assumtis frequentibus remediis melius se habuit.

- Rx. Gummi. Ammoniac. Mastich. el. ana ℥j.  
Chalyb. præp. gr. xv.  
Trochisc. albandal. ℥ss.  
Ol. dest. granor. junip. gutt. vii.  
M. & form. Pilul. No. xxx.  
De hisce assumat sæpius No. v.  
Posthæc assumsit seqq.

- Rx. Mass. Pil. fetid. maj. ℥j.  
F. pilul. No. v.  
pro una vice.  
Tandem sequ. assumsit. haustum.

- Rx. Aqu. fumar.  
Theriacal. simpl. ana. ℥ss.  
Ocul. Cancr. ℥ss.  
Syrup. quingue Rad. ℥ss.  
M. f. haustum.

### CASUS II.

**P**Uella 20. annor. hysterica passione ex flatibus à pituitâ viscidâ exortis, cum summâ viscerum alteratione & convulsione affecta à sequent. Medicamento bis assumpto convaluit.

- Rx. Aqu. petrosel.  
Fenic. ana. ℥ss.  
Spir. Vin. Redific. ℥ss.  
Acet. Stillat. ℥vj.  
Ocul. Cancr. Ppt. ℥ss.  
Antimon. Diaphor. ℥j.  
Laud. Opiat. gr. iij.  
Syrup. quingue Rad. ℥j.  
M. ad Vit. & inde sumat sæpius Cochl. j.

NB. Hæc mixtura secundâ vice iterata est.

### CASUS III.

**P**Uella laborans febre tertianâ, à sequ. haustu assumpto mox rediit ad pristinam sanitatem.

- Rx. Aqu. Card. Bened.  
Theriacal. simpl. ana. ℥ss.  
Syrup. de Fenic. ℥ss.  
Sal. Armoniac. gr. xij.  
M. pro Haustu.

### CASUS IV.

**V**etula, quæ laborabat inflammatione oculorum, præscript. est sequ. collyr.

- Rx. Aqu. Rosar. Alb. ℥ss.  
Fenic. ℥ss.  
Sief. Alb. ℥j.  
Vitriol. Alb. gr. iij.  
M. ad Vitr.

Hæc Vetula in inguine habuit etiam ulcus palmarum magnitudinem æquans, ex quo singulis mensibus effluebat sanguis; quod si verò obstruebatur illud, sanguis per alia foramina, quæ Natura sibi parabat, exiit.

Contrâ hunc affectum sequ. decoct. purg. fuit præscriptum.

- Rx. Rasur. lign. Guajac. ℥ij.  
Rad. liquorit. Ras. ℥vj.  
Baccar. Junip. ℥ss.  
Pulp. Colocynthid. ℥j.  
Cogn. f. a. in Aqu. pur. ad Colatur. ℥xxx.  
Quib. add.  
Syrup. de Sennâ ℥ij.  
M. & sumat alternis dieb. inde Haustum.

## CASUS V.

**V**iro, qui febre intermittente ex pituitosis humoribus laborabat, sequi decoctum purg. fuit præscript. de quo alternis dieb. haust. assum-  
sit.

R. Rad. apii. ʒi.

Levisic. ʒij.

Baccar. Junip. ʒi.

Sen. Anis.

Dauci. ana ʒij.

Coqu. ex Aqu. Pur. q. s. In Colatur. ʒxxxv.  
Dissolv.

Syrup. de Rhubarb. simpl.

de Sena. ana ʒiʒ.

add.

Spir. Salis reſif. ʒj.

M. ad Vitr.

## CASUS VI.

**F**œminæ, quæ de angustis circa præcordia à pituitosis humoribus & inde ortis flatib. conquerebatur, sequi mixtura præscripta fuit.

R. Aqu. Lavendul. ʒiʒ.

Theriac. simpl. ʒʒ.

Syr. de Stachad. ʒj.

M. ad Vitr.

## CASUS VII.

**P**uellæ Scrophulis affectæ sequi. Pilul. ordinatæ fuere.

R. Gum. Galban. c. acet. præp. ʒʒ.

Myrrh. Rub.

Mastic. el. ana ʒj.

Chalyb. præp.

Castor. opt.

Croc. Britannic. ana ʒʒ.

Trochisc. albandal. ʒʒ.

Resin. Jalapp. ʒj.

Ol. dest. Junip. Gutt. vi.

M. F. Pilul. No. L.

Dosis No. v. singulis vicibus.

## CASUS VIII.

**V**iro qui de summo conquerebatur æstu sequi mixtura præscripta est.

R. Aqu. Borrag. ʒiij.  
Cinamon. ʒj.  
Acet. Stillat. ʒʒ.  
Ocul. Cancr. ʒʒ.  
Antimon. diaphor. ʒj.  
Laud. Opiat. gr. iij.  
Syrup. de succ. Acetosa. ʒj.  
M. assumat coqueatim.

## CASUS IX.

**V**iro pituitosis humoribus scatenti sequi. Pilul. ordinatæ fuere.

R. Gum. Ammoniac. c. Acet. præp. ʒʒ.

Castor. Opt.

Mastic. el. ana. ʒj.

Croc. Opt. gr. vi.

Trochisc. albandal. ʒʒ.

Ol. dest. Succin. Gutt. vi.

M. F. Pilul. No. xxxv.

Assumat. altern. dieb. No. v.

## CASUS X.

**V**iro, qui flatibus & bilis acrimoniâ laborabat, cujusque massa sanguinea erat nimis ferosa, sequentes pillulæ præscriptæ fuere.

R. Gum. Ammoniac. c. Acet. præp. ʒʒ.

Mastic. el. ʒj.

Tart. Vitriolat. gr. xv.

Myrrh. rub. ʒʒ.

Croc. Britann. gr. vi.

Aloës rosat.

Resin. Jalapp. ana ʒj.

Ol. dest. Junip. Gutt. vi.

M. F. Pilul. No. xxx.

Sumat subinde iij.

## CASUS XI.

**V**iro, qui ab acrimoniâ humorum infimo in ventre vexabatur, sequi fuere præscripta.

R. Mass. Pil. de Cynogloss. ʒj.

F. Pilul. No. viii.

Assumat. subinde j. aut alter.

R. Aqu. Hyssop.

Fenic. ana ʒj.

*Tinctur. Cinamom. 3℔.*  
*Laud. Opiat. gr. ij.*  
*Syr. de Hyssop. 3vj.*  
*M. assumat coctileatim.*

## CASUS XII.

**V**iro, debilitate ventriculi, à depravato ejus fermento laboranti, sequentia fuere præscr.

*Rx. Mass. Pil. Mastich. ʒj.*  
*F. Pilul. No. v. assumet eas unâ vice.*  
*Rx. Aqu. Menth. ʒij.*  
*Tinct. Cinamom. 3℔.*  
*Elixir. proprietat. 3℔.*  
*Spir. Salis rectif. Gutt. viii.*  
*Syr. de Menth. ʒj.*  
*M. assumat sæpius cochl. j.*

## CASUS XIII.

**V**etula Angustiâ præcordiorum & tussi laboranti sequi. decoct. pectorale est ordinat.

*Rx. Rasur. lign. Guajac. ʒij.*  
*Rad. liquir. Ras. ʒj.*  
*Sem. anisi. ʒij.*  
*Coqu. ex Aqu. Pur. q. s.*  
*Colatur. 3xxv.*  
*add.*  
*Oxymel. simp.*  
*Syrup. de Hyssop. ana ʒj.*  
*M. assumat sæpius Haustulum.*

## CASUS XIV.

**P**uella affectione hypochondriacâ flatuosa, ex pituitâ viscidâ, Clar. Sylv. Melancholiâ dictâ, laboranti prout ex seqq. sign. diagnost. patebat, seqq. pillulæ sunt præscriptæ.

*Sign. Diagn.* Dolor aderat lumbor. tumor hypochondrii sinistri, malè se habebat venter; sentiebat cordis palpitacionem, à quâ liberabatur & levamen sensit; flatibus emissis; tandem corpus subinde atrollebatur cum motu membrorum convulsivo; multos emittebat ructus, & cordis anxietate premebatur.

*Rx. Gum. Sagapen. c. Acet. præp. 3℔.*  
*Castor. Opt.*  
*Mastich. el. ana ʒj.*

*Myrrh. Rub.*  
*Gbalyb. præp. ana ʒ℔.*  
*Trochisc. Albandal.*  
*Resin. Jalapp.*  
*Scammon. ana ʒj.*  
*Ol. dest. Succin. Gutt. vii.*  
*M. F. Pilul. No. xl.*  
*Assumat subinde v.*

## CASUS XV.

**M**ulier febre tertianâ laboranti præscripta est sequi. Mixtura, Cochleatim assumenda.

*Rx. Aquæ fumar. ʒij.*  
*Fenicul. ʒj.*  
*Acet. stillat. 3vj.*  
*Spir. Vin. Rectif. ʒij.*  
*Ocul. Cancr. 3℔.*  
*Syr. Papav. errat. ʒj.*  
*M. ad Vitr.*

## CASUS XVI.

**V**iro pituitosis humoribus scatenti sequi. Pilul. fuere ordinatæ.

*Rx. Gum. ammoniac. c. Acet. præp. 3℔.*  
*Mastich. el.*  
*Carabes albiss. ana ʒj.*  
*Myrrh. Rub.*  
*Croc. Britann. ana ʒ℔.*  
*Trochisc. albandal. 3℔.*  
*Resin. Jalapp. ʒj.*  
*Ol. dest. Junip. Gutt. vii.*  
*M. F. Pilul. No. xl.*  
*Def. No. v.*  
*Altern. diebus.*

## CASUS XVII.

**V**iro ascite & febre erraticâ continuâ laboranti sequi. mixt. est præscr.

*Rx. Aqu. petrosel.*  
*Fenic. ana ʒ℔.*  
*Tinct. Cinamom. 3vj.*  
*Syr. quinq. Rad. ʒj.*  
*Spir. Nitri Gutt. viii.*  
*M. assumat coctileatim.*

## CASUS XVIII.

**F**œminæ passione hysterica laboranti sequi.  
Mixt. præscripta est.

R. *Aqu. Puleg.* ℥ij.  
*Tinct. Castor.* ℥b.  
*Syr. quinque Rad.* ℥vj.  
*M. assumat cochleatim.*

## CASUS XIX.

**V**iro, qui flatib. vexabatur, sequi. Decoct.  
Carminativ. fuit præscript.

R. *Rad. Apii.*  
*Levistic. ana* ℥b.  
*Baccar. Junip.* ℥j.  
*Rasur. lign. guajac.* ℥ij.  
*Sem. Anis.*  
*Fenic. ana* ℥ij.  
*Coqu. s. a. in aqu. Pur.*  
*Q. s. ad Colatur.* ℥xxx.  
*In quibus dissolv.*  
*Syr. Mentb.* ℥ijj.  
*Spir. Vin. rectif.* ℥ij.  
*Nitr.* ℔j.  
*M. capiat subinde haustulum.*

## CASUS XX.

**V**iro, cujus humores scatebant spiritu acido, temperaturæ ergo sequi. est ordinat.

R. *Ocul. Cancr.* ℥j.  
*Terr. sigill.* ℥b.  
*Cret. Alb.*  
*Lap. hematit. ana* ℥b.  
*M. & divid. in 3. p. equal. quar. 1. sumatur*  
*manè, altera in meridie, & tertiâ sub vesperam, sed*  
*omnes c. haust. Vin.*

## CASUS XXI.

**P**ro Viro tussi laborante.

R. *Rad. Apii.*  
*Fenic. ana* ℥j.  
*Baccar. Junip.* ℥b.  
*Sem. anis.* ℥ij.  
*Rad. liquirit. Ras.* ℥b.

*Coqu. in Aqu. Pur. q. s.*  
*In Colatur. ℥xxv. Dissolv.*  
*Syrup. de hyssop. ℥ij.*  
*M. & sumat. subinde haustum.*

## CASUS XXII.

**P**ro fœminâ angustâ circa præcordia laborante.

R. *Aqu. Mentb.*  
*Fenic. ana* ℥j.  
*Tinct. Cinamom.* ℥b.  
*Laud. Opiat. gr. ij.*  
*Syr. quinque Rad.* ℥vj.  
*M. & sumat sapius cochl. j.*

## CASUS XXIII.

**P**ro fœminâ febre intermittente laborante.

R. *Aqu. fenic.* ℥j.  
*Theriaca. s.* ℥vj.  
*Antim. diaphoret.* ℥b.  
*Elix. propriet.* ℔j.  
*Syr. quinque Rad.* ℥b.  
*M. assum. cochleatim.*

## CASUS XXIV.

**P**ro muliere de flatibus in lumbis conquerente.

R. *Aqu. petrosel.*  
*Fenic. ana* ℥j.  
*Spir. Vin. rectif.* ℥b.  
*Laud. Opiat. gr. ij.*  
*Ol. dest. anis. Gutt. viii.*  
*Syr. Mentb.* ℥j.  
*M. assumat subinde cochl. j.*

## CASUS XXV.

**P**ro puella à vaporibus biliosis in lumbis vexata.

R. *Aqu. Cichor.* ℥ij.  
*Fenic.* ℥j.  
*Acet. stillat.* ℥vj.  
*Ocul. Cancr.* ℔j.

*Antimon. Diaphor. ℥℔.  
Laud. Opiat. gr. ij.  
Syrup. de Bethonic. ℥j.  
M. assumat cochleat.*

## CASUS XXVI.

**P**Ro Virgine hysterica passione affecta.

*℞. Aqu. Lavendul. ℥v.  
Theriacal. simpl.  
Tinct. Castor. ana. ℥j.  
Laud. Opiat. gr. v.  
Ol. dest. succin. ℥℔.  
M. & sumat inde sæpius Cochl. j. aut alter.*

## CASUS XXVII.

**P**Ro Virgine, quæ ex flatulentiâ & febre decumbebat.

*℞. Aqu. Mentb. ℥ij.  
Aqu. fenic. ℥j.  
Tinct. Cinamom. ℥℔.  
Spir. Nitri. Gutt. viii.  
Laud. Opiat. gr. ij.  
Syr. de Mentb. ℥j.  
M. assum. cochleatim.*

## CASUS XXVIII.

**P**Ro Viro, tussi à salis & acribus humoribus vexato.

*℞. Mass. Pil. de Cynogloss. ℥j.  
F. Pilul. No. viii.  
Sumat subinde j.*

## CASUS XXIX.

**P**Ro muliere, quæ ardore faucium cum febre continuâ laborabat.

*℞. Aqu. bord. ℥xx.  
Syrup. Violac. ℥ij.  
Spir. Salis ℥℔.  
M. assumat sæpius haustum.*

## CASUS XXX.

**V**Ir quidam conquerebatur de torminibus, tumoreque ventris & pedum; si flatus emittebat, levamen sentiebat; angustiiis circa præcordia premebatur, cum tensionibus; non poterat esse extra lectum, sed semper opus habebat decumbere. Præscripta est ipsi sequi mixtura.

*℞. Aqu. petroscl.  
Fenic. ana ℥j.  
Tinct. Cinamom. ℥℔.  
Laud. Opiat. gr. ij.  
Oculor. Cancr. ℥℔.  
Acet. stillat. ℥℔.  
Syr. de Mentb. ℥j.  
M. sumat subinde Cochl. j.*

## CASUS XXXI.

**P**Ro Viro, qui conquerebatur de tussi, à catharris exortâ.

*℞. Hord. Mundat. & ad crepatur. coct. ℥j.  
Amygd. dulc. excort. ℥ij.  
F. l. a. Emulso, ad ℥xii. cui add.  
Syr. Jujubim. ℥j.  
Subinde sumat æger haustum.*

## CASUS XXXII.

**P**Ro Viro febre imminutâ laborante.

*℞. Aqu. theriacal. simpl. ℥j.  
Fenic. ℥ij.  
Laud. Opiat. gr. iij.  
Sacch. alb. ℥j.  
Ol. dest. Anis. Gutt. xii.  
M. exacte & assumat inde sæpius æger Cochl. j.*

## CASUS XXXIII.

**P**Ro Virgine, cui sanguis ex gingivis sæpe effluebat, sequi gargarism. est præscriptus.

*℞. Rad. bifort. ℥ij.  
Fol. Salu.  
Flor. Ros. rubr. ana Mj.  
Sem. Levistic. ℥j.  
Alum. crud. ℥ij.*

*Coqu. ex Aqu. pur. add. sub fin.*  
*Acet. Vin. ʒij.*  
*In colatur. ʒxv.*  
*Dissolv.*  
*Mell. resat. colat. ʒij.*  
*M. hoc gargar. aliquantul. calefacto saepius*  
*ebuat os & gingiv.*

## C A S U S XXXIV.

**V**irgini scrophulis laboranti sequ. præscript. est  
 haust. per infer. purgans humores pituitosos,  
 solutos, & ad glandulas colli delatos.

*R. Elect. hydragog. ʒiij.*  
*Aqu. fœnic. q. s. pro haustu.*

Huic puellæ Chirurgus scrophulas sive glandulas tumefactas aperuit scalpello ferreo, quod German. dicitur *ein stierhe*, sed maluisset Cl. Sylv. ut apertæ fuissent scalpello aureo, ex quibus multum materiæ effluxit.

## C A S U S XXXV.

**P**ro Viro febre quotidianâ continuâ laborante.

*R. Rad. Levistic.*  
*Apii. ana ʒj.*  
*Rasur. lign. Guajac. ʒiij.*  
*Baccar. Junip. ʒij.*  
*Pulp. colocynthid. ʒj.*  
*Rad. Jalapp. ʒij.*  
*Coqu. s. a. in aqu. pur. ad Colatur. ʒxxx.*  
*add.*  
*Syr. de belleb. nigr. ʒiiij.*  
*Spir. Vin. rectif. ʒij.*

Cipiat sæpè haustulum, observatâ tolerantia.

## C A S U S XXXVI.

**V**iro, qui conquerebatur de Vomitibus acidorum, ructibus amarorem spirantibus, debilitate corporis, & tumore pedum, præscripta est sequ. mixt.

*R. Aqu. Menth. ʒij.*  
*Tinct. Cinamom. ʒss.*  
*Spir. Nitri. Gut. v.*

*Syr. Menth. ʒj.*  
*M. & assumatur cochlearim.*

Ab hac mixt. melius se habere incepit, quare iterata est.

## C A S U S XXXVII.

**P**ro Viro qui laborabat alvo adstrictâ, præscript. est sequ. Elect. de quo subinde sumat quantitatem nucis avellanæ vel juglandis parvæ.

*R. Conserv. Rosar. Pallidar.*  
*Pulp. Tamarindor. ana ʒj.*  
*Elect. hydragog. ʒvi.*  
*Crem. Tartar. ʒj.*  
*Misc.*

## C A S U S XXXVIII.

**V**iro, cui multa pituita viscida hærebat in intestino tenui, circa lumbos, & quam bilis immixta mutat in flatu, unde abdominis tensio; illa pituita etiam mixta sanguini, causat febrem quotidianam; in cerebro capitis dolorem gravativum; & in habitu tandem corporis pedum tumorem; præscript. est sequ. decoct.

*R. Rad. apii.*  
*Fœnic. ana ʒj.*  
*Rasur. lign. guajac. ʒiij.*  
*Pulp. colocynthid. ʒj.*  
*Passular. maj. mund. ʒiiij.*  
*Coqu. ex aqu. pur. ad Colatur. ʒxl.*  
*Quibus add.*  
*Syr. de belleb. nigr. ʒiiij.*

Misc. & de hoc sumat per aliquot dies haustulum, observatâ tolerantia.

## C A S U S XXXIX.

**P**ro Viro tussi & alvo adstrictâ laboranti sequ. decoct. est præscript.

*R. Rad. liquir. Ras. ʒss.*  
*Fœnic. ʒj.*  
*Rasur. lign. guajac. ʒij.*  
*Baccar. Junip. ʒj.*  
*Pulp. colocynthid. ʒj.*

*Coqu.*

*Coqu. in aqu. pur. q. f. ad Colatur. 3xxx.*  
*Quib. add.*  
*Syrup. de Sennâ 3ij.*

M. & capiat subinde, id est, per aliquot dies haustulum, observatâ ratione.

## CASUS XL.

PRO puero, cujus morbum, propter delirium, quo laborabat, Cl. Sylv. cognoscere non poterat, ut innotesceret, sequi præscr. est mixtura.

R. *Aqu. Bethonic. 3ij.*  
*Cinamom. 3ß.*  
*Acet. stillat. 3vi.*  
*Juleb. Rosat. 3j.*  
*M. pro haustu.*

## CASUS XLI.

PRO puellâ febre quotidianâ laborante, à pituitâ & bile in intestino tenui circa lumbos inter sese effervescentibus (quæ effervescentiâ oritur à spiritu acido pituitâ juncto cum sale lixivioso bilis) unde frigus in regione lumborum & toto corpore; dolor capitis acris in dextrâ parte (hic est à vaporibus biliosis) & tandem angustia circa præcordia; præscripta est sequi mixtura.

R. *Aqu. fenic. 3ij.*  
*Thiariacal. simpl. 3j.*  
*Acet. stillat. 3vi.*  
*Antimon. diaphor. 3ß.*  
*Syrup. quinque Rad. 3j.*  
*Laud. opiat. gr. ij.*  
*Misc. sumatur cochleatim.*

## CASUS XLII.

Vir quidam conquestus est de amarore oris; rubribus amarorem spirantibus; æstu in lumbis; ardore in excretionem fecum alvinarum & urinæ; tensione ventris, & dolore totius corporis.

Præscript. est sequi mixtura;

Quia causa est bilis peccans quantitate & qualitate (acris enim est) ut & motu, fertur enim

superius in ventriculum, ex nimia in intestinis cum pituitâ (in quâ à acidum peccat) effervescentiâ.

R. *Aqu. plantag. 3ij.*  
*Tinct. Cinamom. 3ß.*  
*Spir. Nitri Gutt. viii.*  
*Laud. Opiat. gr. ij.*  
*Syr. Acetosif. citr. 3j.*  
*M. & subinde sumat parum.*

R. *Extracto Cholagog. 3ij.*  
*Aqu. fenic. q. f.*  
*M. & f. haustus.*

Post assumpta quievit, & ab assumpto purgantem vomuit.

Iteratus est haustus purg. superius præscriptus.

R. *Aqu. Menth.*  
*Plantag. ana 3iß.*  
*Tinct. Cinamom. 3ß.*  
*Spir. Salis Gutt. xii.*  
*Syrup. myrtin. 3j.*  
*M. & utatur ea cochleatim.*

NB. Hæc mixtura ipsi præscripta est, quia conquirebatur de palpitazione hypochondriorum (à bile nimis attenuatâ) & ardore in excrementorum excretionem.

Quoad omnia symptomata, præter quod adhuc sentiat æstum in lumbis, post assumta melius habet, Præscript. est ei sequi remedi.

R. *Pulp. Tamarindor. 3ij.*  
*Elect. & succ. Rosar. 3j.*  
*Conserv. Ros. Pallid. 3iß.*  
*Cremor. Tartar. 3j.*

M. & f. Condit. de quo pro tolerantia capiat per plur. dies quantitatem nuc. avellanæ. Omnia, quæ assumpsit, rursus evomit, præter condit. ex quo leniter deponit alvum; Pulsus est parvus; Urina turbida magis, quam unquam fuit.

Continuet in assumptione conditi.

Assuescit assumptioni ciborum; Pulsus major est, ac antea fuit; Urina etiam non amplius adeo turbata; quare ipsi iterata est mixt. nuper præscripta.

Jam delirat, & reliqua omnia pejus se habent. Mortuus est.

## CASUS XLIII.

**P**RO Viro, qui conquestus est de summo frigore circa lumborum regionem in paroxysmo febrili, post ipsum autem de summis doloribus in pedibus Clar. Sylv. iudicavit id fieri à spir. acido in pituità præternaturali abundante, quare præscripti ei sequi. mixt.

R. *Aqu. Petrosel.* ℥ij.  
*Theriacal. simpl.* ℥j.  
*Syr. quinque Rad.* ʒx.  
*Laud. Opiat. gr. ij.*  
*M. assumat cochleatim.*

## CASUS XLIV.

**P**RO puellâ febre intermittente laborante.

R. *Aqu. Petrosel.* ℥ij.  
*Fenic.* ℥j.  
*Theriacal. simpl.* ʒ℥.  
*Ocul. Cancr.* ʒj.  
*Antimon. Diaphor. gr. xv.*  
*Laud. Opiat. gr. ij.*  
*Syr. quinque Rad.* ʒvi.  
*M. & assumat cochleatim.*

## CASUS XLV.

**V**IRO, qui 4. Decembr. summè incallescens bibit haustum frigidæ, unde sensit paroxysmum febrilem, cum summo frigore in lumbis; nunc autem conqueritur de dolore pectoris cujus causam iudicavit Cl. Sylv. esse pituitam; quare ei præscriptum est sequi. remedium. 6. Dec.

R. *Rad. fenic.*  
*Apil. ana* ʒj.  
*Rasur. lign. Guajac.* ʒijj.  
*Baccar. Junip.* ʒij.  
*Sem. Anis.*  
*Dauci. ana* ʒij.  
*Passular. Maj. mund.* ʒij.  
*Coqu. s. a. in aqu. pur. ad Colatur.* ʒxl.  
*Hisce add.*  
*Syr. de Sennâ.* ʒijj.

M. de hoc assumat sæpius (pro tolerantia tamē) haustum.

R. *Trochisc. beccicor.* Alb. ʒij.  
*d. ad Chart.*

*Sigu. Brust und Husten Röchlein.*  
*Horum sumat subinde j. aut alter.*

Hic æger conqueritur ulterius de dolore pun-  
 gente in extremitate pedum, forsitan ab humoribus vel vaporibus acribus propter laborem impeditum ibi hærentibus, quare ipsi præscript. est sequi. pedilavium.

R. *Rad. Alb.* ʒij.  
*Fol. Malv.*  
*Verbasc.*  
*Violar. ana* Mij.  
*Sem. lin.*  
*Fenugrac. ana* ʒj.

Concisa & contusa coqu. in aqu. q. f. cui ca-  
 lesfactæ semper impon. pedes manè & vesperi.  
 Ad tussim utatur sequi.

R. *Sacch. Alb.* ʒj.  
*D. ad Chart.*

R. *Mass. Pil. de Cynogloss.* ʒ℥.  
*E. Pilul. No. xii.*

Har. j. assumat subinde, ad contemperandum  
 & educendum acres humores.  
 Levamen habet ex pedilavio.  
 Cum à superius præscr. purgante ritè non fue-  
 rit purgatus, sed tantum semel aut bis, idèd a-  
 liud ordinat. est.

R. *Elect. Hydragog.* ʒijj.  
*Aqu. Hyssop. q. s. pro haustu, quem altero die*  
*manè sumit.*

Cum posthæc incaluisse, ob defectum cerevi-  
 tiæ aquam bibit, quare nunc tam de tussi, quam  
 de dolore laterum conqueritur; Assumit pur-  
 gans & excrevit phlegmata; febris vaga est, nul-  
 lum planè saporem perferit in ore. Causa est a-  
 quæ frigidæ potus, unde, dum per œsophagum de-  
 scendit, asperam arteriam, arteriam magnam,  
 venam cavam & azygos dictam potest afficere,  
 unde dolores laterum, tussis &c. deinde in ven-  
 triculo alia incommoda potest generare.

Conqueritur de dolore in pectore, non pul-  
 monibus.

Non est Pleuritis vera, quia non tam gravia ha-  
 bet symptomata, quæ ad pleuritidem veram re-  
 quiruntur, est autem notha, ab inflammatione  
 pectoris; pituita enim soluta à potu frigido po-  
 test



stea hærebat, hinc obstructio, vasor. ruptio & inflammatio.

Hinc Cl. Sylv. conclusit ægrum abundare sanguine pituitoso, qui mali causa est; quod potest probari ex eo, 1. quòd nullum planè saporem sentiat in ore, 2. ex phlegmate expectorato, ut & 3. aliis symptomatibus ritè penitatis.

In tali casu in principio statim valet sudoriferum; nunc autem dissolvens, incidens & acrimoniam temperans, & est illud, quod superius est præscript. Ab hoc assumpto semel deiecit, & aliquantò melius habuit; phlegmata spumosa, tussis causam expectoravit; Pulsus melior est. A duodecim cochli. decocti purgatis 8. Dec. præscript. vehementissimè purgatus est; febris est levior; commodius respirat; tussis verò adhuc urget.

R. *Mass. Pil. de Cynogloss.* ʒj.

F. *Pil. No. VIII. assumat subindò j. & alter.*

In omnibus sentit levamen.

Iteretur apozema pectoral. 6. Dec. præscr.

Iterentur etiam pilul. de Cynogl. & trochisc. pectoral.

15. Dec. Alvi feces duriore fuere, segnè enim erat in assumt. medicamento.

16. Dec. Humores in hoc ægro Cl. Sylv. dicebat esse valde compactos, & quamvis tussiat, tamen id non fit cum tantà difficultate, ut antea. Iteratus est hauustus hydragog. cum trochisc. bechic.

17. Dec. Iterat. est apoz. pectoralè purg. 6. ejusd. præscr.

18. Dec. A purgante debilis est, & hodiè manè frigus sensit, calor. haud molestus est; evomuit etiam.

21. Dec. Tussis adhuc est gravis, & dolor circa pectus. Iterati sunt troch. bechic.

24. Dec. Iteretur apozema pectorale purg. 6. Dec. præscript.

27. 28. Dec. Iteretur apozema prædict.

29. Dec. A medicamento levamen habet, & jam restitutus est.

31. Jan. Indies melius se habet.

## CASUS XLVI.

PRO Viro, qui conquestus est de hæmorrhoidibus tumefactis in ano, ab acrimoniâ fecum, præscriptum est sequ. linim.

R. *Ungu. Populeon.* ʒvj.

*Eoli Armen.* ʒj.

*Opii. c. Ol. Rosar. q. s. dissolut.* ʒß.

*M. f. linim.*

## CASUS XLVII.

VIro, qui sensit nuper insultum Epilepticum, præscripta est sequ. mixt.

R. *Aqu. fl. tilia.* ʒij.

*Theriacal. simp.* ʒß.

*Tinct. Cinamon.* ʒvi.

*Syr. sacchar.* ʒj.

*M. assumat eam coeleatim.*

Ab hac mixt. assumpta melius se habet, quare iterata est.

## CASUS XLVIII.

VIro, qui conquerebatur de pruritu in toto corpore a vaporibus biliosis acribus; & stupore (id est, dolore formicante) in inguine & femore, ab humoribus pituitosis, nervos comprimentibus,

Ad prurit. præscript. est sequ. sudorifer.

R. *Theriac. Androm. Veter.* ʒj.

*Antimon. Diaphor. gr. viii.*

*Syr. quinque Rad.* ʒß.

*Aqu. sanic. q. s. ad haust.* Misc.

Ad stupor. autem sequ. linim.

R. *Ungu. Martiat.* ʒij.

*Ol. Iumbrie. terr. Nardin. ana* ʒij.

*Def. succin.* ʒj.

*M. f. limiment. ad Ollam.*

## CASUS XLIX.

VIro, qui conquerebatur de alvo adstrictâ à febribus induratis; sequ. est præscript. Condit.

R. *Pulpa Tamarind.* ʒj.

*Elect. & succ. Rosar.* ʒß.

*Crem. Tartar.* ʒj.

*Conserv. Ros. Pallid.* ʒvj.

*M. f. condit. de quo aliquoties sumat quantitat. magnitudine nuc. Jugland.*

b-3,

CA

## CASUS L.

**V**iro, qui utinam reddebat cum ardore, & sentiebat dolorem in pene, præscripta est sequi. Mixtura.

℞. *Hord. Mundat. & ad crepatur. Coll. ʒij.*

*Sem. Melon.*

*Cucum.*

*Papav. alb. ana. ʒij.*

*F. Emuls. ad. ʒxv.*

*quibus add.*

*Syrup. de Alib. Fernel. ʒiʒ.*

*M. & de hac subinde sumat haustulum.*

Hic ægro, cum scateret etiam humoribus viscidis præscript. est sequi. Mixt.

℞. *Rasur. lign. guajac. ʒiij.*

*Rad. liquir. Raf. ʒxj.*

*Apii. ʒiʒ.*

*Baccar. Junip. ʒij.*

*F. Decoct. in aqu. pur. in Colat. ʒxl. dissolv.*

*Syr. de quinque Rad.*

*Sennâ simpl. ana. ʒij.*

*M. & sumat subinde haust.*

Hic æger 8. Dec. accessit, & à calore furni difficultatem in respiratione contraxit ante 12. annos; jam magis affligitur hyeme quàm æstate, vel alio tempore; sitit & à potu venter distenditur, ut & à cibo calido; à flatibus emissis melius habet, non est nauseabundus nec noctu solebat dormire, nunc autem satis dormit. Post calorem à furno potum frigidum sumsit, & sitim non potuit sedare, hinc tussis cum anxietate pectoris; ab eo tempore coactus erat opus pistorium deferere. In continuitate ab asthma differt, non vomitu. Nuper à tussi hæmorrhagiæ narium laboravit; ante 15. dies pedes & facies turgabant tumore leucophlegmatico; ante aliquod tempus multum sanguinis excrevit. Tussis sicca est ut plurimum, aëre verò humido phlegmata excernit majore cum levamine, à tussi autem sicca defatigatur.

Materia in pulmonem debet esse substantia, nam licet in asperâ arteriâ ab aëre expirato & inspirato deberet excerni, si in venis aut arteriis hæreret, inflammationem pareret, cum verò est in substantiâ, nec sanguinis motus obstat, nec excerni potest & cum perpetuo irritat, hinc tussis continua; cum phlegmata evacuat, est à peculiari causâ, cum

igitur in vitæ genere alimentis pituitosis usus est, & solebat modò frigus, modò calorem pati; & cum natura hujus regionis (Belgii scil.) est, ut pituitam generet, hinc ægrum his de causis pituitâ abundare putat Cl. Sylvius, quæ à calore furni soluta per vasa lactea sanguini admixta est, tunc à potu frigido in substantiam pulmonum & in pectus delata est materia, unde causa mali; quòd pituita abundat, ex symptomatibus & ægri querelis probari potest. Omnes in corpore nostro humores sunt ab alimentis & Aëre (ex quo sal in abundantia hauriri potest,) sed non ratione materiæ efficientis, ergo fermentum proprium debet addi, quod fermentum ortum habet à glandulis, & cum salivâ ad ventriculum deferitur; hinc diversitas humorum ab eodem alimento peti debet quatenus fermentum diversas partes educit in diversis hominibus. Calor ad fermentationem est causa adjuvans, sed non primaria, nam omnis fermentatio potest fieri levissimo calore; quicquid de spiritibus in corpore dicimus, per ratiocinationem habemus. Massa panis æstate unico tantum linteo tegi debet, ne amarescat, & nimium fermentetur; hyeme verò multis, & ad ignem servari. Calor potest penetrare, ubi spiritus non potest, propterea in destillatione Spiritus Vini patet, ubi calor per vas penetrat, Spiritibus manentibus.

Decuplo plus crassioris pituitæ est in intestinis, quàm in ventriculo.

Æger non sentit distensionem ab alimentis siccis, sed ab humidis, unde pituita solvitur; & bilis in eam agens status causat.

Calculus in vasis non totâ substantia, sed soliditate & secundum qualitatem peccat.

Consultum est, initium facere à leucophlegmatia curatione per purgans.

℞. *Elect. Hydragog. ʒij.*

*Aq. Hyssop. q. s.*

*M. & f. haustus, quem assumat cras mane.*

9. Dec. Lingua semper arida & aspera est.

Sexies & quidem commodè à purg. assumto deicit, ubi quiescit lingua, siccior est; ubi aulem movetur, tum copiosior saliva adest exceptis iis, in quibus Saliva viscidior, tum magis desit.

Iteretur haustus purg. 8. Dec. præscr. ex Elect. hydrogog. &c.

10. Dec. Commodè purgatus est & multos flatum emisit; in reliquis fere in eodem statu est.

℞. *Aq. Petrosel.*

*Fenic. ana. ʒiʒ.*

*Tinâ.*

*Tind. Cinamom.* ʒß.  
*Elix. Propr.* ʒß.  
*Syr. Capill. Vener.* ʒj.  
*M. Subinde sumat Cochli.*

11. Dec. Lancementes & puncturas in Virgâ sentit, iam ab 8. Septimanis malum per vices recurrit; urina acris esse videtur, conducit hic emulsiô seq.

ʔ. *Hord. ad crepat.*  
*Coct.* ʒj.  
*Sem. Melon.*  
*Gutum.*  
*Papav. alb. ana.* ʒij.  
*E. l. a. Emuls. ad.* ʒxv.  
*Add. in fin.*  
*Syr. de Altb. Fern.* ʒj.  
*Aq. Fœnic.* ʒiß.  
*M. Capiat inde sæpius haustul.*

13. Dec. Phlegmata non rejicit; lingua ipsi sicca esse videtur, quamvis non sit, nam tactu humida est, & valde calet sive ardet.

Siccitas visibilis à bile semper ortum habet. Quando Humores viscidii peccant, purgantibus incidentia attenuantia & præparantia sunt adjungenda.

ʔ. *Rasur. Lign. Guajac.* ʒijj.  
*Rad. liquirit. Ras.* ʒijj.  
*Apii.* ʒiß.  
*Baccar. Junip.* ʒij.  
*Pulp. Colocynthid.* ʒj.  
*Ocul. Cancr.* ʒij.  
*M. f. Decoct. in aq. pur.*  
*ad Colatur.* ʒxi.  
*Tandem add.*  
*Syr. quinque Rad.*  
*De Senn. ana.* ʒij.  
*De hoc subinde sumat haustulum.*

14. Dec. Aliquoties & quidem cum levamine blandè deiecit, ideoque continuet Medicamentum quod habet.

15. Dec. Satis commodè se habet, continuabit Medicamentum.

17. Dec. In meliore statu est.

18. Dec. Iteretur Decoct. 13. præscr.

20. Dec. habet adhuc decoctum, de quo sumat.

21. Dec. Scrotum ipsi valde tumefactum est,

ʔ. *Flor. Sambuc.*  
*Fol. Chamemill. Rom.*  
*Summit. Melilot. ana.* M. j.

*Flor. alth.*  
*Fol. Majoran. ana.* Miß.  
*Sem. anis.*

*Cumina. ana.* ʒß.  
*Concis. & crasse confusa d. ad chart. coquend.*  
*in cerevis. & calidè applic. pudendis.*

22. Dec. Magis anhelat quàm heri; ob respirationem anhelosam.

ʔ. *Aq. Fœnic.*  
*Hyssop. ana.* ʒiß.  
*Spir. Vin. rectif.* ʒß.  
*Acet. Stillat.* ʒvj.  
*Ocul. Cancr.* ʒß.  
*Antimon. Diaphor.* ʒj.  
*M. assumat. Cochleatim.*

24. Dec. Scrotum habet adhuc tumefactum & quidem aquâ plenum, durities autem tumoris evanuit; propter contorsionem virgæ molestiam habet in reddenda urinâ.

ʔ. *Cort. Rad. Ebul. Levistic. ana.* ʒß.  
*Rasur. lign. Guaj.* ʒij.  
*Baccar. Junip.* ʒiß.  
*Sem. Urtic. Rom.* ʒijj.  
*Pulv. Rad. Jalap.* ʒiß.  
*Coq. f. a. ex aqu. pur. ad Colat.* ʒxxx.  
*add.*  
*Syrup. de Helleb. Nigr.* ʒiß.  
*Spir. Salis rectif.* ʒj.  
*Vin. red.* ʒij.  
*M. sumat subinde haustulum.*

Iteretur etiam Mixt. 22. Dec. præscr.

27. Dec. Non quievit per 6. aut 7. noctes; alvus manet adstricta, & scrotum adhuc tumet.

ʔ. *Mithridat. Dam.*  
*Philon. Rom. ana.* ʒj.  
*Syr. papav. errat.* ʒj.  
*Aq. Fœnic.*  
*Petrosel. ana.* ʒiß.  
*M. Sumat Cochleatim.*

ʔ. *Eleß. Hydragog.* ʒijj.  
*Aq. Petrosel.*  
*q. f. p. Haust.*

29. Dec. Bis deiecit; Angustiam circa pectus sentit.

ʔ. *Aq. Hyssop.* ʒij.  
*Fœnic.* ʒj.

*Acet. dest. 3vj.**Tind. Cinamom. 3iij.**Ocul. Canc.**Antimon. Diaph. ana. 3ß.**Syrup. quinquæ Rad. 3j.**M. sumat Cochleatim.*

30. Dec. In pejus ruit, appetitus prostratus est, & sentit dolorem pungentem in pedibus.

*R. Aq. Menth. 3iß.**Fenic. 3j.**Tind. Cinamom. 3ß.**Elix. Propriet. 3ß.**Syr. de Menth. 3j.**M. assum. Cochleat.*

5. Jan. sequ. anni parum levaminis habuit à Medicamento.

Sensim perit. Iteretur mixtura nuperrimè præscr. scil. 30. Dec.

13. Jan. Mediocriter valet, iteretur decoct.

24. Dec. præscr.

14. Jan. In pessimo vivit statu. Iteretur decoct. 24. Dec. præscr.

## C A S U S L I.

**V**Ir quidam alias navans operam in erueendis cespitibus ex aquâ, ante biennium ex gravi animi mœroe in humeris & brachiis, quasi aqua frigida per illas partes esset effusa, dolores sensit, unde tremor in artubus superioribus, qui tantus, ut illos non possit continere, quem tractio partium nervosarum in cervice secuta est, unde malum hoc capiti, ut vix à delirio immunis, communicatum est. Appetitus satis urget, & appetitu urgente, nî cibum statim sumat, pejus se habet, & ita angitur, ut si ei non succurrant, in Lypothymiam incidat: Manè jejuno ventriculo fauces quasi strangulari sentit, in lumbis dolor urget, qui per totum corpus dispergitur, & nonnunquam tantus, ut quò se vertat, nesciat; ructus & flatus emittit, aliquando per superiora & inferiora, hisque emissis levamen sentit; partes corporis magis tument, quam debent, & inprimis tumor in cruribus notabilis circa vesperam notatur, & hæc symptomata, (excepto tremore partium corporis, qui continuus est) per intervalla recurrunt.

Frigus nunc primum observat, & quidem in manu dextra, accedente calore melius se habet; dolor capitis ipsum infestat, in paroxysmo si de-

cumbat in latere & lumbis talem sentit dolorem, ut adstantes eum erigere cogantur; nec benè sedere nec decumbere potest, quin circa ventriculum angatur; artus debiles sunt & mox stare, mox autem sedere cogitur. Gravius malum metuens Medici auxilium implorat.

Consultum tum temporis fuit, quia sal austerrus & lixiviosus in bile peccat, unde tumor & motus convulsivus, ut seq. modo curaretur; 1. Per alterantia & evacuantia; & quidem sale volat. abundantia Medicamenta, quæ optima in hoc morbo,

## C A S U S L I I.

2. Jan. **V**Ir epilepticus & hydropicus accessit, ejus membra contrahuntur, convulsivos motus, imò convulsiones per totum corpus sentit, sunt quasi pulsationes vagæ; dolor capitis adest; tres paroxysmos non meminit, quarti verò memor est, jam verò adeò vehementes sunt, ut vix à 4. vel 5. viris contineri possit; Non vera & legitima est Epilepsia, sed spuria, quia adhuc mens quodammodo constat; vix enim ullam molestiam ægri sentiunt in Epilepsiâ (verâ) præter gravitatem capitis.

Quia mens constitit, signum est, insultum fuisse leviorum.

In Epilepticis tandem omnes actiones animales, præprimis ratio turbatur & depravatur; in illo etiam est mentis consternatio.

In Epilepsiâ & convulsio & motus convulsivus concurrunt, prima vice non sentit malum adventans; postremis vicibus semper prævenit, ne caderet, nunc semper coactus est decumbere, cum correptus hoc modo fuerit, mens per triiduum ad se non rediit, & sine loquelâ fuit; per tres alios dies dolorem ventris passus est, & per 4. septimanas principium hydropis sensit, sed crura olim magis tumida fuere, quam nunc.

NB. Clar. Syl. habuit sub curâ Epilepticum, qui per 10. dies cæcus fuit.

Dolor etiam in lumbis adest, sed non adeò gravis, & motum circa carpum sentit, qui convulsivus motus incipit à sinistro brachio, & inde ad dextrum transit.

Probabile est, malum ab humore acri ortum habere, & cerebrum & motum animalium spirituum lædi.

Facies hujus ægri leucophlegmatica est.

R. *Aqu. Flor. Tilia.* ℥ij.  
*Theriacal. simpl.* ℥vi.  
*Antimon. diaphor.* ℥ij.  
*Syr. fl. pæon.* ℥ij.  
*M. sumat cochleatim.*

2. Jan. Cochlearia aliquot mixtur. heri assumfit, & benè quievit, sed considerabilem dolorem in regione lumbari observavit, qui pergit ad dextrum hypochondrium, ac si perfoderetur pars & instar clavi transfossi pungit.

Heri demum cepit dolor.

Duobus malis affligitur, uno continuo, hydropes scil. & altero subinde recurrente, Epileps. namque. Heri paroxysm. quidem habuit, epileptib. facies pallida est, venter & pedes tument.

Epilepticæ alias nullum sentiunt dolorem, gravitatem autem capitis, & motum convulsivum, qui est motus inordinatus.

Hic æger sentit aliquid moveri in toto corpore, aliquando in cruribus, aliquando in brachiis, mox in ventre cum dolore lancinante, jam circa scapulam sinistram, quia igitur iste motus non est continuus, probabile est, neque materiam sive causam esse continuam.

In omni motu convulsivo fit nimius spirituum animalium motus.

Nervus compunctus, ubi ex infusione therib. c. spir. Vin. non curatur, amputandus est.

In motu inordinato spirituum modò in hanc, modò in aliampartem concutiuntur, & tunc equidem sunt rigide.

Corpus ægri pituitosum est, & acre & volatile quid peccat in hoc affectu, subitæ autem mutationes istæ spiritui acido debentur: & si feratur materia peccans ad cerebrum, facillimè una pars magis affici potest, quam altera.

Musculus nunquam versus suum principium trahitur, sed expanditur in latum, & corrugatur in longum.

Omnia medicamenta, quæ ad acidum concentrant, hic profunt, ut creta, lap. hæmatit. & sal vol. quæcunque, confert etiam unum magis, quam alterum.

R. *Aqu. fl. tilia.*  
*Fenic. ana* ℥i℥.  
*Theriacal. simpl.* ℥ij.  
*Lap. Hamatit.*  
*Cret. Alb. ana* ℥j.  
*Syr. Flor. pæon.* ℥ij.  
*M. assum. cochleat.*

Hodiè quidem initia paroxysmi sensit, sed mox cessarunt; habet adhuc lancinationes, sed non

tam vehementes & graves; quoad dolores levamen sensit jam in uno brachio, paroxysmum habuit, qui levior tamen fuit.

Dimidium medicamentorum evomit, perseverandum potius in medicamentis est, quam mutandum, quia melius se habet; per biduum non deiecit.

Iteretur mixtura heri præscripta, scil.

R. *Elect. Hydragog.* ℥ij.  
*Aqu. fenic.* ℥i℥.  
*M. assumat.*

Bis hodiè à purgante deiecit, unde defatigatus vomuit amara, dolores lumborum plerique sublati, & dolores vagi sunt mitiores; subinde vomit ab eo tempore, quo paroxysmus invasit, ventriculus hic laborat, qui vomitionis & nausæ causa, sed per consensum intestini.

8. Jan. Bene se habet, omnia symptomata sunt & manent leviora, sed respiratio fit cum sonitu.

10. Jan. Pedes ægroti jam minus tument; nullas amplius lancinationes nec paroxysmum sentit, in præcordiis autem sentit palpitationes.

Naturaliter omnes partes laxæ sunt, nec congestiuntur.

13. Jan. Omnia quæ assumit, evomit, imprimis quæ bibit; saporem admodum ingratum habet in ore, quem explicare non potest; per vomitum phlegmata ejicit & viridia; nihil potest comedere, dolores aliquos in ventre tensionum adinstar sentit.

Multis in vomitionibus spontaneis emetica exhibita vomitiones istas compescunt, quia causa earum tollitur sufficienter, cum vires non raro ab humoribus pravis oppressæ sunt, quare eis eductis sublevantur.

Multi epileptici ex levi purgatione per alvum facillimè patiuntur insultus epilepticos; cum per vomitoria malum sæpè fuerit sublatum. Abhorrent autem omnes vomitantes & nauseabundi sicca, eaque difficulter assument, valentius autem liquida.

Vitrum antimon. hic præstat.

Hydropicor. aliàs non est proprium vomere.

Mixtum medicamentum potest exhiberi cum tinct. cinamom. quæ corroborat, & temperat humor. effervescentiam, & concentrat spir. accidum.

R. *Oxymell. vomit.* ℥ij.  
*Elect. Hydragog.* ℥i℥.  
*Tinct. Cinamom.* ℥j.  
*Aqu. fenic. q. f.*  
*M. assumat uno haustu.*

14. Jan. Hodie manē suum sumsit medicamentum emetpurg. unde semel quidem leviter vomuit amara; quamvis vero in somnum inclinat, non tamen potest dormire, & semper expergiscitur.

Per integr. septiman. nullum medicamentum assumfit.

15. Jan. Subinde lincinationes sentit per totum corpus, modò in unā parte modò in alterā, non tamen graves sunt, ut ante; semel dejecit; assumto aliquo liquido cum inclinat in somnum, perhorrescit, & cubiculum plenum uvulis parvis esse putat, agnoscit tamen suam mentis hallucinationem, lingua arida est; æstus vehemens in faucibus, pulsus debilis, convulsionēs verò nullas sentit.

### C A S U S LIII.

27. Dec. **V**Ir quidam ante octiduum incidit in febrem magno cum frigore; appetitus nullus; vires & pulsus valde debiles; nil dejecit, & alvus semper manet adstricta; dolor per totum corpus sparsus, non sitit, jam non febricitat.

Confusio humorum hic peccat, nam ita permixti sunt, ut neuter dominium habeat propter intricationem.

Præparandi igitur sunt & liberandi per medicamenta mixta, usque dum descendamus in cognitionem ejus quod ulterius est faciendum.

℞. *Aqu. petrosel.* ℥ij.  
*Theriacal. simpl.* ℥ss.

*Acet. stillat.* ℥vj.

*Ocul. Cancr.* ℥j.

*Antimon. diaphor.* ℥j.

*Laud. Opiat. gr. ij.*

*Syr. quinque Rad.* ℥j.

*M. & assum. cochleat.*

℞. *Elect. hydragog.* ℥iiss.

*Aqu. Mentb. q. s. pro haust.* M.

*Cras manē eundem assumat.*

18. Dec. Dolores sunt diminuti, sed non dejecit.

℞. *Elect. Hydragog.* ℥iij.

*Aqu. fœnic. q. s.*

*M. s. haustus.*

19. Dec. Quater dejecit, & levamen habet, tussis gravis est, sed phlegmata viscida excernit.

30. Dec. Omnia ad meliorem frugem se convertere videntur.

3. Jan. sequ. anni. De dolore corrosivo plantar. pedum & brachiorum, ut & de lassitudine earundem partium conqueritur; in omnibus alias levamen sentit; febris eum planē reliquit.

NB. In tali casu sudores non sunt negligendi, sed probè observandi, inprimis quia & febricula juncta, & partes ab aëre externo affectæ sunt, quapropter brevi curari possunt.

℞. *Aqu. fumar.* ℥ij.

*fœnic.* ℥j.

*Theriacal. simpl.* ℥vj.

*Acet. stillat.* ℥j.

*Ocul. Cancr.* ℥ij.

*Antimon. diaph.* ℥ss.

*Laud. Opiat. gr. iij.*

*Syr. quinque Rad.* ℥j.

*M. & assum. cochleat.*

4. Jan. Levamen in omnibus sentit post sudorem.

5. Jan. Quia mixtura admodum profuit, iteretur.

7. Jan. Convalescit magis & magis.

8. Jan. Benè valet.

### C A S U S LIV.

2. Dec. **V**Ir quidam hac nocte circa hor. tert. paroxysm. febrilem sensit, cum frigore in lumbis; manē amara & viscida evomuit; quæ materia, quia viscida, bilem quasi ligavit, unde effervescentia.

℞. *Aqu. fœnic.*

*Petrosel. ana* ℥j.

*Acet. stillat.* ℥vj.

*Tinct. Cinam.* ℥ij.

*Antimon. diaph.*

*Ocul. Cancr. ana* ℥j.

*Syr. quinque Rad.* ℥j.

*M. assum. cochleat.*

4. Dec. Sensit rursus febrem; valde sitit; & intolerabilem in pede percipit dolorem; per biduum non dejecit, cum solebat quater vel quinque in die dejicere; venter induratus, & sanguis e naribus fluit.

℞. *Elect. Hydragog.* ℥iiss.

*Aqu. fœnic. q. s. pro haust.*

6. Dec. Eodem tempore, quo paroxysmum habuit, crux tumuit; dolor capitis urget, ut & tussis; heri habuit paroxysm. rigiditas in collo est, unde metu it tussire, quamvis tussis urgeat; magis affluit ad crus, & hoc plus sanguinis potest recipere. Et cum fibræ, quæ debent per venas reductum adjuvare, debiliter agunt, hinc hærent humores.

NB. Erysipelas revera à sero ortum habet.

Iteretur mixt. 2. Dec. præscr.

7. Dec. Paroxysmum mitiorem habuit.

9. Dec. Iteretur mixt. 2. Dec. præscr.

10. Dec. Alvus obstructa est, feces indurate sunt, nec excerni possunt; febrem non sensit.

R. *Pulp. Tamarind. ʒj.*

*Elect. d. succ. Rosar. ʒss.*

*Crem. Tartari ʒj.*

*Conserv. Rosar. pallid. ʒss.*

*M. f. condit.*

Hac vespërâ assumat ad quantit. nuc. mosch. si inde non dejicit, cras manè eandem dosin assumat.

11. Dec. Leve frigus sensit, de difficultate peccatoris conqueritur; dejecit.

R. *Aqu. Hyssop. ʒij.*

*Fenic. ʒj.*

*Acet. stillat. ʒvi.*

*Ocul. Caner. ʒss.*

*Antim. diaph. ʒj.*

*Syr. quinque Rad. ʒj.*

*M. assum. cochleat.*

R. *Trochisc. beccbic. alb. ʒij.*

*Sumat sæpius j. aut alterum.*

13. Dec. Sensit paroxysm. circa 3. pomeridianam, sed levem.

R. *Aqu. fenic. ʒss.*

*Tinct. Cinamom. ʒj.*

*Spir. Salis. Gutt. v.*

*Syr. quinque Rad. ʒss.*

*M. pro haust.*

14. Dec. Circa hor. 3. hæc nocte habuit paroxysm. calor non fuit gravis, nec sitis; continuum frigus in lumbis sentit, alias levamen habet.

Iteretur mixt. heri præscr.

R. *Elect. Hydragog. ʒij.*

*Aqu. fenic. g. f.*

*M. pro haust.*

NB. Longè præstant El. hydr. ʒij. quam ʒvi.  
15. Dec. Febricitavit, non vomuit nec dejecit.

Iteretur haust. heri præscr.

16. Dec. Non habuit paroxysm. sed de molestia & dolore in pectore conqueritur.

Iteretur mixtur. 13. Dec. præscripta.

## CASUS LV.

30. Nov. **V**ir quidam accessit, per 4. annos valetudinarius, laborat enim febre per 6. jam septimanas, frigus continuè lumbos urgens sensit & in abdomine, dolor totius corporis, capitis præcipuè, alvus satis laxa, appetitus manet adhuc aliquantum dejectior, à potu frigus in lumbis augetur. Pulsus frequentior; non statim temporibus recurrit frigus, sed continuè urget, nec augetur, nisi ab externâ causâ, igne, vel frigore, vel potu. Febricitavit autem febre algida Cl. Sylvio dictâ, pituitosâ & viscidâ, (à mali diuturnitate) & abdominis tensione.

Facies ejus est pallida, & capitis dolor gravativus atque continuus, quæ omnia pituitam viscidam designant; pituita statulentâ visciditate non abundat, nec bilis valde acris est, ut agat alias majori copiâ status generarentur. Morbus diu duravit, aded ut totus sanguis & habitus corporis pituitosus sit.

Spes autem curationis est, cum vires adhuc maneant, & appetitus non planè prostratus, alvunque laxa; & quod planè practicum est, nihil adhuc adhibuit, nam ubi medicamenta applicantur sine levamine, minus spei est. Quia humor hic continuè movetur, & totus sanguis inficitur, mixturam aliquam vel decoctum debet assumere, ad alterandum; cum copiâ peccat, diminui debet ille humor; tulit etiam & phlegmata varii coloris excernit.

R. *Rad. Apii.*

*Fenic. ana ʒj.*

*Rasur. lign. Guajac. ʒij.*

*Pulpa colocynthid. ʒj.*

*Passular. Maj. Mundat. ʒiiij.*

*Coqu. ex Aqu. pur.*

*ad Colat. ʒx.*

*M. sumatur haustus semel in die.*

R. *Aqu. Ment. ʒij.*

*Fenic. ʒj.*

*Tinct. Cinamom. ʒvj.*

*Syr. quinque Rad. ʒj.*

*M. subinde sumat cochl. j.*

1. Dec. Bis deiecit & quidem non magnâ quantitate, & aquosa ferè fuere excrementa.

Habet tumores in collo & maxillis, est signum affectuum glandular. quæ raro ad suppurationem veniunt, sensim enim minuuntur tales tumores sub axillis, tales etiam in brachiis observantur.

Vidit Cl. Sylv. ablatum scrophulum instar ossis, varii enim sunt gradus scrophulorum.

Quia affectus adscribuntur mesenterio & omento, omnes sunt affectus glandularum.

Hic æger cum dicit, se per quadriennium malè habuisse, & tumores etiam, tunc ab eadem causâ, nempe materiâ viscidâ dependet malum.

Non putat Cl. Sylv. spiritum acidum in hoc corpore esse acrem, sed coagulantem esse opinatur.

Perseverantia affectus probat materiam viscidam adeste.

Sæpè etiam dolor in glandulis est intolerabilis, in hoc ægro vero nullus adest planè.

Sunt etiam tumores triplicis duritiei, duræ scilicet durioris & durissimæ. Cavendum est à cantharidib. in hoc affectu, cum Authores de illorum usu disputant..

Quicquid dissolvit, minus deducit ad suppurationem.

Diachyl. c. gumm. hic convenit.

Suræ applicatum fuit à Chirurgo ungu. martiat. & dealtheæ.

Cataplasmata magis ad suppurationem deducunt, quàm resolvunt.

Sumat adhuc cochl. mixturæ.

2. Dec. Hodie quinquies vel sexies deiecit, & debilis est; Iteretur decoctum 30. Nov. præscriptum.

3. Dec. Sensit quasi oppressiones in corpore, non assumsit medicamentum, sed quater aut quinquies deiecit, pulsus paulò frequentior.

Præscribimus aliquid externum, propter glandularum duritiem.

*R. Ungu. Martiat.*

*Alib. Compos. ana ʒij.*

*M.*

*R. Empl. de mucilag. ʒ℥.*

*Applic.*

4. Dec. Hodie minor. haustum sumsit, ter deiecit, in totum aliquid levaminis habet; non tam debilis est ut prius; in pectore autem molestiam sentit; si modo spiritum retrahat, palpitationem

cordis, seu potius in ventriculo sentit flatus, qui etiam in corpore moventur, eos autem non excernit.

6. Dec. Satis debilis est, tantillum decocti sumsit, & sexies deiecit.

Debilis non magni est momenti.

Iteretur mixtura 30. Nov. præscr.

Sumat mixturam, non purg medicam.

7. Dec. Sentit molestiam in ano, tumorem digiti crassitie scilicet, qui tumor est hæmorrhoidum, qui etiam à purgante læditur, alias melius se habet.

*R. Ungu. Populeon. ʒij.*

*Bol. Armen. ʒj.*

*Opil. c. Oleo. Rosac. dissol. ʒ℥.*

*M. pro linim.*

9. Dec. Heri licet nihil sumpserit, tormina tamen per totum ventrem sensit, & cum tormina adestent, simul frigus vehementissimum in lumbis sensit, ut & circa ventriculum; ex postremâ mixturâ melius habuit; heri & hodie aliquoties deiecit; ubi dolor remisit, levis illum calor invasit, tormina autem illa per paroxysmum exacerbantur; tantillum tremuit.

*R. Aqu. Menth.*

*Fenic. ana ʒij.*

*Tind. Cinamom. ʒj.*

*Laud. Opiat. gr. v.*

*Syr. quinque Rad. ʒiss.*

*M. assum. cochleat.*

10. Dec. Melius se habet.

11. Dec. Frequentius purgatus est, debilis inde aliquid.

Iteretur empl. 30. Dec. præscr.

13. Dec. Tormina sensit continua, quando deiecit, lingua ferè sicca est, optat aliquid, quod possit leniri ardor oris.

Iteretur mixtura 9. Dec. præscr.

*R. Sem. Fenugrac. ʒij.*

*c. aq. bord. f. emuls. ad ʒviii.*

*add. Aqu. Rosar.*

*Syr. Viol. ana ʒj.*

*M.*

14. Dec. Valdè tussit, & inter tussendum caput sibi findi putat, non enim in omni tussi adest capitis dolor, ideoque per consensum hic non potest esse, sed in omni vehementi tussi sæpè totum afficit corpus, unde sæpius hernia & ruptio vafor.; potest etiam hic dolor ortum trahere à spi-



spiritu acido & magnâ effervescentiâ, ut inde halitus ascendant.

Crasa meninx, quæ valdè sensilis, & in duas partes dividitur, ibi afficitur, & facit concussionem contrâ mediam illam falcem, nam ibi sæpissimè multum aquæ invenitur, & est ferum, nam spuma feri peccantis signum est.

Ex ariditate linguæ levamen aliquod habet, ab usurpatâ mucilagine.

15. Dec. Lingua hodiè manè pituitæ magis obducta fuit, quàm alio tempore; dolor imminutus est, & phlegmata excernit.

R. *Mass. Pil. de cynogloss. ʒ℔.*  
*F. Pilul. No. XII.*

Iteretur mixtura 9. Dec. præscripta.

16. Dec. Videtur in meliorem redigi statum; dolor tamen caput quasi findens continuat, habet adhuc quod sumat.

17. Dec. Conqueritur de capitis dolore, & quidem aucto; totum corpus est tumidum, crura quoque ita tumefacta sunt, ut ea vix attollere possit; dolorem deducit Cl. Sylv. ab halitibus tumorem verò à solutâ materia viscidâ & per corpus dispersâ; tussim ob dolorem intolerabilem cohibet & coëcet.

Iteretur apozema 30. Nov. præscr. & loco ʒj. pulp. colocynth. ʒ℔. fumatur.

18. Dec. Ulterius conqueritur de dolore capitis, ac si finderetur caput, tantus est consensus partium dolentium, ut ne manum movere queat; postquam inclinato capite sedet, circa frontem dolorem graviores sentit, quando autem erecto sedet capite, dolor est levior. Sudor non amplius infestat, etiam si mungat nares, dolor non augetur; appetitus planè est prostratus, dolor accessit in brachiis & tumor continuat.

Causam statuit Cl. Sylv. esse pituitam solutam & in capite hærentem sub tenui meninge & substantiâ cerebri extrâ vasa.

Ista crusta in sanguine quæ observatur, & consistentia ex pituitâ est conjuncta, ubi pituita solvitur & effunditur, ibi anasaria potest oriri.

Quando ista pituita soluta fertur circa ductum spinalis medullæ, tunc nervis communicabitur, quales viæ patent in autopsiâ.

Hic humor & quantitate & qualitate peccat, quoad quantitatem educendus, quoad qualitatem autem corrigendus. Sternutatoria in hoc dolore usum habere, nisi convulsio ei gravis esset Frustrum folii tabaci, salviæ vel bethonicæ naribus imponat, blandè enim allicit pituitam, & evacuationem levissimam procurabit, sed ad leniendum dolorem & acrimoniam, quæ est in corpore,

R. *Aqu. Bethonic. ʒij.*  
*Fenic. ʒj.*  
*Theriacal. simpl. ʒvj.*  
*Laud. Opiat. gr. iij.*  
*Syr. quinque Rad. ʒj.*  
*M. assum. cochleat.*

21. Dec. Dolor capitis nondum remittit, continuat ergò in assum. mixt.

22. Dec. In eodem statu manet, & respiratio frequens urget.

R. *Aqu. Hyssop. ʒij.*  
*Tind. Cinamom. ʒ℔.*  
*Antimon. diaph. ʒ℔.*  
*Syr. quinque Rad. ʒ℔.*  
*Ocul. Cancr. ʒj.*  
*M. & assum. cochleat.*

24. Dec. Nuper magis anhelosus erat & agebatur quoad respirationem.

Iteretur mixt. 22. Dec. præscr.

27. Dec. Jam huic mundo valedixit.

## CASUS LVI.

27. Nov. **V**ir quidam hodiè accessit, qui jam in summo versatur delirio.

R. *Aqu. bethonic. ʒij.*  
*Cinamom. ʒ℔.*  
*Acet. stillat. ʒvi.*  
*Fuleb. Rosar. ʒj.*  
*M. assum. cochleat.*

21. Dec. Melius se habet, sed febricitat.

3. Dec. Iteretur mixt.

27. Sept. præscr.

11. Dec. Hodiè valdè debilis est.

R. *Ol. Rosat.*  
*Nymph. ana ʒij.*  
*M. f. linim.*

Inung. eo tempora.

14. Dec. Magn. levamen habet ab Oleo f. linim.

15. Dec. Convaluit.

16. Dec. Conquestus est iterum hodiè de flatibus in ventre murmura excitantibus unde aliquis dolor, sed non gravis.

Excrementa mediocri consistentiâ sunt.

Iteretur linim. 15. Dec. præscr.

22. Dec. Iteret. linim.

24. Jam planè reſtitutus.

## CASUS LVII.

23. Nov. **V**Ir quidam conqueſtus eſt de tuſſi & anguſtiis peſtoris.

R. Rad. ſenic. Apii. ana ʒij.  
 Baccar. Junip. ʒiſſ.  
 Sem. Anis. ʒij.  
 Liquirit. Roſ. ʒſſ.  
 Coqu. ex Aqu. pur.  
 In colatur. ʒxxx.  
 Diſſolv.  
 Syr. de Hyſſop. ʒij.

27. Nov. Non poteſt excernere phlegmata.

R. Aqu. Hyſſop.  
 Fenic. ana ʒj.  
 Acet. ſtillat. ʒvj.  
 Ocul. Cancr. ʒſſ.  
 Syr. quinque Rad. ʒj.  
 M. aſſumat cochlear.

30. Dec. Alvus adſtriſta eſt, dolore capitis cum gravi tuſſi ſentit.

R. Rad. liquir. Roſ. ʒſſ.  
 Fenic. ʒj.  
 Raſur. lign. Guajac. ʒij.  
 Baccar. Junip. ʒj.  
 Pulp. colocynthid. ʒij.  
 Coqu. ex Aqu. pur.  
 ad Colat. ʒxxx.  
 add.  
 Syr. de Senn. ʒij.  
 M. aſſumat ſubinde hauſtulum.

1. Dec. Aliquantò melius ſe habet.

3. Dec. R. Troch. Becchicor. Alb. ʒij.

4. Dec. R. Troch. Becch. Alb. ʒj.

6. Dec. In omnib. ſymptom. levamen habet.

R. Troch. Becchic. Alb. ʒij.

## CASUS LVIII.

20. Nov. **V**Ir aliquis acceſſit, cui alvus eſt adſtriſta; tuſſis gravis eſt cum eri-

pſelate; quoties ei novum medicamentum applicatur, febrem ſentit.

R. Eleæ. Cholaſog. ʒij.  
 Aqu. Cichor. q. ſ.  
 M. ſ. hauſt. cras manè ſumendus.

22. Nov. Ab aſſumpta purgatione benè deſecit, à quo tempore febris eſt levior; hæc nocte tuſſi ſiccâ correptus erat, ubi falſedo in pituitâ eſt; excreta ſunt ſpumôſa; hic conducunt pilul. de Cynogloſſi.

R. Maſſ. Pil. de Cynogl. ʒj.  
 F. Pilul. No. VIII.

Cum ſatis potentes ſint, unam ſumat, quando cubitum iturus eſt.

23. Nov. Heri vesp̄eri paroxyſmum ſenſit, aſſumpſit pilulam, quæ hæſit in faucibus, expergefactus à ſomno iterum j. aſſumſit. Conqueritur de dolorib. &amp; humorib. caput gravantib.

Iteretur purg. 20. Nov. præſcr.

24. Nov. Ardorem in deſectione à purg. cholaſogico ſenſit, ſemel tantum deſecit; heri vesp̄eri paroxyſmum habuit, cum difficultate reſpirationis.

Nuper retulit, ſe phlegmata ſpumôſa ejeſſe, & tuſſis cum tali excretionē ſemper eſt à catharris ut plurimum ſalſis & acribus; phlegmata vero craſſa ab alia cum procedunt cauſa, caput gravetur, & alia materia acris per nares deſcendit, ubi obſtruſtio quædam ſentitur, adeò ut cætera pars ad fauces dilabatur & inde in pulmones; & humor valdè tenuis acris & auſterus; tales catharri noctu potius urgent, quàm de die, quando humores deducuntur ad glandulam pituitariam, facile inveniunt vias ad fauces; ad latera oſſium catharri exacerbantur à decubitu in plumis. Ratio debet ſumi à naturâ ipſâ plumarum, ſi enim in ſerico decumbas, calor exinde blandus eſt, non autem talis, qualis in plumis; qui dormiunt in plumis, magis anguntur, ratio quia odorem gravem habent, & decumbentes anguntur eodem modo, uti in pluviôſa tempeſtate; quo ſunt recentiores, eò graviorem odorem edunt, unde à calore noſtro fermentantur quaſi plumæ, & aliquod aqueum ſpirant, unde talis motus in corpore noſtro oritur; hinc paroxyſmi febriles ſæpè augentur, & plurimi ita anguntur, ut non poſſint decumbere; eſt peculiaris anguſtia, & quaſi fermentatio in corpore noſtro excitatur; Vix quidam in plumis poſſunt mori, pinguem propter ſumiditatem, qui ex iis exſpirat; lecti recentes valdè foetent, ut vix à multis tolerari poſſint.

Plu.

Plumæ à vivis avibus meliores sunt;  
Pilulæ de cynogl. nullum habuerunt effectum,  
quia spiritus acidus non tam peccat, quàm sal,  
idcirco in altero ubi spiritus acidus peccavit leva-  
men habuimus.

R. *Hord. Mundat.*  
    *℞ ad crepatur. coct. 3j.*  
    *Amygd. dulc. Mund. 3ij.*  
    *c. Aqu. decoct. Hord. 1bj.*  
    *F. Emuls. cui add.*  
    *Syrup. jujubin. 3j.*  
    *M. & assumat sæpius haustul.*

25. Nov. Melius se habet, multum urinæ red-  
didit, medicamenta lenientia reddiderunt humo-  
res facilè educibiles.

Iteretur emulsio heri præscr. item ex Mass. Pil.  
de cynogloss. 3℞. form. pilul. No. 1x.

26. Nov. Conqueritur de frigore in lumbis ad  
genua; adhuc versatur in calore.

27. Nov. R. *Sacch. Alth. 3j.*  
    *Assumat. Subinde.*

29. Nov. Quotidiè deiecit, & jam in meliori  
statu est.

R. *Mass. Pil. de cynogloss. 3j.*  
    *F. Pilul. No. VIII.*

R. *Sacch. Alth. 3j.*

1. Dec. A pilul. levamen sensit.

R. *Mass. Pil. de cynogl. 3℞.*  
    *F. Pil. No. XII.*

R. *Sacch. Alth. 3℞.*

2. Dec. Mediocriter se habet, sed cum semel  
tantum deiecit, consultum erit, ut magis præ-  
parentur & educantur humores.

R. *Elect. Hydragog. 3iiss.*  
    *Aqu. Hyssop. q. s. pro haust.*

3. Dec. Bis deiecit satis commodè.

R. *Sacch. Alth. 3ij.*

4. Dec. Iteretur haustulus purg. 2. Dec. præscr.

6. Dec. Assumit pilul. heri bis, & hodiè se-  
mel deiecit; melius quidem se habet, sed tussis  
adhuc molesta est; habet adhuc pilul.

R. *Sacch. Alth. 3ij.*

7. Dec. Mediocriter se habet, matutino tem-  
pore multa phlegmata excrevit, tam crassa, quàm  
tenuia.

9. Dec. Heri paroxysm. habuit.

R. *Mass. Pil. de cynogloss. 3℞.*  
    *F. pilul. No. XII.*

R. *Sacch. Alth. 3ij.*

10. Dec. R. *Elect. Hydragog. 3iiss.*  
    *Aqu. fœnic. q. s.*

11. Dec. In multis levamen habet; pergat in  
assumptione medicamentorum.

13. Dec. Se satis commodè habuisse, & benè  
dormivisse narrat; phlegmata spumosa excernit,  
interdum crassa.

Iterentur pilul. & sacch. alth.

16. Dec. Iterent pilul. & sacch. alth.

18. Dec. Sensim restituitur.

20. Dec. Febr. sensit, cum corpus post sudo-  
rem frigori exponere coactus esset, dolor prehen-  
dit crus usque ad inguina; ex glandulis conglo-  
batis hoc malum; quia frigus horror in tali par-  
te corripit, vocatur febris catharrhalis à Medi-  
cis, & ortum suum debet istis glandulis; status  
quoque ipsum urget.

Iterent. pil. 17. Dec. præscr.

R. *Aqu. fœnic.*  
    *Hyssop. ana 3iiss.*  
    *Aqu. Theriacal. simpl. 3vi.*  
    *Spir. Nitri Gutt. VIII.*  
    *Laud. Opiat. gr. ij.*  
    *Syr. quinque Rad. 3j.*  
    *M. & assum. cochleat.*

R. *Rad. Helleb. Alb.*  
    *Fol. Majoran. ana 3j.*  
    *Pulv. misc. pro sternutator.*

3. Jan. sequ. anni. Hæc nocte malè quievit,  
& à sudore valdè vexatus est.  
Iteretur mixtar. 30. Dec. præscr.

R. *Mass. Pil. Mastichin.*  
    *Mass. Pil. cochiar. ana 3j.*  
    *Ol. dest. succin. Gutt. vj.*  
    *M. f. pilul. No. 30.*  
    *Dentur subinde v.*

5. Jan. In meliori versatur statu.

6. Jan. Hac nocte leviores habuit febrem.  
8. Jan. Iterentur pil. 3. Jan. præscr.

Rx. *Elix. propriet.*  
*Paracelsf. 3j.*

d. ad Vitr. & assumat ter quaterve in die Gutt.  
ij. vel iij. in vin. vel brod. carn.

## C A S U S LIX.

18. Dec. **A**ccessit Vir, qui continuè friget; palpitationem cordis patitur, cum tumore ab unâ parte in aliam; venter non valdè tensus est, ergò putat Cl. Sylv. esse ascitem, forsân à nimio potu, unde pituita soluta. Ipse fatetur se copiose & quidem sæpè bibisse.

Spirituosa hîc valdè conveniunt, ut humores corrigantur; febris erratica conjungitur.

Rx. *Aqu. petrosel. 3ib.*

*Fenic. 3j.*

*Tinct. Cinamom. 3vj.*

*Syr. quinque Rad. 3ib.*

*Spir. Nitri Gutt. vii.*

19. Dec. Conqueritur de continuo frigore, & tamen partes externæ calent.

Respiratio serrata potest ab hoc frigore necrosin inferre. Sponte deiecit.

Pulsus debilis, & frequens, calor in manib.

Uterque igitur humor peccat, & ita quidem, ut non rumperent seipsos, unde à bile calor, à spiritu autem acido frigus, in pessimo statu est, sed ipsum faciliè evasurum sperat Cl. Sylv.

Iteretur mixtur. heri præscr.

20. Dec. Valdè debilis hodiè est, tamen melius quàm heri se habet; iteretur mixtur. heri iterata.

NB. In colicis doloribus optimè conducit spiritus nitr. carminantib. vel aliis junctus paucis guttulis. Est aliquid singulare in isto spiritu, pauci sunt, qui eo utuntur; primò expertus sum in me ipso, inquit Cl. Sylv. Spiritus, qui primò affurgit rubicundus, optimus est, nam in destillatione nitr. plus quàm unus est spiritus.

Vitrioli Oriental. cap. mort. si aëri exponatur, novus spiritus & nov. ol. inde ascendit, quod planè egregium est.

## C A S U S LX.

13. Nov. **V**ir quidam per 15. dies excrevit nigricolora & sanguinolenta, & alia crassa ad anum vergentia; regio ventriculi tumefacta est & dura, in sinistro latere, puncturæ ex acrimoniâ ortum habent, cruditas ejus nidiorosa.

15. Nov. Pedes valdè tument, per quinque septimanas malè se habuit, natura proclivis ad hæmorrhagiam, quæ aliam viam sumebat, & per tussim multum sanguinis exercebat, perque aliquot dies excretiones cruentas habebat, à quib. valdè debilitabatur, cum jam per 10. dies duraverit; quoties sanguinem excrevit, in animi deliquium incidit, hinc ab excretionem tumor prostratus, & quando aliquid assumit, tussire cogitur & phlegmata evacuat; à purgante evomit sine levamine; omnia viscida & amara fuere, alvus fatis laxa, post cibum dolores circa ventriculum sentit. Omnis sanguis, qui ex pulmone excernitur per tussim, statim concrefcit.

A duabus causis potest sanguis evacuari, per tussim nempe, si à narib. in asperam arteriam, à quâ mox suffocatus fuisset; vel si sanguis qui per narnes solebat evacuari, per pulmones exitum quærît. Cl. Sylv. putat hæmorrhagiam non fieri ab abundantia, sed ab acrimoniâ sanguinis, qui sanguis acris tussim excitavit, unde apertio vasorum in pulmone, à quâ hæmoptisis.

Priora mala debent lucem asserre posterioribus. Ab hæmorrhagiâ incipiendum. Acrimonia sanguinis est in ejus parte serosa, non autem à spiritu acido, nam ille in crassat sanguinem: à motu caput quasi oppressum sentit, & si modò leviter emungit nares, sanguis effluit; à primo ætatis anno hunc affectum passus est; Qui quotidie evacuant sanguinem, sensim fiunt hydropici, nam sanguis redditur serosior, i. e. optima pars sanguinis evacuatur, forsân serum unâ cum parte spirituum animalium ad caput fertur, altera pars ad nares fluit, & hinc ratio potest reddi, cur sanguis tam crassus & floridus exit è narib.; pallidus est, & facies turgēt, quæ signa sunt serosis humoris, & leucophlegmatici etiam plerumque frigent deperditâ parte sanguinis butyrosâ; est etiam debilis.

Summum frigus & summus calor nocent, si calor summus omnia facit fluida; & humores serosi in eo sunt satis fluidi; in fine æstatis melius se habet, ergò intemperies sanguinis est à malâ mixtione; post excretionem sanguinis caput quasi vacuum videtur; peste laboravit, & bubones habuit, unde aliquod incommodi potest remanere in corpore, nam eo tempore assumit purgans; unde summi dolores cum tumescentiâ ventris. Ergò hæmorrhagia est à sero sanguinis abundante, quo laborant; hæmorrhagici debent cave-

re ne emungant nares; uti qui tussunt, ne tussiant; in peste habuit puncturas lateris sinistri, uti nunc etiam.

Tussis à sanguine seroso, vel ibi deposito, ut in pulmonibus hæreat; vel à levi aliquâ causâ, ut nimio potu; cum sitit, potest hære; vel à salivâ in asperam arteriam destillare. In dejectionibus tormina & dolorem æstuantem sentit, quod non parum confirmat; dejectiones fuerunt ad nigredinem tendentes & fluidæ; non sentit tum temporis dolorem, unde Cl. Sylv. concludit, non fieri ab effervescentiâ.

Ductus lymphæ chyloferus potest rumpi & hydropem causare, nam in talibus chylus in abdomen effunditur, & quæ assumuntur. Ipsi saliva est satis crassa, ac proinde non fit fermentatio prout decet, sed omnia sunt viscida, unde status & distensio ventriculi; omnia hæc signa ostendunt humorem viscidum in ventriculo. Absinthium hic optimè conducit, habet enim egregiam vim temporandi bilem, & ratione salis volatilis pituitam viscidam incidendi; quia alvus laxa, talia symptomata non patitur, ac si adstricta esset, humores enim aliqui semper evacuantur. In curatione non solum attendendum ad presentia, sed & ad præterita mala, & cavendum, ne humores serosi iterum abundent, & vel ascitem vel leucophlegmatiam causent, magis urgentibus tamen est occurrendum. Deliculis pilulæ cerasis conditis & nucleo privatis dentur.

R. Gum. Ammon. c. acet. præp. ʒ℥.

Mastich. el. ʒj.

Tartar. Vitriolat. gr. xv.

Myrrh. Rub. ʒ℥.

Croc. Britann. gr. vj.

Aloës Rosat.

Resin. Jalapp. ana ʒj.

Ol. granor. Junip. Gutt. vj.

M. f. pilul. No. xxx.

Vesperi tres assumat.

16. Nov. Assumit heri 3. pilul. & non deiecit; venter tamen quodammodo desumuit. Quinque pilul. sumat.

R. Elix. propr. ʒij.

17. Nov. Heri vesperi 5. pilul. sumsit, & bis ab iis deiecit, manè semel, & post prandium, sed cum torminibus; quando incedit, quasi tumor gravis in medio ventris est, excrementa mediocris consistentiæ sunt.

18. Nov. Tres pilulas sumsit, & nihil effecerunt, sed tormina sentit; venter adhuc tensus o-

stendit humores valdè viscidos esse; si nullus effectus, sumat noctu quinque alias.

19. Nov. Terdejecit à pilul. & commodius, quam nuper; conqueritur tamen de dolorib. circa stomachum, aded ut cogatur ferè semper ei applicare manum. A motu humorum oriuntur status, qui hærentes dolorem causant, ergò adstantur talia, quæ status dissipare possunt. Spir. Nit. inprimis convenit, sed non solus, quia acida per se majorem causant effervescentiam, omnia autem aromatica status discutiunt, præsertim Sem. dauci, anisi, levistic. sunt egregia in affectione hypochondriacâ & Scorbuto; menses movent baccæ Junip. item conveniunt & his convenientiores sunt bacc. laur. sed ingratiore sunt, & æger non amat amara.

R. Rad. Apii.

Levistic. ana ʒ℥.

Baccar. Junip. ʒj.

Rasur. lign. guajac. ʒij.

Sem. Anis.

Fenic. ana ʒij.

Coqu. in q. s. Aqu. pur. in Colatur. ʒxxx.

Dissolv. Syr. de Menth. ʒij.

Spir. Vin. reñif. ʒij.

Spir. Nitri Gutt. xx.

M. f. apozema potenter status discutiens. Assum. sæpè haust.

20. Nov. Venter habet se melius, operatio haustus commodior fuit, bis deiecit.

23. Nov. Distensio in regione ventriculi ita urgens est, ut vix possit dormire; remittit tumor & augetur, & initium ascitis, sed metus est, ne cum ascite jungatur species tympanitidis.

Olea dest. in genere ad status discutiendos præscribuntur.

R. Aqu. fenic. ʒij.

Spir. Vin. reñif. ʒj.

Nitri. Gutt. x.

Ol. d. Anis.

Gran. Junip. ana Gutt. vj.

Syr. Menth. ʒj.

Laud. Opiat. gr. ij.

M. subinde sumat. cochl. j.

24. Nov. Magnum levamen à mixturâ hodiè sentit.

25. In eodem statu, quo heri versatur. Iteretur mixt. 23. præscr.

27. Nov. Circa merid. sumsit decoct. & sentit jam motum aliquem. Iteretur mixtur. 23. Nov. præscr.

29. Nov. Ex assumpto apozemate heri & die Sabbathi plurima deiecit, & tamen venter magis distenditur, quàm prius.

Allium egregium est ad flatus discutiendos, tum ad materiam viscidam incidendam, sumat ergò crudum, quod melius est, aut in lacte coquatur, vel imponatur in Spir. Vin.

30. Nov. Ante horam accepit allium, & assumpsit aliquid, continuet assumptionem bis vel ter in die.

1. Dec. Nullum sentit levamen; iteretur mixt.

23. præscr.

2. Dec. Effervescentia est in eo mixta, continua & materia valde viscida, unde omnia hærent; hodiè non deiecit.

Iterentur pilul. 15. Nov. præscr.

3. Dec. R. Ol. d. Anis. ʒß.

*Assumat Gutt. vj. in cochl. vini.*

4. Dec. Molestum est, quando humores adeo visci sunt, ut nolint cedere, & si solvantur, in flatu viscidos abeunt, & ventrem distendunt.

R. Ol. d. Anis. ʒß.

*Assum. sapius Gutt. vj.*

6. Dec. Dolor in agro est instar cinguli punctorius; venter valde distenditur; quotidie deiecit; ab alio assumpto materia solvitur, unde flatu; per singulos dies dolores recurrunt, & per hor. durant; crura turgent, usque ad genua; nocte discutitur; tumor est ab humore seroso instar gelatinæ; magis tumet pars sinistra, decumbit verò dextra, ergò humores non à gravitate in sinistram latu colliguntur, sed quia dextra calidior est à decubitu, unde humores facilius hærent in sinistro quàm in dextro latere, cum ea ratione debilior est sinistra, fortè etiam una pars magis igni exponitur quàm altera. Si flatu possent exire, melius haberet; & tamen alvum laxam habet, unde probatur, flatu posse adesse etiam laxà alvo, quod in Praxi sæpius occurrit. Eger quosdam flatu eructat, novi autem semper generantur à materiâ viscidâ. Oleum anisi non solvit illam materiam, sed flatu potius discutit. Spiritus Vini anisatus plus præstat. Heri flatu emisit, unde melius habuit, abdomen etiam detumuit.

Fœmina Amstelodamensis cum ventrem adeo flatibus distentum haberet, ut potuerit perspicere, à Medicis relicta consilio Empyrici ab hoc spirita curata est.

R. Spir. Vin. anisat. ʒv.  
*Sumat cochleat.*

7. Dec. Abdomen adhuc distensum est, parum levaminis sentit; ante annum bene habuit ab oleo anisi, quod etiam nunc ei concessimus, ne conquereretur; alvus satis laxa est, quod mirandum, quòd eo modo non cessat malum, si enim esset in intestinis crassus, enema convenire poterit.

Non negat Cl. Sylv. sudorifera juvare posse, sed non ratione discussionis humorum, sed alio modo, quat. scil. alterantia sunt; hi humores visci sunt, & non fluxiles. Amstelodamenses Medici sæpè utuntur sudoriferis, sub nomine cardiocorum. Si sudorifera tanquam alterantia propinantur, & æger blandè in lecto disponatur ad sudores, si erumpunt, bene est, si non, humores preparantur ad sudores. Mithridatium magis flatu discutit, quàm theriaca aut diascordium. Sudor nunquam stragulis aut integumentis urgendus est, sed tantum tegumentorum imponendum est, quantum ferre potest æger, tum jusculum aut novum sudoriferum exhibeatur in mixturâ, & eo modo blandè sudores moventur. Possunt usurpari mille in morbis, & ego magnifacio, inquit Cl. Sylv., quia blandè procedunt.

R. Mithridat. Danno. ʒij.

*Syr. Ment. ʒj.*

*Spir. Nitri. ʒß.*

*Spir. Vin. redif. ʒß.*

*Aqu. fenic. & petrosel. ana ʒiß.*

*M. assum. cochleat.*

9. Dec. In eodem ferè statu est, distenditur adhuc abdomen, dolores circa inferiores cartilagine sentit in thorace, qui non sunt à distensione peritonei.

Salia hic conducunt, ad reddendas partes magis explicabiles, ut est ol. nardin.

R. Flor. Chamom. Mij.

*Coqu. in cerevis. ad colatur. ʒij.*

*Detur subinde haustus.*

R. Ungv. de alib. simpl.

*Martiat. ana ʒij.*

*Ol. lilior. Alb. ʒß.*

*M.*

10. Dec. In eodem adhuc statu est.

R. Spir. Vsa. anisat. ʒv.

11. Dec. Tantillum levaminis sentit, quia nihil edit, angitur enim valde à cibo.

13. Dec.

13. Dec. Iteretur decoct. 19. Novemb. præscript.

## CASUS LXI.

8. Nov. **V**ir quidam per 5. septimanas febris laboravit, hodie à 6. matut. ad hor. 12. duravit paroxysmus; aura frigida lumbos & viscera corripit, quæ quasi contorqueri videntur; nihil potest edere; saporem ingratum in ore sentit; fitit omni tempore, præsertim durante calore, dolores ventris patitur, quasi dilacerantes; à calore capitis augetur dolor; de dolore capitis & ventris conqueritur præcipue.

Affectus hic est febris quotidiana intermittens, ut ex paroxysmis patet, cum eadem horâ revertantur, eodem modo, quibus paroxysm. à tertianâ duplici differt, quæ incertis & inæqualib. vicib. redeunt.

Locus affectus est intestinum duodenum à Cl. Sylv. inventum, cum ibi imprimis dolorem patiatur.

Cum inflentur intestina, debet esse aliquid expandens, nempe flatus, qui ab humore aliquo apto debent excitari.

Frigus grave & calor, ergò aliquis humor debet harere, ubi commodius potest jungi efficienti, ex aquâ ad flatus excitandos requiritur satis magnus calor, qualis in corpore non invenitur.

Materia est humor pituitosus spiritu acido abundans, unde longum frigus; causa efficiens est bilis, unde effervescentia. Quomodo autem frigus se habet in febris. accuratè se non explicare posse, rotundè fatetur Cl. Sylv. A frigore judicat humorem pituitosum magis peccare.

Omnes affectus à bile, quâ bile, sunt calidi. Omnes affectus chronici à pituitâ ortum habent; ubi frigus diu durat, tunc pituita viscida est, vel copiâ peccat.

Bilis minus hic peccat, quia symptomata sunt minora.

Dolor capitis autem acrimoniam indicat.

Ad restituendum igitur ægrum humores sunt alterandi, & qui abundant, educendi; sed quia humor viscidus prius alterari debet, antequam educatur, si vero alteratione non possumus curare, educendus & evacuandus est. Medicamenta sunt gummata, & alia quæ sale volatili abundant, ut amara & omnia aromatica.

Heri paroxysmus ab hor. 5. matut. duravit per hor. 4. Pedes incipiunt tumere, & valdè debiles est.

In febr. intermittentib. duo sunt animadver-

tenda, morbus scil. totus, & singuli paroxysmi, quibus aliquid præscribendum.

Omnes affectus à sale volatili, tanquam à causâ, vehementiores sunt iis, qui sunt à fixiore.

*R. Aqu. fœnic.*

*Theriaca. simpl. ana ʒß.*

*Spir. Nitri. Gutt. vj.*

*Syr. quinque Rad. ʒß.*

*M. f. haust. quem assumat ingruente paroxysmo.*

Urina valdè est turbata.

9. Nov. Ab horâ 8. matut. frigus usque ad meridiem duravit; caput dolet; cum in æstu febrili versatur; pulsus frequens est & manus calent; multum bibit, unde non mirum, si à tali largiore potu pedes tumeant: ab assumtis prunis tantum dejecit, ut perituum se putaret; appetitus planè prostratus, nec mirum, quia multum bibit.

Anticipatio & Postpositio non semper signa sunt morbi diminuti, quamvis plerumque melius postponere, quàm anticipare.

Cum levamen habuerit, medicamentum potest iterari.

Attendendum est semper à Medico ad illud symptoma, de quo æger imprimis conqueritur; illud urgens in hoc ægro est sitis & dolor capitis, quibus occurrendum habito respectu ad febrem; præparetur ergò medicamentum, quod & sitim & dolorem sedat.

Cum hæc symptomata sint à Sale acri, medicamenta salem temperantia conveniunt.

Dolor in omni sensu est à molestiâ, sed in sensu tactus est à duritie, vel si sensus tactus subdidit in duas partes.

Pars acrior bilis minuenda narcoticis, ne dolorem sentiat.

Medicamentum quod extra paroxysmum assumat, quod sitim tollat & dolorem sedet, est tale.

*R. Aqu. Theriac. f.*

*fœnic. ana ʒß.*

*Spir. Nitri. Gutt. viii.*

*Syr. diacod. ʒß.*

*M. pro haust.*

Quia autem æger debilis,

*R. Aqu. fœnic. ʒij.*

*Tind. Cinamom. ʒß.*

*Spir. Nitri. Gutt. xv.*

*Laud. Opiat. gr. ij.*

*Syr. quinque Rad. ʒj.*

*M. assum. coelest.*

10. Nov. Circa meridiem paroxysmum habuit; frigus valdè urget, adhuc in pedib. præsertim; pulsus valdè frequens, non tamen adeo urget frigus, ut heri, nec tantus dolor lumbor. & capitis, ut antea; pulsus durante frigore solet esse compressior, & tamen frequentior, hinc omnia leviora; inde etiam judicare possumus, nos benè statuisse de affectu.

Iteretur ergò haustus heri præscript.

11. Nov. Febricitavit hor. 12. per 3. hor. frigus duravit.

Neglexit medicamentum; jam calet, nec mirum est, appetitus prostratur; cras ergò medicamentum sumat.

13. Nov. Conqueritur de æstu; sudavit satis commodè ab haustu circa vesperam.

R. *Aqu. Borrag. ʒiij.*

*Cinamom. ʒj.*

*Acet. stillat. ʒx.*

*Ocul. Cancr. ʒß.*

*Antimon. diaph. ʒj.*

*Laud. Opiat. gr. ij.*

*Syrup. de succ. acetos. ʒj.*

*M. sum. cochleat.*

15. Nov. Triduo ab hoc non tremuit; melius se habet à mixtura, frigus tamen ab assumto medicamento sensit tantum circa lumbos; pulsus robustior; habet alvum laxam; pedes tument; continet mixturam.

16. Nov. Heri circa vesperam sensit paroxysmum; ab assumto medicamento frigus cessavit; calor non urget; pulsus debilis est; in omnibus aliis melius se habet; talis est debilitas, qualis à ventriculo ortum habere solet malacia; heri habuimus pulsum robustiorem, hodiè debiliorem, ergò non potest peti causa à virib. Multorum enim vires plus conteruntur à frigore febrili, quàm à calore; dum frigus magis urget, & in hoc ægro adeo urgebat, ut coactus fuerit è lecto surgere, & ad ignem calefieri.

Duorum generum sunt Vires, cordis. scil. feu Pulsus, & animales.

Ubi sensus & motus languidior, tunc vires animales debiles sunt; pulsus autem debiles cordis vires debiles esse significant.

Hæ duæ primariæ vires sunt, & debent observari à Medicis, & tertium genus debilitatis in ventriculo collocatur, & Malacia vocatur.

Vires quæ ad vitam spectant, præcipuè in corde sunt in hoc ægro; & debilitas motus & pulsus locum habent, sed de tertio genere conqueritur, sc. de Malaciâ, ob defectum alimenti, vel

ab aliis humorib. ibi hærentib. unde sæpè animi deliquio corripitur. Præcipua causa quærenda est in fermento; non appetit cibos, & tamen capit multa, nescit quid velit, & cum non appetit ea quæ solebat, hinc fermentum alteratur, sed quid illud sit in fermento, difficile est determinare; quando appetitus bene se habet, omnia sunt grata; quando languidus, nihil ferè placet, & cum eodem modo se res habet in hoc ægro, ergò illud, quod appetitum excitat, deest, vel minore quantitate adest; quòd appetitus à spiritu acido est, patet, quia acida appetitum augent. Ergò in hoc casu pono spir. acidum ligari quâsi in pituitâ viscidâ, unde chylus crudus, & rarefactio sanguinis impedita, & paucitas spirituum animalium, unde tres illæ debilitatis species possunt deduci.

Prout appetitus se variè habet, ita etiam cibi varii esse debent, & omnibus omnia non conducunt, nec idem cibi genus.

Sed cum multa acida fuerint in mixturis, videtur acidum deberi augeri non minui; forsan à nimio potu spiritus acidus diluitur, optat vinum, & forsan eà de causâ de malaciâ conqueritur.

A multo potu diluitur & eluitur è ventriculo fermentum, unde si ante cibum bibatur, appetitus proferitur; forsan hic æger ventriculum suum gravavit, cum diversa optat; videtur autem potui deditus esse.

Cum statuatur aliquid viscidum adesse, à febre & multis symptomatibus; quæritur quid agendum, si alvus non amplius laxa, educendi sunt humores, semel modò dejecit, appetitus excitandus ergò.

R. *Mass. Pil. Mastichin. ʒj.*

*F. pilul. No. v.*

*Cras manè sumat eisdem.*

R. *Aqu. Menth. ʒij.*

*Tinct. Cinamom. ʒj.*

*Elix. propr. ʒß.*

*Spir. Salis. Gutt. VIII.*

*Syr. Menth. ʒj.*

*M. assum. cochleat.*

17. Nov. Heri vesperi inter 8. & 9. paroxysmus, sed aliquandò levior, adfuit, unde possumus judicare tale medicamentum & frigori & calori conducere, ubi frigus urget, assumit Cl. Sylv. plus aqu. theriacal. ubi calor verò plus acidior. ubi medio modo se habent; medio modo utitur.

Assumit ʒ. pilul. non dejecit adhuc; nihil assumit mixturæ, ergò statim sumat.

18. Assumit pilulas, quater dejecit, & satis copiosè quidem, pulsus satis debilis; habeat aliquid jusculi carnis vervecinæ. Heri vesperi non sensit.



fenfit paroxysmum, nec assumit Mixturam.

19. Nov. Hodie manet circa 5. paroxysmum passus est, frigus per 5. horas duravit; paroxysmus valde gravis fuit; à Mixt. cum oculis Cancr. benè se habet; pulsus frequens; mens ei non benè constat. Iteretur Mixt. 13. Octobris præscr.

20. Nov. Frigus ab hora nocturn. ad 4. matutin. duravit; congeritur quotidie os sibi à sapore ingrato infici; optat vomitor. Quod autem non ausus est dare Cl. Sylvius cum debilis sit; deiecit quidem quotidie, quare leve tum purgans per infer. præscript.

Rx. Elest. Cholagog. ʒij.

Aq. Menth. q. s. pro haust. cras manet sumendo, nihil periculi inde timendum

causa erit.

ἰσχυρὸς ὁ πόνος

22. Nov. Heri assumit purgans, semel deiecit, sed ita, ut putaret intestina extrahi è corpore; heri levem febr. habuit; hodie friguit, circa nonam; nunc calere incipit; hodie non deiecit; dolores ventris circa umbilicum sentit; non adeo dolet in lumbis, uti prius, quando manum porrigit, dicit dolorem ventris augeri; ex pulsu levior apparet paroxysmus; temperat sibi à potu, quod signum est, sitim non amplius esse valde urgentem; si status emittit, & venter est distensus, tunc dolor est à flatibus, si verò non, tunc ab acrimoniâ humoris; incipiente paroxysmo dicit se sentire flatum ab uno latere in aliud moveri, & si status emittat, levamen habet.

Distinguumus esse inter abdomen extrinsecè distensum & intrinsecè, ubi indurecit quasi, tunc fuit non distensio, sed contorsio intestinorum.

Sæpè sitis est magna sine aestu; sæpè magnus aestus sine siti sæpissimè junguntur, hinc non solum calor, siccitas, frigiditas & humiditas in rebus animalibus consideranda, sed acidum etiam, amarum, & falsum, de quibus Hippocr.

Dolor etiam est continuus & pungens, ergo accedit etiam acrimonia, cùm pituita ibi hærens à purgante mota potest talem dolorem causare; potest esse acrimonia sine bile in pituita, scil. ab aciditate; aciditas enim semper est in pituita, & si adeo laxè inhæreat, ut bili jungatur, fit bilis acris; atra bilis dicta. Si sitis esset à bile, calor etiam adesset; longè facilius curatur sitis à bile, quàm ab alio humore in frigore paroxysmi facta. Opium lenit dolores, & somnum conciliat; lenit dolores, quat. sal ejus volatile à spiritu volatili volatilifatur; ratione spiritus volatilis facilius jungitur spiritibus animalibus, unde à sale illò signantur spiritus animales, hinc somnus.

Sal volatile fixum redditur à sale fixo. Spiritus Vini malvat. gratissimus est. Nam ut ratione salis opium jungitur pituitæ & bili, sic ratione spiritus cur non spiritui animali jungatur sal. Opium etiam humores acres figit, nam ratione salis in eo est vis figendi. Spiritus acidus potest concentrari, sed non præcipitari, nam nihil in eo est, quod fundum petat; & quamvis Spiritus Vitriol. Tartaro junctus & concentratus sit, non tamen est propriè præcipitatus, & quando sal lixiviosum & Spiritus acidus junguntur, aliquando aqua non possunt solvi, imprimis si accedat oleum, ratio est, quia pori eo modo occluduntur; qui Spiritum & salem potest figere, multum potest.

Rx. Aq. Menth. ʒij.

Fenic. ʒj.

Tinct. Cinamon. ʒss.

Spir. Nitri Gutt. viij.

Laud. Opiat. Gr. ij.

Syr. Menth. ʒj.

Assumat sæpius Cochlear. j. & redeunte paroxysmo. 2.

23. Nov. Nunc versatur in Paroxysmo.

24. Nov. Vix aliquid de febre sensit; à Medicamento levamen habet.

25. Nov. Hodie febrem habuit; assumpto Medicamento melius habuit; hac nocte per 5. hor. commodè quievit.

27. Nov. Parum deiecit; pedes magis tument.

Rx. Elest. Hydragog. ʒij.

Aq. Petrasol.

q. s. pro haust.

29. Nov. Heri per 6. hor. in paroxysmo fuit; & frigus ei admodum molestum fuit; totum corpus ferè evacuavit à purgante, ut dicit; se ferè cœcum fuisse narrat; facies valde tumet; bibit satis liberaliter, minimè sibi temperat. Iteretur Mixt. 12. Nov. præscr.

30. Nov. Heri vespere per 2. hor. duravit frigus, hodie non malè se habuit à purgante. Iteretur Mixtura 22. Nov. præscr.

1. Dec. Humor à Medicamentis sublatu est, & multam aquam evacuavit.

2. Dec. Aliquantò melius se habet.

3. Dec. Multum dormit, erit mutatio vel in melius, vel in pejus, post somnum.

6. Dec. Pulsus commodior, quàm prius; valde sitit, adeo ut toto morbi tempore vellet bibere; non satis est sui compos. Iteretur Mixt. 22. Nov. præscr.

9. Dec. Valde debilis est, iteretur Mixt. nuper præscr.

R. *Aq. Borrag.*

*Meliss. ana. ʒj.*

*Tinct. Cinamom. ʒij.*

*Spir. Salis, gutt. viij.*

*Syr. Papav. errat. ʒj.*

*M. assum. subinde haustul.*

11. Dec. Valde debilis est. Iteretur Mixture 9. Decembr. præscr.

14. Dec. Quanquam valde debilis sit, tamen aliquantulum surrexit. Iteretur Mixt. 9. Decembr. præscr.

15. Dec. Satis bene valet, pulsus etiam commode se habet, & cibi aliquid iterum sumpsit.

16. Dec. Sanguinem exspuit hodiè, & in statu non optimo versatur.

17. Ipsi res in pejor vergere jam videmus, tantum enim non habet virium, ut verbum proferre possit; os & palatum ei repleta sunt sanguine, iteretur ergo Mixt. 9. Dec. præscr.

20. Dec. Alexander obiit, & publicâ sectione apertus est.

Annotata quædam ex dissect. cadav. Alexandri.

Abdomen planè collapsum erat, ut ne intestina in ipso contineri apparerent.

Dissectâ cute, eaque liberatâ, ne vestigium quidem pinguedinis apparebat, sed omnis consumpta erat, musculi autem abdominis egregii satis erant & rubicundi.

Dissecto abdomine eoque apertò cavitas ejus multâ aquâ erat repleta, & penè tres pintæ Belgicæ exhauriebantur; quamvis venter nè minimumurgeret, sed planè collapsus esset; quæ aqua denotabat speciem hydropis; & hoc est contra eos, qui omnem hydropem per tumorem definiunt; aliter enim & non semper tumorem locum habere; redarguit atropia hujus cadaveris. Omentum penè sursum versus ventriculum distractum erat, fuitque foetidi & obscuro coloris, & tenuia intestinâ ab omento planè non tegebantur.

Et quibus talis est constitutio, semper illi petunt ignem & injuriâ aeris frigidi offenduntur.

In intestinis tenuibus duobus distinctis in locis observabatur, quoddâ substantia illorum ingrediebatur in alteram, in uno loco, quando extendebantur; ingressa erat substantia unius in alteram, ad longitudinem 4. digitor. transversorum; in altero autem loco spithamâ minoris, quam intorsionem Cl. Sylv. contigisse putat à flatibus valde urgentibus, hocque malum incurabile est; quando enim adhibentur medicamenta flatus

discutientia, tunc propellitur magis intestinorum substantia in aliam.

Omnia intestina tam tenuia quàm crassa flatibus erant distenta.

In intestino colo hoc observabatur, quoddâ mox contractum à flatibus, mox distensum, & iterum contractum erat.

NB. Ubi est principium intestini coli observandum appendiculam ibi esse, quæ vocatur intestinum cœcum, in cujus appendiculæ finem Cl. Sylv. principium ejusdem motus constituit, ita ut quando excrementa in illud perveniant, ibi loci fiat motus, & excrementa ex eo iterum propellantur, & deorsum ad intestina protrudantur. 2. Considerandus venit annulus membranæ seu valvula, quæ duplicem præstat usum: 1. Ne ex intestino tenui excrementa semel prolapsa regrediantur, motuque præpostero sursum ferantur. 2. Quando clysteres injiciuntur, ne sursum ferantur, & per os rejiciantur, quod contingit ex laxatione hujus valvulæ, quales tristes eventus sæpè observavit Cl. Syly. & recenset River. in praxi.

Sanguis vix apparebat in vasis mesenterii, ita pituitosus erat.

NB. Differentia intestinorum crassorum & tenuium internæ substantiæ hæc est, quod substantia interna crassorum plana magis, tenuiorum autem pannosior est. Præterea notandum, intestinum tenue à pyloro transfertur ad renem dextrum usque, & tunc vergit sub mesenterio ad renem sinistram, & ubi sensim reflectitur, observatur ductus bilarius & pancreaticus, qui ibi concurrunt; ex duobus illis ductibus, unus constituitur, & hic duo ductus se exonerant in illud intestinum, cum autem hi duo humores, qui partim ex pancreatè, partim ex ductu bilario eò deferuntur, & phlegmati, quod semper ibi præstò est, permiscantur, temperant se invicem; his autem prævisè dispositis, siue unus siue ambo, siue omnes effervescentiam & dolorem instituant, ut & frigus & calorem, quæ symptomata ibi observantur, circa regionem scilicet lumborum, in febribus omnibus, potillimum intermittentibus, uti testatus fuit Cl. Sylvius.

Mesenterium, quod aliàs in mediis vertebrae annoditur, in hoc subiecto versus partem dextram magis vergebat.

Ventriculus situm suum naturalem non observabat, sed rectâ deorsum tendebat.

Pancreas non ita firmum erat, uti debebat, sed flaccidum erat.

In cavitate thoracis multa aqua reperiebatur, & quæ in dextro latere hærebat aqua, subflava erat, ac membranulæ, ut & stigmata reperiebantur in illâ; aqua autem quæ in sinistro latere continebatur, cruenta erat, nullæque membranulæ in eâ reperiebantur, signum, illam non tantâ acrimoniâ fuisse præditam, quàm quæ in dextro latere continebatur.

In toto sinistro pulmonis lobo durities percipiebatur, quo dissecto spumosa ac cruenta effluabant.

In dextro autem lobo talis durities non reperiebatur, sed uterque lobus, tam dexter, quam sinister erant obscurioris coloris.

In capite omnia benè se habebant, nisi quod sanguis pituitosior, quæ sanguinis constitutio in toto illo cadavere observabatur.

## CASUS LXII.

15. Dec. **V**Ir quidam accessit paralyticus, & per quadriennium jam valetudinarius fuit; & antequam in hunc affectum incideret, febbr. lentis & erraticis laboravit; deinde dolores atroces in crurib. habuit: pridie calendis Octobr. ex vehementi ira in linguæ paralyfin incidit, magnâ cum debilitate & gravibus doloribus in brachiis & cruribus; caput inane esse videtur; ab eo tempore paralyseos somnum vix capere potest; parum edit, nec multum deiecit; ne per 3. septimanas ante paralyfin deiecit.

Ira hic causa procatactica est, sed quoniam antea quædam mala fuerunt, nempe humor pituitosus cum bile mixtus, ab irâ moti sunt, & bilis tam ad superiora, quàm ad inferiora effusa est. Ideoque & bilis & pituita hic peccarunt, antequam incideret in hoc malum, vigilem in lumbis, & ardorem in capite sensit, vigilie ipsi valdè moleste fuere, & dolores in cruribus.

Conferat hic Medicamentum, quod leniter quidem deducit humores, lenit dolores & vires roborat.

*R. Mithridat. ʒij.  
Syr. Stachad. ʒj.  
Aq. Theriacal. simplic. ʒʒ.  
M. & assumat cochlearim.*

16. Dec. A mediâ nocte usque ad hor. 8. matutin. somno satis profundo dormivit, parum verò deiecit.

Humores pituitosi hic valdè peccant, per accidens autem bilis mota & irritata est.

*R. Elef. Cholagog. ʒij.  
Hydragog. ʒj.  
Aq. Bethonic.  
q. s. M. f. haust.*

17. Dec. Quinquies deiecit, & sentit levamen; punctiones per omnia membra habet; hæc nocte sponte quievit; alterantia quæ motum movent, & vias parant, hic profunt.

*R. Aq. Melir.  
Fenic. ana. ʒj.  
Theriacal. simplic.  
Tind. Cinamom. ana. ʒʒ.  
Laud. Opiat. Gr. ij.  
Syr. Stachad. ʒj.  
M. Assumat Cochlearim.*

18. Dec. Non continuò dolorem punctorum & fornicationes sentit. Præscribatur ei Decoct.

*R. Rad. Fenic.  
Apii. ana. ʒj.  
Galang. ʒij.  
Rafur. lign. Guajac. ʒij.  
Baccar. Junip. ʒij.  
Sem. Urtic. Rom. ʒij.  
Cog. s. a. in aq. pur. in Colatur. ʒxx.  
Dissolv. Syr. de Helleb. Nigr. ʒij.  
Spir. Vin. reſif. ʒijss.  
M. & assum.  
Per Haustus.*

19. Dec. Iteretur mixtura heri præscr. Bis terve in die ante pastum Coch. j. assumat.

Urina nubeculam in fundo habet; arene quoque in fundo esse videntur; quando sunt in superficie, significant capitis inanitatem.

20. Dec. Iteretur mixtura 17. Dec. præscr.

21. Dec. Mixti dolores hic sunt, quare & varia hic consideranda; nam varia illa affluxio spirituum facit mutationem motus; & quidem punctura, quæ est fornicationis; calorem ab extremis assurgentem & medullam ex ossibus quasi exsurgentem observat. Habet quod sumat.

22. Dec. Nihil hæc nocte dormivit. Iteretur Mixt. 15. Dec. præscr.

24. Dec. Pulsus melior, commodiusque hodie quievit. Iteretur in duplo Mixt. 15. Dec. & Apozema 18. præscr.

27. Dec.

27. Dec. Videmus sibi mutationem, ventrem scilicet tumefactum à flatibus; videtur ipsi ac si visus obscurior sit ab halitibus melancholicis communicatis oculis & humoribus quibus nutriuntur. Iteretur Mixtura 15. Dec. & Decoct. 18. præscr.

29. Dec. Placidè hæc nocte quievit, Decoct. & Mixtur. sumsit, attamen non purgatus. Iteretur Mixtura & Decoct.

30. Dec. Quoad omnia melius se habet, heri hæmorrhagiâ laboravit; benè quievit, unde symptomata sunt leviora.

Iterentur omnia.

3. Jan. Seq. anni. Nudius tertius febricitavit; præscr. Decoct.

*R. Rad. Fenic.*

*Apri.*

*Pæon. ana. ʒj.*

*Galang.*

*Curcum. ana. ʒij.*

*Rasur. lign. Guajac. ʒiiij.*

*Baccar. Junip. ʒiʒ.*

*Laur. ʒʒ.*

*Sem. Urtic. Rom. ʒiiij.*

*Coq. ex aq. pur. in Colatur. ʒxi.*

*Dissolv. Syr. de Helleb. Nigr. ʒiiij.*

*Syr. de Colocynth. ʒiʒ.*

*Spir. Vin. rectif. ʒiiijʒ.*

*M. & sumat subinde haust.*

4. Jan. Mediocriter se habet.

5. Jan. Non deiecit, & parum quievit per biduum. Iteretur Decoct. 3. Januar. præscr.

7. Jan. In meliori statu vivit.

8. Jan. Satis commodè se habet, nisi quod de continuo frigore extremarum partium conqueratur. Omnes partes paralyticæ longè sunt frigidiores reliquis, quamvis restitutæ sint, & moveant partes illas, attamen illæ frigent, sed bonum signum futuræ sanitatis est, quando sentiunt se frigescere. In quâdam paralytico specie intumescit pars paralytica, in quâdam non intumescit, tunc illi succurrendum & ad illam cura dirigenda; aliquando non tumescit, & tunc malum in viis; quare in examine ejus conclusum est, humorem pituitosum in partibus hære; nam sapissimè paralytis fit, cum humor pituitosus musculos & fibras afficit, imò fit etiam quando secundum ductum vasorum & nervorum motu humoris pituitosi fit compressio istorum vasorum, malum ejus non est notabile in partibus, non tumor adest; antea præ stupore non sensit frigus, jam verò diminuto stupore magis alget. In melius, non in pejor vergit. Iteretur Apozema 3. Jan. & Mixt. 6. Jan. præscr.

10. Jan. Heri levem paroxysmum febril sensit, nunc benè se habet. Iteretur Mixt. 18. præscr.

11. Jan. Benè deiecit, & valedicit. Iteretur Mixt. 6. Jan. præscr.

## C A S U S LXIII.

11. Jan. **V**iro cuidam caput dolet ab 8. jam diebus; dolor etiam est in lumbis, alvus laxa est; somnus nullus; continuò frigit; ex lumbis assurgit frigus ad caput, unde grave est, & vertigine vexatur; quamprimum corpus movet, frigit; deliravit quoque in febr. continuis; alias non sentitur frigus, sed exacerbatio; de calore nullo conqueritur.

Spiritus acidus hic in pituita nimiam facit effervescentiam, ideoque non solum emendandam, sed & evacuandam esse statuit Cl. Sylv.

*R. Aq. Petrosel.*

*Fenic. ana ʒiʒ.*

*Theriacal. simpl. ʒvj.*

*Laud. Opiat. Gr. ij.*

*Antimon. Diaphor. ʒʒ.*

*Syr. quinq. Rad. ʒi.*

*M. Sumat. Cochlear.*

*Et quidem singul. hor. Cochlear. j.*

12. Jan. In omnibus levamen habet; benè quievit, nec dolorem capitis amplius sentit, sed sapor aliquis dulcis, saccharo Saturni simillimus ei valdè molestus est. Oleum spiritui acido junctum & salis lixiviofo dulcedinem efficit. Iteretur Mixtura heri præscripta.

13. Jan. Conqueritur de dolore lumborum; non deiecit; quamprimum inclinat in somnum, sudat, alias commodè quiescit. Iteretur Mixtura 11. Jan. præscr.

*R. Elect. Hydragog. ʒiiij.*

*Aq. Petrosel. ʒiiʒ.*

*M. f. haust.*

14. Jan. De dolore cinguli ad instar sub umbilico conqueritur; transversim tenduntur istæ partes instar chordæ. Nullum intestinum transversim fertur, præter colon, & ubitalis dolor, accusandum est colon; possunt enim & reliqua quoque affici sed rarò, & tunc dubio Medicos involvit. Heri illum hoc malum invasit; emisit status. Dolores intolerabiles fortasse à Spiritu acido.

*R. Aq.*

R. *Aq. Hord.* ℥xx.*Fenic.* ℥i℥.*Spir. Vin. rectif.* ℥j.*Syrup. de Sennâ.* ℥iij.*Spir. Nitri.* ℥℥.*M. f. Julap. Sumat subinde haustum.*R. *Aq. Menth.**Fenic. ana.* ℥j.*Spir. Vin. rectif.* ℥vj.*Nitr.* ℥℥.*Laud. Opiat.* Gr. ij.*M. f. Mixt. Cochleat. assumenda.*

19. Jan. Paroxysmum habuit; amara copiose evomit; nihil deiecit; conqueritur de anhelatione & pectoris dolore.

R. *Aq. Hysop.* ℥ij.*Fenic.* ℥j.*Acet. Stillat.* ℥vj.*Spir. Vin. rectif.* ℥℥.*Ocul. Cancr.* ℥℥.*Antimon. Diaphor.**Bol. Armen. ana.* ℥j.*Syr. Quinq. Rad.* ℥j.*M. f. Mixt. Cochleat. sumenda.*

## CASUS LXIV.

9. Nov. **V**ir quidam febre erraticâ, & quidem aliquando quotidie, aliquando alternatim corripitur; frigus ipsum aliquando per 4. aliquando etiam per 2. hor. urget; calorem non sentit; frigus inter scapulas & lumbos est; intestina ipsi quasi convelluntur; alvus segnis est, nec sitit, nec sudat; aliquando æstum in intestinis sentit, nec non tormina.

Per 10. Septimanas malè se habuit, nec aliquid assumpsit medicamentorum.

A diuturnitate judicat Cl. Sylv. pituitam hic peccare, sed non solet tamdiu durare, nisi aliquid aliud jungatur, & cum tormina adfint, spiritus acidus jungitur; saporem nidorosum habet in ore, ergo bilis adest; pituita igitur peccat, & in ea aciditas. Bilem, dum alvus segnis, possumus purgare, aut prius alterare. Heri paroxysmum habuit.

R. *Gumm. Ammoniac. cum acet. præp.* ℥℥.*Mastic. el.* ℥j.*Chalyb. Præp.* Gr. xv.*Trochisc. Albandal.* ℥℥.*Ol. destil. Granor. Junip. Gutt.* vj.*M. f. Pilul. N. xxx.**Sumat 7. singulâ vesperâ sub horâ decubitus, si non febricitat.*R. *Aq. Fumar.* ℥℥.*Theriacal. simpl.* ℥iij.*Sal. Ammon.* Gr. xv.*Syr. quinq. Rad.* ℥℥.*M. pro haust.*

11. Nov. Per duos dies paroxysmum sensit, & hodie pilul. assumpsit, unde semel quidem, sed copiose deiecit.

13. Nov. Paroxysmum circa hor. quartam pomeridianam habuit; frigus duravit hor. 2½ calor etiam satis molestus fuit; assumpsit heri pilul. & inde ter deiecit. Paroxysmi certum non servant typum. Cras assumat iterum pilul. jam præscribemus Mixt. contrâ paroxysm.

R. *Aq. Fenic.**Theriacal. simpl. ana.* ℥℥.*Acet. stillat.* ℥iij.*Ocul. Cancr.* ℥℥.*Syr. quinq. Rad.* ℥℥.*M. f. Haust.*

## CASUS LXV.

**P**uella quædam 14. annor. per 5. septimanas variolis laboravit, & quia admodum debilis, huc in nosocomium est delata, ut ad pristinam redeat sanitatem. Assumat seq. Mixt.

R. *Aq. Fenic.**Petrosel. ana.* ℥j.*Acet. stillat.* ℥vj.*Ocul. Cancr.* ℥℥.*Antimon. Diaphor.* ℥j.*Syrup. quinq. Rad.* ℥℥.*M. & Sum. subinde Cochl.*

NB. Hanc Mixtur. valdè commendat Cl. Sylv. in variolis, eamque à principio ad finem exhibere jubet.

9. Nov. Benè se habet; habet adhuc quod assumat.

10. 11. & 12. Nov. Hisce diebus optimè se habuit.

Iterata fuit Mixtura 8. Nov. præscr.

## CASUS LXVI.

**M**ulieri cuidam de dolore oculor. conquerenti sequens collirium prescript. est, à quo summum levamen habuit.

Rx. Aq. Ros. alb. Ziss.  
Fenic. ʒb.

Sief. Alb. Sj.  
Viniq. Alb. Gs. ij  
M. & f. Collyrium.

Annotata quædam ex sectione cadaveris foeminae ejusdem Helenæ dictæ.

Pinguedo in abdomine multa reperiebatur, ad crassitiem pollicis transversæ, bonique & naturalis coloris; sed hoc mirum, quia intra quatuor septimanas nullum alimentum potuit assumere, quod tanta pinguedinis copia conspiciebatur. Omentum admodum pingue erat, ac naturaliter alias se habebat, nisi quoddam à parte inferiore circa umbilici regionem firmiter adhærebat peritoneo, & ubi vulnera in abdomine erant inflicta (quorum 7. aut 8. erant;) omenti pars se insinuaverat firmiter in illar. cicatrices.

Intestina quoad externam substantiam naturaliter se habebant, quoad colorem & conformationem, intestinum vulgò duodenum dictum 4. erat transversorum digitorum, antequam vergeret in latus sinistrum.

In intestino tenui ubi ductus pancreaticus & bilarius se exonerant, corrosio, partis ejus internæ observabatur, & omnia cruenta, quoad ejus substantiam internam cernebantur, multumque phlegmatis quasi purulenti ad cochlearia quatuor exhauriebatur.

Ventriculus flatibus distentus erat, nihilque in illo reperiebatur præter phlegma paucissimum ad quantitatem dimidii vix cochlearis; tunica inferior & interior ipsius ventriculi rubicunda & corrosa erat, signum ab acerrimo humore bilioso delato ad ventriculum, qui in superficie inferiori ipsius ventriculi vim suam magis petuit exercere, quam in intestino, ubi ductus bilarius insertus fuit, & ratio hæc est, quia in intestino tenui multum phlegmatis reperiebatur, quod contemperavit bilis acrimoniam; pars autem volatilis & acrior delata fuit ad ventriculum, ibique nihil reperiens, à quo contemperaretur, vim suam corrodende supericem, inferiori ventriculi tunica, exeruit.

Superficies ventriculi superioris tunica alio modo se habebat, ac albescebat plane, uti ferè solet naturaliter se habere.

Vesicula felleis admodum magna fuit, uti nunquam in sectione ullâ observavit Cl. Sylv. eratque obscuri lividiorisque coloris, & intestinum tenue & ventriculus tali colore tincti erant, cum illis partibus, quas attingit folliculus felleis.

Lien substantia erat durioris, quam naturaliter se habere debebat, & rubicundi planè coloris, ut epatis; epar autem naturaliter se habebat. Ductus bilarii & pancreatici insertio, quæ alias utplurimum in unum locum terminantur, in hoc subiecto ad latitudinem pollicis transversæ distabant.

Renes magni erant, alioquin benè dispositi. Capsula renales seu atrabiliaria, uti vulgò vocantur, tantæ erant, qualem magnitudinem nunquam observavit Cl. van Horne. NB. Nulla arteria definit in istas capsulas, sed ingens vas venosum conspicitur, quod signum est, ex capsulis deferri, non autem aliquid eis accedere; præterea nervi pertinent ad illas capsulas.

Capsula renis dextri penè triangularis erat, sinistri autem penè quadrangularis.

Vasa in uteri collum definita valde repleta erant sanguine & distenta.

Circa testes vesiculæ in utroque latere observabantur, quæ aquâ erant repleta.

Membrana pulmonum firmiter annexa erat pleuræ, aliâs pulmones benè se habebant.

Exiguâ in quantitate aut planè nihil aquæ in pericardio continebatur.

In utroque ventriculo cordis polypus, uti vulgò vocatur, reperiebatur instar frustuli carnis, magnaque in copia ex arteria magnâ & venâ extrahabatur.

Planè nullus sanguis in illis duob. vasis continebatur, & in singulis vasis sanguineis paucos contentus erat sanguis, nisi in vasis circa uterum.

In gulâ materia viscida flava reperiebatur, valdeque fetida. In capite omnia benè se habebant, & notata est in hujus subiecti esse frontis cavitates, dissecto se cranio, ubi immisso folio aërem per nares egredi observavit Cl. van Horne. Hoc itidem contingit in ossè sphenoidè, ex quo, si foliis immisus aër per nares quoque egreditur.

## CASUS LXVII.

**M**ulier quædam, quæ valde conquesta fuit de immensis & inextinguibilibus ventris doloribus post-

postquam ante 3. dies in nosocomium Leidense, ut sanaretur, delata esset, eodem die, quo eo deferretur extincta est, & hodie die 13. Nov. 1660. ejus cadaver cultro Anatomico subiectum fuit, in quo sequentia observabantur.

In infimi ventris apertione ostentam supra ventriculum non extendebatur, illudque firmiter peritonæo annexum erat; pinguedo in omnes fatis copiosa observabatur, sed admodum fæda.

Intestina omnia, præsertim tenuia valde rubebant, & tenuia intus etiam valde persusa erant bile rubicundi coloris, omnium autem maxime intestinum duodenum, & talis rubedo signum fuit insignis acrimonie, quâ bilis fuit præternaturaliter prædita, bilis hæc aquæ permixta flavescbat.

Ventriculus magnus erat, & ad digitum transversum infra umbilicum descendebat; phlegma in Ventriculo præter solitum viscidius erat; Ventriculi substantia interna valde rubebat, quod signum est inflammatum fuisse; & quo latere Ventriculus vesiculam fellis externè tangebatur, eodem colore infectus erat.

Omnia spumebant quæ circa Ventriculum & vesiculam fellis observabantur, signum bilis acris. Aqua rubens maxima copia in cavitate abdominis reperiebatur. Uterus totus in latus dextrum vergebat, qui naturaliter in medio cavitatis, in quâ hæret, situm suum observare debuisset; magna erat excrecentia in ejus parte posticâ tam dura, ut cultrum Anatomicum admittere noleret, illaque excrecentia planè ossæa erat. Uteri substantia quoque his crassior erat, quàm naturaliter debebat. Vesica longè crassior erat, quàm debebat, & ex parte erat ulcerosa totaque superficies ejus interna erat læsa. Renes longè majores erant, quàm debebant, cum dissecarentur magna copia sanguinis attri pure permixti effluebat. In cavitate thoracis magna quantitas aquæ sanguine tinctæ reperiebatur pulmonesque admodum turgebant, omniaque in thorace ita se habebant, sicuti in pectoris hydropse. Cor magni erat, & prope auriculam dextram macula alba reperiebatur quasi esset candelæ aliquâ catenula combusta.

Arteria magna tanta erat, ut parum discederet à magnitudine arteriæ bovis.

Quoad cerebrum, in eo omnia bene se habebant.

Itè tantæque ventris elevatione & coincidentia, ut minima adipiscentibus videretur, cùm autem ne verbum quidem proferre potuisset, & quomodo adiceretur, enarrare quivisset sequentia ipsi fuere præscripta.

Rx. Castor.

M. Fæda. ana. ℥ss.

M. V. f. Nodul. ex collo suspendendus.

Rx. Aq. Puleg. Zij.

Theriaca. simpl. ʒvj.

Ol. dest. Succin. Gutt. vj.

M. de ea Mixt. sumat sæpius Cochl. j.

9. Nov. Adhuc in eodem statu manet, nec loquitur, & quia ab exhibitis Medicam. nullum adhuc levamen sentit, de sequ. Mixt. sumat subinde Cochl. j.

Rx. Aq. Puleg. Zij.

Theriaca. simpl. ʒvj.

Ol. dest. Succin. Gutt. viij.

Syr. quinque Rad. ʒj.

M.

10. Nov. Aliquid levaminis hodie habuit, atmen nondum potest commode loqui, nec aptè intelligi, iteretur ergo Mixt. heri præscripta in duplo.

11. Hodiè iterum parum levaminis habuit, habet adhuc de Mixt. quâ utatur usque in crastinum.

12. 13. Nov. Paulò majus levamen jam sentit, iteretur igitur Mixt. in duplo 9. Nov. præsc.

14. 15. Nov. Adhuc majus levamen sensit, habet adhuc quod sumat.

16. Nov. Quia præcedentibus dieb. ob malum valde urgens ne verbum quidem potuisset loqui, & hodiè bene se habet, & quidem longè melius, quàm aliis dieb. narravit, se per 3. menses dolorem in lumbis sensisse, qui continuo perseveraverit; tumor & dolor dehinc excitati sunt in sinistro hypochondrio, postmodum malum infestavit Ventriculum, unde quasi palpitationes sensit; respiratio fuit difficilis, ut sibi in faucibus, aliquid hære videretur; cor anxium fuit; palpitationes molestas habuit, & quando palpitationes infestabant, se melius habuisse ab anxietate cordis testata est, quando cor palpitaverat velangebatur, sudor ipsi erumpebat.

Itaque ex his satis patet, affectum hunc esse suffocationem uterinam Medicis sic dictam, à flatibus ortam, quod patet, quia erumpentibus flatibus levamen habuit, humores autem illi ex curbus flatibus sunt excreti, admodum viscidii fuerunt, quia tam

## CASUS LXVIII.

ANcilla quædam, quæ insigni suffocatione uterari laborabat, cum sumâ respirandi difficul-

tam diu duravit malum, ut non faciliè dissolvi potuissent, locum & focum istius materiæ viscidae agnoscimus abdomen, & imprimis intestinum duodenum & Ventriculum, in lumbis enim sensit dolorem, & in ventriculo palpitationem, ex quo status emisit. Hysterica autem passio cum affectione hypochondriacâ maximè convenit, & differt ab hac in eo, quòd in hypochondriacâ affectione strangulatio non adsit. In curatione autem hoc præstandum, ut humores viscidî & tenaces incendantur, attenuentur, & ad evacuationem per epicrasin præparentur, quod sequi pilulis præstari potest.

R. Gummi. Sagapen. cum Acet. Præp. ʒ℔.

Castor. Opt.

Mastic. el. ana. ʒj.

Myrrh. Rub.

Chalyb. Præp. ana. ʒ℔.

Trochisc. Albandal.

Resin. Jalapp.

Resin. Scammon. ana. ʒj.

Ol. dest. Succin. Gutt. ʒj.

M. f. Pilul. N<sup>o</sup>. xxx.

Assum. quotidie. v.

Convaluit.

## C A S U S L X I X.

Mulier quædam per 5. menses febricitavit, & inde per 6. septimanas alvi fluxum continuum passa est, ut quæ assumpserat, non solum insipida ipsi viderentur, sed & eadem per inferiora statim rejecit; nausea adest; sitis magna; vires sunt prostratæ, maximeque frigit.

Hodiè 9. Nov. quater deiecit; itaque de seq. Mixturâ, quæ vires reficit, & moderatè adstringit, sæpius assumat Cochli.

R. Diascord. Fracast. ʒ℔.

Tinct. Cinamom. ʒiij.

Syrup. Myrtillor. ʒj.

Aq. Plantag. ʒiij.

M.

10. Nov. De Mixturâ per diem & noct. assumit; à quâ benè se habere testatur multumque levaminis sensisse; iteretur itaque illa Mixt. eaque frequenter utatur.

11. Nov. Alvi fluxus planè cessavit, assumat frequenter de Mixt.

12. 13. Nov. Optimè se habet, nullaque sym-

ptomata ampliùs urgent; conqueritur saltem de appetitu prostrato, in cujus restorationem

R. Elix. Propriet. ʒj.

Sumat Gutt. ʒj. & Cochleari cum vin. bor. dim. ante prand. & cænam.

14. 15. Nov. Optimè se habet, appetitus sensim redit, viresque restaurantur, habet adhuc quod assumat, de Elixir proprietat.

16. Nov. Omnia benè procedunt, nec ampliùs petit medicamenta.

## C A S U S L X X.

Vir quidam laboravit aliquando febre tertianâ continuâ, in quâ multum potus assumpsit; febre per dies aliquot remissâ inordinatè satis vixit, multoque potu se oneravit; paulò post incidit in summum totius corporis frigus, à quo immensæ laniationes in Ventre suboriuntur, inprimis in sinistro latere, Venter pedesque valdè tument; quando se ab uno latere in alterum movet, quasi humorem in ventre percipit. Febris adest erratica, & continuò frigit, ut non possit incallescere, vires admodum prostratæ; pulsus admodum debilis.

Ascites hydropis species appellatur, ortus à febre prægressâ, & potu nimia copiâ assumpto. Quia autem vir hic die 18. Nov. in nosocom. delatus est, nullumque medicamentum adhuc assumpsit, & signa, vix bonum futurum eventum demonstrant, quia vires valdè sunt prostratæ, seq. medicamentum ei exhibeatur, de quo singulis horis Cochli. j. assumat.

R. Aqu. petrosel.

Theriacal. f. ana ʒ℔.

Tinct. Cinamom. ʒvj.

Syr. quinque Rad. ʒj.

Spir. Nitri. Gutt. viiij.

M.

19. Nov. Omnia perversa in hoc ægro se ostendunt, ut parum de ejus salute sperandum sit; frigus continuum & summum ipsum urget, externæ autem partes calent, & in partib. externis calor sentitur acris; pulsus frequens est admodum & debilis, itaque ad instaurandas vires iteretur mixtura 18. Nov. præscr.

20. Nov. Hodiè vitam cum morte commutavit.



## CASUS LXXI.

**V**etula quædam conqueſta eſt admodum de dolore in miſtione, exulceratum enim eſt collum veſicæ, & à nullo medicamento majus levamen ſenſit, quàm à pilul. ſequ.

Rx. *Maſſ. Pil. de cymegloſſ. ʒʒ.*

*F. pilul. N<sup>o</sup>. LX.*

*Aſſumat ſingulis bihoriis j.*

6. Jan. 1661. Conqueſta eſt de immenſis ventris dolorib. incipientibus à lumbis, & verſus pedes tendentibus, præ illis quieſcere non poteſt; alvus ſatis libera eſt, itaque de ſequ. mixturâ ſubinde cochl. j. aſſumat.

Rx. *Aqu. petroſel.*

*Fenic. ana ʒj.*

*Acet. ſtillat. ʒvj.*

*Ocul. Cancr. ʒʒ.*

*Laud. Opiat. gr. ij.*

*Syr. quinque Rad. ʒj.*

*M.*

5. Jan. Multum levaminis habuit à mixturâ.

## CASUS LXXII.

**V**ir quidam de febre erraticâ conqueritur, quæ ipſum jam aliquando duob. trib. quaterniſve dieb. invaſit, & cujus frigus per duas aliquando tres quatuorve horas durat, nec valde urget; quando paroxyſmus ingruit, circa lumbos frigus ſentit; de dolore ventris etiam maximè conqueritur, ut omnia ſibi dilacerari in abdomine videantur (hæc autem omnia in frigore percipit,) per 10. ſeptimanas malè habuit, nullo adhibito medicamento; alvus ſegniſ eſt, & ſapor nidoſus in ore percipitur; urina craſſa; pulſus celer, nec adeo debilis.

*Explicatio cum curatione.*

Vir hic febre erraticâ laborat, quod ex caſu ſuperflue patet; primario afficiuntur inteſtina, quod dolor illorum maximè evincit; ingruente paroxyſmo afficitur quoque cor, delatâ ſcil. materia ad ipſum, ibique irritatione inſtituente febrilem.

Cauſa autem videtur eſſe humor pituitoſus ſub-

acidus & bilioſus qui ſibi invicem miſti ſunt. Pituitam in vitio eſſe evincit affectus in longum tempus protractus, & frigus illud, quod maximè præ calore ſentit æger. Bilem quoque in vitio eſſe, indigitat calor, quem remiſſo frigore æger percipit, ut & nidoſus ille ſapor, per totum os diſperſus.

Quòd autem febris hæc mox 2. tertio aut quarto die ſe manifeſtat, id eſt partim à diſpoſitione humoris quantitate aut qualitate peccantis, ſi nimirum ita diſpoſitus ſit hoc vel illo die, ut fluxilis reddatur, partim à diſpoſitione viarum, per quas deſertur ad cor, ibique febrem cauſat.

## CURATIO.

Quia hic æger nullum remedi. in ſui auxilium aſſumpſit, & hæc die in Noſocomium delatus eſt, qui dies eſt intermiſſionis, pilul. ſequ. ordinatæ fuerunt, de quibus quinque horâ 6. vespertinâ aſſumpſit; eodem modo ſingulis intermiſſionis dieb. procedente, quando commodius ipſi videatur tempus, ſive conveniens id ſit, ſive manſive vesperti; & in hunc finem potiſſimum ordinatæ ſunt, quia alvus erat ſegniſ.

Rx. *Gumm. ammon. c.*

*Acet. præp. ʒʒ.*

*Maſtich. el. ʒj.*

*Trochiſc. albandal. gr. xv.*

*Ol. deſt. gran. Junip. Gutt. vj.*

*M. f. pilul. N<sup>o</sup>. xxx.*

*Dof. N<sup>o</sup>. V.*

Hæ pilul. maximè incident & attenuant humores viſcidos & lentos.

Ingruente paroxyſmo aſſumat ſeqn. hauſt.

Rx. *Aqu. ſumar. ʒʒ.*

*Theriaca. ſimpl. ʒijj.*

*Sal. Armoniac. gr. xv.*

*Syr. quinque Rad. ʒʒ.*

*M. f. hauſt.*

NB. Sudoris cauſa eſt primò Aër, ſi calidus & humidus qui maximè ſudorem promovet. 2. Alimenta, ſi calidè adhibeantur. 3. Motus corporis omnis, ut & animi, iſprimis qui ſunt conjuncti cum aliquâ ſollicitudine. 4. Excreta & reſtenta; ſi quis adſtrictioris ſit alvi, aut urinam non debito modo excernat. 5. Somnus magis facit ad ſudorem, minus autem vigiliæ. Itaque his omnibus benè penſitatis cauſis in genere tranſeundum ad cauſas ſpeciales ſudoris. in hoc ægro, in quo prædictæ cauſæ locum habent, & humo-

res redditus volatiliores & fluidiores, factâ scilicet ebullitione, unde moti sunt humores & foras propulsi, & in illis, qui valde sudant, notatur febricula, pulsus enim celer, & magnus deprehenditur à sanguinis rarefactione; & observandum non esse commodum listere subito sudorem, sed potius temporis tractu hoc fieri debet.

## CASUS LXXIII.

**V**ir quidam per 15. dies febre tertianâ continuò laboravit, accedente paroxysmo frigus à lumbis incipit, & dehinc per totum corpus dispergitur; tremor artuum adest; primis dieb. dolorem pectoris in sinistro latere sensit, jam verò die 8. Nov. cum in nosocomium delatus esset, dolorem lateris dextri persentiscit; nulum calorem percipit, sed frigus cum insigni tremore, frigore autem remisso, tremoreque cessso, capitis dolor adest, tantusque ut omnia aspecta ipsi duplicia videantur, item post tremorem incalescentiam in corde instar ignis urentis percipit, nullo manifesto in aliis corporis partib. calore; fitis adest magna; pulsus celer & frequens; & urina turbida.

## EXPLICATIO.

Febrem hanc tertianam esse patet ex casu, afficitur autem cor, causaque febrem excitans est humor pituitosus & biliosus, prævalet autem pituitosus.

Die 25. Nov. Mane hor. 3. paroxysmum habuit; frigus fuit blandius, duravitque per duas horas; leve frigus fuit in regione lumborum; remittente frigore in crurib. tantus est excitatus dolor, isque lancinans, ut non potuerit incedere, durans per 3. cujus causa videtur esse aut spiritus acidus, aut sal lixiviosum, delatum ad cruris partes sensibiles, non autem à sale lixivioso dolorem dependisse, sed potius à spir. acido, his rationibus probat Cl. Sylv. quia dolor fuit lancinans & duravit per 3. hor. si enim à sale lixivioso fuisset, vix horam excessisset. Hoc patet in ulcerib. fordidis, quæ si probè à fordib. liberentur, & spiritu Vitrioli eluantur, dolor est acerrimus, qui tamen vel ad hor. 3. vel nonnunquam ad integrum diem extenditur; quod non fit à sale lixivioso baritonorum; quod nihil aliud est, quam sal lixiviosum, ubi dolor nec horam excedit. 2. Dolor, qui à spir. acido excitatur, lancinans & acerrimus est, qui autem à sale lixivioso, urens est, citoque cessat; quod ex-

perimentum etiam licet observare in ulceribus fordidis; quia autem dolor ille ægrum non amplius urget, idè iteretur haust. in mox præcedente casu præscriptus.

13. Dec. Dolores sentit magnos in intestino colo & tum quidem, quando dejicere vult, ut & aliquem calorem in illo intestino; excrementa quæ dejicit, durissima & valde calida sunt, causa hujus doloris videtur esse acrimonia istorum excrementorum, vellicans ipsum intestinum, & quia admodum dura sunt, distendunt primum, unde molesta sensatio; præterea non improbabile videtur, esse quandam exoriationem in illo intestino, quia dolorem tantum in illo percipit, & non in aliis, assumat ergo de sequ. decoct. subinde haustum.

R. Rad. alth. ʒij.

Fol. malv.

Bismalv. heder. terr. ana Mj.

Tamarindor. ʒj.

Horð. mundat. ʒß.

Cogn. ex aqu. pur. in Colatur. ʒxxx.

Dissolv.

Syr. de Rhab. simpl. ʒiij.

M.

14. Dec. A decoct. quinquies dejecit, prima dejectio fuit cum dolore aliquo, ob excrementorum durtiem, reliquæ fuerunt sine dolore; multaque aquosa dejecit; non sensit hodiè paroxysmum, sed satis benè se habuit. Habet adhuc decoct. de quo cras iterum sumat haustum.

## CASUS LXXIV.

**M**ulier quædam ante tres dies malè se habere cepit, à quo tempore febricitare incipit, alvusque per illud tempus fuit constipata; calor viget continuò, sed non adeò magnus est. Quia autem hoc malum Belgis familiare est, & in quibusdam solo purgante aliquo medicamento curatur; itaque quia alvus est segnior, cras sequ. haust. assumat.

R. Eleâ. Chologog. ʒiij.

Aqu. Bethonic. q. s.

Pro haust.

8. & 9. Dec. His diebus speciem salivationis habuit; continuò enim os salivâ disfluebat, & uti Cl. Sylv. observavit, id sæpius contingit, nam tali modo morbi solvuntur.

18. Dec. Conqueritur hodiè phlegmata viscida &

& amara semper in ore ipsius colligi, ut nesciat, unde illa proveniant; quorum causa est permixtio bilis, quia per modum halitus sursum ad os ex ventriculo ascendit, ibique salivæ permixta illam inspissat, & hoc patet exinde magis, quia ante aliquot dies, cum malè se admodum haberet, valdeque debilis esset, salivationem tanquam erian aliquam passa est, à quo tempore melius se habere cepit, & quæ hætenus nondum plane cessavit, & quia salivæ, quæ in salivationibus etiam viscida est, bilis permiscetur, magis in-  
crassatur; & quia illa salivatione materia tanquam per modum erisole se exonerat à vitiosis humoribus, non temerè illa impedienda est, sed bilis, quæ motu peccat, corrigenda.

## CASUS LXXV.

AN. 1661. 11. Nov. **A** Neilla quædam per aliquot septimanas scrophulis in collo, quæ illud totum circumcingebant, laboravit, ad cuius curationem tales præscriptæ sunt pilul.

*R. Gummi. Galban. c. acet. præp. ʒß.  
Myrrh. Rub.  
Mastich. cl. ana ʒj.  
Chalyb. præp.  
Castor. opt.  
Croco. orient. ana ʒß.  
Trochisc. Albandal. ʒß.  
Resin. Jalapp. ʒj.  
Ol. dest. gran. Junip. Gutt. viii.  
M. f. pilul. No. lx.  
Assumat singulis dieb. v.  
Præterea imponatur singul. dieb. empl. diachyl.  
c. gummi.*

A die 10. usque ad 20. assumpsit singul. dieb. quinque pilul. & semper commodè purgata fuit semper quater aut quingies.

Hodiè die 21. Nov. conquesta est de dolore capitis & cardialgiâ; pulsus satis debilis; noctu non potest quiescere; itaque sequ. medicamentum assumat coactilem, & inprimis sub vesperam.

*R. Aqu. Menth.  
Lonic. ana ʒj.  
Tinct. Cinamon. ʒß.  
Laud. Opiae. gr. ij.  
Syr. quinque Rad. ʒjß.  
M.*

22. Nov. Benè se iterum habet, cras iterum utatur pilulis.

23. 24. Commodè hisce dieb. deiecit à pilul. & benè se habuit. Habet adhuc pilul. quibus utatur.

25. Nov. Hodiè conquesta est de angustia cordis, quasi cor opprimeretur aquis, & funiculo quasi suspensus esset; multum salivæ ex ore effluxit, cuius causa potest esse, quia scrophulis in collo laborat, ubi glandulæ affectæ sunt, glandulæ autem, uti notum est, scitent humoribus; itaque quia hætenus medicamentis adhibitis humores viscidis magis soluti sunt, & perveniunt jam ad Ventriculum, magnaque copiâ confluunt, viscidisque humoribus in eo hærentibus permiscuntur, ac quasi aquis opprimi videtur, in primis quia salivæ etiam magnâ in copiâ ad Ventriculum defertur; itaque ut humores in Ventriculo hærentes educantur, cras manè sequ. assumat haust.

*R. Elæst. Hydragog. ʒij.  
Agu. Janic. ʒ. ʒ.  
Pro haust.*

Hodiè conquesta est de dolore primò in lumbis, oriente, deinde ad sinistrum hypochondrium vergente; cum levè frigore incedit dolor, quod frigus subsequitur leviss calor, quæ symptomata levem testantur febrem; dolor fuit tendinosus, vergens à lumbis in sinistrum latus, causa fuit pituita in intestino tenui bili permixta, quibus humoribus effervescentis status excitati sunt, qui dolorem illum causerunt.

1. Dec. Conquesta est de angustia circa ventriculum, & sibi esse, quasi in animi deliquium incidere veller, à vaporibus sursum ad cor ascendentibus.

23. Dec. Melius se habuit, sed 24. conquesta est de dolore hypochondriorum, inprimis sinistri; & de angustia circa præcordia, itaque cras secetur vena in pede, sanguisque mittatur ad ʒijj. vel v.

Benè se habet post Ven. sect.

## CASUS LXXVI.

9. Nov. & 10. Anno 1669.

**F**œmina quædam de dolore faucium maximè conquesta est, erant enim tumidæ & rubicundæ, ut difficulter deglutire posset, talem igitur gargarismum ipsi præscriptit Cl. Sylvius.

*R. Aqu. bord. ʒvjii.*

*Mell.*

*Mell. Rosat. colat. Ziſſ. olei mul. biupit.*  
*Lapid. prunell. Bijiſſ. ov. meiſſ. cou. lo.*  
*M. f. gargariſm. quo ſapius gargariſcentur fau-*  
*ces.*

2. Dec. Ab aſſumto pharmaco hydragogo quin-  
 quies deſecit, quæ excrevit aquea fuerunt, & ante meridiem malè ſe habuit, ubi aliquid ex  
 Ventriculo ad gulam uſque aſcendit aquei viſci-  
 dique humoris, quem tamen exſpuere non pote-  
 rat, ſed deglutire coacta, cujus cauſa ſunt vapo-  
 res viſcidi ex Ventriculo elevati, qui aliquam  
 viſciditatem in ſe habuerunt, ut commodè illas  
 non poſſet excernere; leviſſimam habuit fe-  
 brem, habet adhuc mixturam, quâ utatur.

16. Dec. Hæc nocte horâ quintâ habuit paro-  
 xyſm. ubi tres hor. ante paroxyſmum frigus &  
 dolorem ſenſit in capite, qui dolor poſtmodum  
 quaſi è capite in lumbos deſcendebat, cauſa eſt  
 difficilis, tamen conjicere licet, fuiſſe humorem  
 frigidum in capite hærentem, & ſecundum du-  
 ctum nervorum delatum per ductum dorſi verſus  
 lumbos; cum paroxyſmus invaderet, frigus mo-  
 leſtum per tres hor. ſenſit; in regione lumborum  
 primò, & deinde per totum corporis habitum  
 diſperſum; internè quidem frigeſcebat, externè au-  
 tem calebat; frigus hoc ſubſecutus eſt calor, qui  
 etiam moleſtus fuit, & valdè ſtivit, & duravit  
 paroxyſmus per totum diem.

Ad eliciendam materiam frigidam & viſcidam  
 è capite, in nares immittat folium nicotianæ,  
 quod ſine cerebri perturbatione humores è ca-  
 pite prolicet.

26. Nov. Heri circa hor. nonam quaſi novum  
 paroxyſmum ſenſit, ſed ſine frigore & calore;  
 horum vice verò dolor lancinans ac terebrans ar-  
 tus tam ſuperiores quàm inferiores, per ſequi  
 horam invaluit, in interioribus autem nullum ſen-  
 ſit dolorem, ubi tunc in ſudorem incidebat, ex-  
 terioresque partes calore tunc ardebant, & tunc  
 dolor remiſit, & in ſomnum incidit, ex hoc ex-  
 pergeſacta optimè ſe habuit, & tali modo, ut  
 quaſi tota ſana eſſet, nec hodiè amplius quid in-  
 commodi ſenſit. Cauſam hujus doloris Cl. Syl-  
 vius fuiſſe ſuſpicatur bilem cum ſpiritu acido per-  
 miſtam, qui humores paroxyſmo febrili moti de-  
 lati ſunt ad partes corporis externas, ubi tunc  
 cum mediante ſudore pori cutis fuerunt aperti,  
 diſcuſſi ſunt, & tunc dolor remiſit, & bonum  
 Cl. Sylv. ſignum putat eſſe, quod materia febriliſ  
 ad partes exteriores deſeratur, quia autem jam  
 nihil incommodi patitur, iteretur hauſt. ſequ.

*R. Aqu. fumar. Ziſſ.*  
*Theriaca. ſ. Ziij.*

*Sal. armoniac. gr. xviij. olei nucis j. j.*  
*Syr. quinque Rad. Ziſſ.*  
*M.*

30. 31. Nov. Hiſce dieb. non ſenſit febrem,  
 ſed conqueſta eſt de dolorib. Ventris ſub um-  
 bilico, qui dolores durant per horam, & tunc  
 ſecedunt; ſtatus non emittit, nec venter tumet,  
 ergò à materiâ viſcidâ in quâ latet ſpiritus aci-  
 dus, cui materiæ viſcidæ accedens bilis efferve-  
 ſcentiam cauſat, & tunc magis ſolvuntur illi hu-  
 mores acres, doloremque efficiunt.

7. Dec. Heri veſperi ſenſit febrem, frigus non  
 grave fuit, ſed durante frigore dolorem ſenſit  
 quaſi conquaſſantem artus, quem primò ſenſit  
 in lumbis, cujus cauſa fuit humor vitioſus acris  
 efferveſactus in inteſtino tenui receptus in vaſa,  
 propulſus ad partes artuum ſenſibiles five perio-  
 ſtia dolorem contudentem inſtituit, & ex tu-  
 more illo ſanguine permixto halitus & ſtatus  
 quoque potuerunt excitari, unde dolor non con-  
 tinuus fuit, ſed intermittens. Et notandum, quia  
 hæc ægra eſt melancholica & primo tempore fe-  
 bre quartanâ laboravit, quæ jam planè vaga fa-  
 cta eſt, curari tamen debere ut quartana.

## C A S U S LXXVII.

**V**Ir quidam de febre quartanâ, dolore par-  
 tium externar. & ſummo frigore conqueri-  
 tur; partes corporis ſunt debiles, externæ ſcil.  
 & tremor illas infeſtat, inter omnia medicamen-  
 ta ſudoriſera ei fuerunt exhibita, quia maximè  
 pronus erat ad ſudorem; primis diebus benè ſe  
 habuit, poſt adhibita ſudoriſera, itaque quia die  
 9. Nov. in noſocomium fuiſſe delatus, ut priuſ  
 curaretur, ad relata ejus Cl. Sylv. ſequ. ſudori-  
 fer. ei præſcriptiſt.

*R. Aqu. Card. bened. Ziſſ.*  
*Theriaca. ſimpl. Ziij.*  
*Antimon. diaphor. gr. viij.*  
*Syr. papav. errat. Ziſſ.*  
*M. pro hauſt.*

14. 15. Nov. Febris quartana ſerè ſublata eſt,  
 hæc 15. Nov. nocte levem ſenſit paroxyſmum;  
 jam de anguſtiis & tenſione hypochondriorum  
 conqueritur, & de ingenti tuſſe, ut lachrymæ  
 ex oculis erumpant, quando tuſſit; poſt cibum  
 aſſumtum tuſſis illam maximè aſſigit, & adeò,  
 ut ſedere cogatur, cujus cauſa videntur eſſe ha-  
 litus è Ventriculo ſurſum aſcendentes, itaque ſta-

statim post cibum assumat pilul. j. de sequ.

R<sup>2</sup>. *Mass. Pil. de Cynagloss. Dj.*

*F. pil. No. VIII.*

20. Nov. Anhelosè respirat, cujus causa videtur esse materia viscida per pulmones circulata, status excitans, hinc sanguinis motus segnior, unde pulmones commodè dilatari non possunt, præparetur itaque decoctum de quo sæpius in die haustum assumat.

R<sup>3</sup>. *Rad. Apii.*

*Levistic. ana ʒ℔.*

*Baccar. Tump. ʒj.*

*Rasur. lign. Guaiac. ʒij.*

*Sem. anis.*

*Fæmie. ana ʒij.*

*Coqu. ex aqu. par. f. a. in Calat. ʒxxx.*

*Dissolve.*

*Syr. Mentb. ʒij.*

*Spir. Vin. redif. ʒij.*

*Nitr. Dj.*

*M.*

21. 22. Nov. A decocto levamen habuit, & commodè potest respirare, tussiendoque ejicere phlegmata.

25. Nov. Hodie paroxysmum non sensit, & in omnibus melius se habet; per os ejicit phlegmata pura; de terrore tantillo, qui ipsi in somno contingit, conqueritur, terror autem à spir. acido ad partes sensibiles cerebri per intervalla delato provenit; quia autem spiritus ille acidus contemperatione indiget, præstare autem hoc potest mixtura superius præscripta, idè iteranda est.

28. 29. Heri 28. Nov. habuit febrem, ut & hodie, sed hodierna non tam gravis fuit, qualis hesternæ; in hesternâ nullum sensit frigus, nec calorem; sed loco horum per 4. hor. perpetuò ascitavit, & hodie per sesquihoram cum anhelosâ respiratiõe, cujus causa fuerunt halitus è Ventriculo ascendentes, & quia oscitatio est symptoma respiratiõis (respiratio enim est intercepta quando ascitamus,) & halitus illi mediante aëre in pulmones inspirando ingrediuntur, & tunc pulmones halitus illos excludere coguntur; quamdiu autem tales halitus sursum ascendunt, & tali modo ad pulmones veniunt, tamdiu oscitationes sunt, si autem halitus illi sanguine permiscantur, ac ad partes musculosas deferuntur, pandulationes contingunt.

30. Nov. Hodie habuit febrem horâ primâ, quæ tali modo invasit, uti hesternæ, primò enim

aliquid sursum ascendere sensit, unde oscitationes; sed non tam vehementes & diuturnæ ut hesternæ; & præterea quoque levem vertiginem sensit; anhelosâ fuit respiratiõ, & tussis urget; oscitationibus & vertigine remissis fatigationes & dolores pungitivos per 3. hor. in manibus & pedibus sensit, ut quasi defatigata talia membra essent, cujus causa fuit materia viscida delata sursum, & deinde cum sanguine ad partes musculosas pedum & brachiorum.

Viscidam fuisse materiam constat, quia per duas hor. tales dolores duraverunt.

1. Nov. Hodie benè se habet; conquestus est saltem de dolore, quem sensit in urinâ reddendâ per totum urethræ ductum, retulitque hoc malum sibi familiare esse, & hoc accidisse ei sæpius, quòd nonnunquam per quinque dies non potuerit reddere urinam, sed quando eam iterum reddere potuisset, passum tunc fuisse urinæ stillicidium, ut sæpius mingere coactus fuerit, & una vice ultra tria cochlearia urinæ plena non emisit; & quæ urina post ischuriam illam emissâ erat, ita stetit, ut nemo talem ejus potuisset ferre odorem, ea verò quæ postmodum reddita est; non stetit, & urinæ sedimentum tunc fuit purulentum, ut ipse narravit, hocque malum passus est, antequam delatus fuit in nosocomium; sed jam tantummodò conquestus est, de dolore in redditiõe urinæ, non autem de illis, quæ ipsi antea acciderunt, & cum illud malum sensit, dolorem passus est in regione lumborum, & urina magis fœtebat, quando calebat, & causa hujus ischuriæ fuit, obstructiõ in renibus à sanguine viscido, qui aliquid in se habuit, ut potuerit constringere meatus in renibus, hinc sanguis ille diu subsistens denique purulentus factus, & sensim resolutus guttatim excretus est. Cum autem lotium suum hic æger non asservavit, curret ut id asservet.

17. Nov. Hactenus paroxysmum sensit quotidie, à præterito die duodecimo usque ad hunc diem, circa vesperam hor. 7. invadentem, & hodie ille hor. 12. pomerid. illum passus est, cum tensione in regione lumborum, & dehinc totius abdominis, per quatuor dies tumuit abdomen, sed magis in paroxysmo, qui tumor remisso paroxysmo cessat; signum est, status in frigore excitari, unde tumor, in superficie corporis dolorem sensit, non autem in interioribus partib. quod bonum est signum, indicat enim causæ mortificæ translationem versus partes exteriores, lingua obducta est phlegmate. Hodie hor. 10. matutina habuit febrem; antea frigus in præcedentib. paroxysmis molestum fuit, jam autem calor; & sensit dolorem capitis & ardorem in plan-

tis pedum; assumfit hodiè manè pilul. sed non dum aliquid præstiterunt; & hoc sæpius contingit ut superveniente paroxysmo febrili vis medicamenti abundatur; & si operantur, hoc præstant finito paroxysmo, & huius causa patet ex inde, si consideretur, quid in principio paroxysmi moveatur & Cl. Sylv. putat febrium omnium intermittitum sedem esse pancreas, ex quo spiritus acidus; qui secerunt in pancreate, per ejus ductum deferuntur, ad intestinum tenue, hinc sese jungit pituita; quæ semper in intestino illo est, & bilis, quæ per ductum biliarium ed deferuntur, effervescentia fit; (ubi hoc patet ex symptomatibus, qui prodeunt in paroxysmo) & ita vis medicamenti à copiâ spiritus acidi impeditur, & quod major ejus copia est, ed quoque gravius est frigus; inde coagulatio: quasi fit purgantium medicamentorum, quæ scaten sale volatili ac spiritu acido; superveniente autem calore sensim fit attenuatio; & hinc sub finem paroxysmi operari incipiunt.

29. Nov. Melius se habet, quam aliàs; appetitus, qui planè fuit prostratus; rediit; adhuc gr. ij. de sal. suo volat. fixato Cl. Sylv. ei exhibuit; post quæ sensit primò dolorem in lumbis, deinde magnam perturbationem in toto corpore, ut omnia susque deque moveri ipsi viderentur; aliquoties in illâ perturbatione nauseabundus fuit, & quasi vomere vellet, sed non potuit, semper enim quando ad vomitum hodiè proclivis fuit, deorsum aliquid deglutire coactus est; appetitus indies magis redit, & odoratus, qui fuit depravatus per quinque dies etiam hesternò die & hodiè ad naturalem statum magis magisque pervenit; Cras iterum gr. ij. de sale illo Sylv. assumat. Iterum ex iis perturbationem sensit, primò in lumbis totoque Ventre & reliquo corpore; ut omnia in toto corpore mutata fuerint, postea bis alvum deposuit; excrementa fuere planè naturalia, & optimè se jam habet; & quidem ita; qualiter ipsi nunquam fuit per biennium, quod ipsemet retulit.

## CASUS LXXVIII.

**A**ncilla quædam viginti quatuor annor. ante aliquot septimanas in regione lumborum sensit frigus, quod de hinc per totum corpus dissepergebatur, duravitque per sesqui horam, frigus deinde calor est subsecutus, qui duravit per quinque hor. pulsus fuit celer ac inæqualis; quando calor ingruit, capitis dolorem sensit; & hæc symptomata de quarto in quartum diem recurrunt; hæcenus nulla adhibita sunt medicamenta, hodiè au-

tem 10. Nov. in nosocomium, ut ad pristinum rediret statum, delata est.

## EXPLICATIO.

Febrem quartanam esse, quâ ancilla laborat, satis patet, ex typo symptomatum, de quarto scil. in quartum diem recurrentium.

Causa autem istius frigoris, quod primum in lumbis sentitur, est biliosi & pituitosi humoris effervescentia in intestino duodeno; in illud enim intestinum duæ sunt insertiones, videlicet ductus biliaris & pancreaticus, hinc concurrentibus illis humoribus & illis, qui jam in intestino hærent, effervescentia fit; & quia primum frigus persensit hæc ancilla, pituitam prædominare signum est, hinc materia illa ad cor delatâ irritans illud, unde pulsus celer est, etsi frigeat valde; nam sæpius pulsus celerem deprehendimus in febricitantibus, etsi frigus illos summè urgeat; ad caput autem delata materiâ vitiosa capitis dolor ortus est.

Conquesta est die 24. de sanguine ex gingivis minimo illorum tactu effluente, itaque præscribatur gargarismus, quo sæpius os colluatur.

R. Rad. bistort. ʒij.

Fol. salo.

Flor. Ros. rub. ana Mj.

Sem. levisic. ʒj.

Alum. crud. ʒij.

Coqu. ex aqu. pur. add. sub. fin.

Acet. vin. ʒij.

In colatur. ʒxxv. dissolv.

Mell. Rosac. ʒiſs.

M.

21. Nov. Hodiè conquesta est de dolore capitis, retulitque se vermes aliquot per alvum dejecisse, itaque cras sequi pulv. in cochli. cerevis. assumat.

R. Sem. Zedoar. ʒj.

F. pulv. subtilissimus.

17. Jan. sequ. anni. Hæcenus optimè se habuit, nullumque incommodum sensit, nisi quia tempus fluxus mensium instat, qui fluxus non contingit ex obstructione, cum sanguis è narib. copiose efflueret, incidit in tumorem & dolorem capitis, instat erysipelatis, & hoc contingit in iis, quibus menses debito tempore non fiunt, unde sanguis versus aliam partem deferri necesse est; alvus est laxa, itaque sequens sudorifer. circa vespèram assumat.

R. Aqu.

R. *Aqu. puleg.* ℞.  
*Theriaca.* ℞. ℥ij.  
*Antimon. diaphor.* ℞.  
*Syr. arthemis.* ℞.  
*M. pro haust.*

18. Jan. Assumit sudorifer. & inde valde sudavit, dolorque capitis diminutus est, atamen egregie adhuc tumet, & rubet; pulsationes in temporibus sensit, oculos non potest aperire propter tumorem, laborat enim vero Erysipellate in capite, itaque in sequ. liquore humectetur lint. quod deinde faciei imponatur, & si exsiccatum sit, iterum humectetur, & hoc iteretur aliquoties; quod si autem liquor iusto crassior sit, aliquid vin. affundi potest, & probe misceatur. Liquor est sequ.

R. *Theriaca.* vet. ℥ij.  
*Vin. alb.* lb. i.  
*M. Optime.*

Præterea quoque egregia est sequ. mixt. in hoc casu, de qua subinde cochl. j. assumat.

R. *Aqu. petroscl.*  
*Fenic. ana* ℥i℥.  
*Acet. stillat.* ʒvj.  
*Ocul. Caner.* ℞.  
*Syr. quinquæ Rad.* ʒvj.  
*M.*

19. Jan. Paulò melius se habuit; conquesta est de ingenti siti, & non mirum, quia febris simul adest, itaque sequ. decoct. sitim sedat, sudorem enim movet, & alterat, pro lubitu subinde haust. tepide sumat.

R. *Rad. Scorigoner.* ℞.  
*Baccar. Junip.* ℥ij.  
*Rasur. C. C.* ℥ij.  
*Sem. aquileg.* ℞.  
*Coqu. ex aqu. pur. ad*  
*Colatur.* ʒxxx.  
*add.*  
*Syr. papav. errat.* ℥ij.  
*Spir. nitr.* ℥ij.

20. 21. 22. Tumor in facie sensim imminuitur, & paulò melius se habet; valde sitit, iteretur ergò decoct. 19 præser.

CASUS LXXIX.

Vlt. quidam annos natus circiter 32. temperamenti calidi & humidus ab anno decimo puritatis hæmorrhagiæ narium usque ad hoc suæ ætatis tempus subiectus, talem hæmorrhagiam post nimiam fatigationem à labore expertus est; ante quatuor autem septimanas in tantam incidit hæmorrhagiam, ut vix sisti potuisset, à quo tempore tussis ipsam invasit, ut plenas manus cruenti sanguinis primis diebus excreverit, & per aliquot dies accidit, ut excretiones cruentas per 10. dies per alvum passus sit, & ab ejusmodi excretionibus quasi in animi deliquium incidit. Ab eo tempore regio Ventriculi tumescere incepit; appetitus fuit prostratus; post cibum statim in tussim incidebat, ut omnia quasi evomere coactus esset; exhibitum ei fuit vomitorium, à quo evomuit viscida, viridia & amara; tussiendo autem vel vomendo excrevit sanguinem ex pulmonibus; cum alii non sentiunt frigus, ille friget, & ab injuriâ minimâ aëris offenditur; ingentem calorem ferre non potest, sed moderatum; dejectiones mordent ipsi intestina. Post hæmorrhagiam & tussim Ventriculi tumor remansit, cum dolore conjunctus, qui magis turget & urget post cibum assumtum; saliva satis crassa est; ructus aliquando post cibum potumque affurgunt, & tunc melius se habet; facies admodum pallida est.

Affectus hic multi sunt & complicati, qui omnes ortum duxere ex largâ hæmorrhagiâ præcedente, ex illâ enim sanguis acrior potuit in pulmones exstillare, ibique irritationem instituens tussim excitare, quod patet ex sanguine cruento, quem mediante tussi excrevit; sanguis præterea potuit colligi ex largâ illâ hæmorrhagiâ in Ventriculi cavitate, ibique cum aliis humoribus permisceri & subsistere, unde tumor Ventriculi, & ex materiâ illâ viscidâ sanguineâ provenit, ut alimenta assumta mox in acrem & viscidam materiam à Ventriculo convertantur, unde à Ventriculo irritato rejiciuntur per vomitum alimenta assumta, & ex sanguine illo tum copiam tum qualitate acri potuerunt oscula vaforum in intestinis erodi unde cruentæ & dolorificæ dejectiones, ventriculi dolor; quia autem pars oleosa & spiritusosa per largam hæmorrhagiam & sanguine assumta est, hinc minimas aëris injurias ferre non potest; Tussis & tumor ventriculi, qui post hæmorrhagiam remansit, à materiâ pituitosa & viscidâ tenaciter ventriculo impacta pendet; ructus,

ctus, qui post cibum assurgunt, proveniunt, quia fermentatio in ventriculo quidem inchoatur, sed à copia materiae viscidae non potest convenienter ac debite perfici, unde ventriculus distenditur, ructusque proveniunt; pallor faciei praeterea notatur, à partibus serosis & pituitosis sanguini permixtis.

### CURATIO.

Quia appetitus prostratus est, & tussis maxime urget, exhibeatur sequi. medicamentum, quod humorem viscidum flatibus permixtum & in ventriculo fixum haerentem paululum emendat; primo igitur loco assumat Elix. propriet. 3j. de qua assumat Gutt. viii. ante cibum.

Ad humorem viscidum emendandum praescribatur sequi. pilul. de quibus singulis dieb. v. assumat, non neglecta hor. j. ante cibum Elix. propr. assumptione.

Rx. Gummi ammoniac. c. acet. praep. 3℔.  
Mastich. el. 3j.  
Salis Tartar. Vitriolat. gr. xv.  
Myrrh. rub. 3℔.  
Croc. Britani. gr. vj.  
Aloës. Rosat. 3℔.  
Resin. Jalapp. ana 3j.  
Ol. dest. Junip. Gutt. viij.  
M. f. pilul. No. xxx.  
De quibus hinc vespere v. assumat.

19. Nov. A pilul. heri vespere assumptis ter deiecit, & quidem cum minoribus torminibus quam antea, conqueritur de dolore ventriculi, qui illum adeo vexat, ut manum ei semper imponere cogatur, quod signum est, humores viscidos & tenaces in ventriculo haerentes continuo flatibus excitare, itaque de sequi. decocto saepius de die haustum assumat, hoc enim vim habet incidendi & attenuandi humores viscidos, flatibusque incidendi.

Rx. Rad. apii.  
Levistic. ana 3℔.  
Baccar. Junip. 3j.  
Rasur. lign. guajac. 3ij.  
Sem. anis. 3j.  
Fenic. ana 3ij.  
Coqu. in f. q. aqu. pur. in celatur. 3xxx.  
Dissol. in aqua.  
Syr. Ment. 3ij.  
Spir. Vin. redif. 3ij.  
Nitr. 3j.  
M.

21. 22. Nov. Quotiescunque deiecit, sensim tumor ventriculi remittit, ab assumto autem cibo & potu intumescit; quando mane surgit è lecto, pedes tument, & maxime vespere, assumat diligenter de decocto, & cras iterum assumat pilul.

26. Nov. In omnibus bene se habet, nisi quodd tumor pedum & ventris aliquis appareat, à materià aliqua inter catem & partem carnosam subsistente, ut igitur materia commode evacuetur, de sequi. apozemate cras bonum haust. assumat.

Rx. Rad. Levistic. ana 3℔.  
Apii. ana 3j.  
Rasur. lign. guajac. 3ij.  
Baccar. Junip. 3j.  
Pulp. colocynthid. 3j.  
Rad. Jalapp. 3ij.  
Coqu. in f. q. aqu. pur. in celatur. 3xxx.  
Syr. de beleb. nigr. 3ij.  
Spir. Vin. redif. 3ij.  
M.

28. Nov. Assumit de hoc apozemate, à quo admodum copiose deiecit, & proinde 29. venter magis tumet, quam antea per biduum, quod signum est, à medicamento humores viscidos commotos ad motum flatuosos esse, qui status ita ventrem distendunt, itaque ad eos discutendos assumat subinde articulum de allio.

2. Dec. Hodie multos flatus emisit, sed venter adhuc tumidus est, quando flatus emittit, melius se habet, qui proveniunt à materià viscida.

4. Dec. Heri vespere assumpsit pilul. à quibus ter deiecit; venter in regione ventriculi valde turgit ac distensus est, & hoc contingit; quando humores admodum viscidi solvuntur, aut in flatibus vertuntur, tum distenditur abdomen.

6. Dec. Heri paulo melius se habuit, sed hodie ingentem dolorem in ventre sensit, qui instar cinguli illum ambebat, & singulis diebus ei accidebat, ut per hor. tantos & immanes cruciatus sentiat, qui tunc aliquo modo desinunt, quando flatus emittit, & hoc est à materià viscida, ex qua excitantur flatus, qui illos dolores causant, quique non remittunt, antequam flatus discutiantur.

8. Dec. Hodie multos flatus emisit, à medicamento, exiguumque levamen sensit; die 9. Dec. conquestus est de dolore in extremitatibus costar. à distensione ipsius peritonaei, multosque flatus emisit, itaque linimentum aliquod praescribi debet, quod leniat illos dolores.



R. Ung. alb. simpl.

Obol. *Altilia alb.* ʒb. hanc per ʒolentum ut ʒol ʒ  
ib ʒe *M. f. linim. quo inungatur locus, in quo sen-*  
iq ʒemittit dolorem. ʒe ʒ ʒolentum ab ʒolentum

Obol. *Altilia alb.* ʒb. hanc per ʒolentum ut ʒol ʒ  
ib ʒe *M. f. linim. quo inungatur locus, in quo sen-*  
iq ʒemittit dolorem. ʒe ʒ ʒolentum ab ʒolentum

Obol. *Altilia alb.* ʒb. hanc per ʒolentum ut ʒol ʒ  
ib ʒe *M. f. linim. quo inungatur locus, in quo sen-*  
iq ʒemittit dolorem. ʒe ʒ ʒolentum ab ʒolentum

Obol. *Altilia alb.* ʒb. hanc per ʒolentum ut ʒol ʒ  
ib ʒe *M. f. linim. quo inungatur locus, in quo sen-*  
iq ʒemittit dolorem. ʒe ʒ ʒolentum ab ʒolentum

Obol. *Altilia alb.* ʒb. hanc per ʒolentum ut ʒol ʒ  
ib ʒe *M. f. linim. quo inungatur locus, in quo sen-*  
iq ʒemittit dolorem. ʒe ʒ ʒolentum ab ʒolentum

Obol. *Altilia alb.* ʒb. hanc per ʒolentum ut ʒol ʒ  
ib ʒe *M. f. linim. quo inungatur locus, in quo sen-*  
iq ʒemittit dolorem. ʒe ʒ ʒolentum ab ʒolentum

Obol. *Altilia alb.* ʒb. hanc per ʒolentum ut ʒol ʒ  
ib ʒe *M. f. linim. quo inungatur locus, in quo sen-*  
iq ʒemittit dolorem. ʒe ʒ ʒolentum ab ʒolentum

Obol. *Altilia alb.* ʒb. hanc per ʒolentum ut ʒol ʒ  
ib ʒe *M. f. linim. quo inungatur locus, in quo sen-*  
iq ʒemittit dolorem. ʒe ʒ ʒolentum ab ʒolentum

Obol. *Altilia alb.* ʒb. hanc per ʒolentum ut ʒol ʒ  
ib ʒe *M. f. linim. quo inungatur locus, in quo sen-*  
iq ʒemittit dolorem. ʒe ʒ ʒolentum ab ʒolentum

Obol. *Altilia alb.* ʒb. hanc per ʒolentum ut ʒol ʒ  
ib ʒe *M. f. linim. quo inungatur locus, in quo sen-*  
iq ʒemittit dolorem. ʒe ʒ ʒolentum ab ʒolentum

Obol. *Altilia alb.* ʒb. hanc per ʒolentum ut ʒol ʒ  
ib ʒe *M. f. linim. quo inungatur locus, in quo sen-*  
iq ʒemittit dolorem. ʒe ʒ ʒolentum ab ʒolentum

Obol. *Altilia alb.* ʒb. hanc per ʒolentum ut ʒol ʒ  
ib ʒe *M. f. linim. quo inungatur locus, in quo sen-*  
iq ʒemittit dolorem. ʒe ʒ ʒolentum ab ʒolentum

Obol. *Altilia alb.* ʒb. hanc per ʒolentum ut ʒol ʒ  
ib ʒe *M. f. linim. quo inungatur locus, in quo sen-*  
iq ʒemittit dolorem. ʒe ʒ ʒolentum ab ʒolentum

Obol. *Altilia alb.* ʒb. hanc per ʒolentum ut ʒol ʒ  
ib ʒe *M. f. linim. quo inungatur locus, in quo sen-*  
iq ʒemittit dolorem. ʒe ʒ ʒolentum ab ʒolentum

Obol. *Altilia alb.* ʒb. hanc per ʒolentum ut ʒol ʒ  
ib ʒe *M. f. linim. quo inungatur locus, in quo sen-*  
iq ʒemittit dolorem. ʒe ʒ ʒolentum ab ʒolentum

Obol. *Altilia alb.* ʒb. hanc per ʒolentum ut ʒol ʒ  
ib ʒe *M. f. linim. quo inungatur locus, in quo sen-*  
iq ʒemittit dolorem. ʒe ʒ ʒolentum ab ʒolentum

Obol. *Altilia alb.* ʒb. hanc per ʒolentum ut ʒol ʒ  
ib ʒe *M. f. linim. quo inungatur locus, in quo sen-*  
iq ʒemittit dolorem. ʒe ʒ ʒolentum ab ʒolentum

Obol. *Altilia alb.* ʒb. hanc per ʒolentum ut ʒol ʒ  
ib ʒe *M. f. linim. quo inungatur locus, in quo sen-*  
iq ʒemittit dolorem. ʒe ʒ ʒolentum ab ʒolentum

Obol. *Altilia alb.* ʒb. hanc per ʒolentum ut ʒol ʒ  
ib ʒe *M. f. linim. quo inungatur locus, in quo sen-*  
iq ʒemittit dolorem. ʒe ʒ ʒolentum ab ʒolentum

Obol. *Altilia alb.* ʒb. hanc per ʒolentum ut ʒol ʒ  
ib ʒe *M. f. linim. quo inungatur locus, in quo sen-*  
iq ʒemittit dolorem. ʒe ʒ ʒolentum ab ʒolentum

Obol. *Altilia alb.* ʒb. hanc per ʒolentum ut ʒol ʒ  
ib ʒe *M. f. linim. quo inungatur locus, in quo sen-*  
iq ʒemittit dolorem. ʒe ʒ ʒolentum ab ʒolentum

Obol. *Altilia alb.* ʒb. hanc per ʒolentum ut ʒol ʒ  
ib ʒe *M. f. linim. quo inungatur locus, in quo sen-*  
iq ʒemittit dolorem. ʒe ʒ ʒolentum ab ʒolentum

Obol. *Altilia alb.* ʒb. hanc per ʒolentum ut ʒol ʒ  
ib ʒe *M. f. linim. quo inungatur locus, in quo sen-*  
iq ʒemittit dolorem. ʒe ʒ ʒolentum ab ʒolentum

Obol. *Altilia alb.* ʒb. hanc per ʒolentum ut ʒol ʒ  
ib ʒe *M. f. linim. quo inungatur locus, in quo sen-*  
iq ʒemittit dolorem. ʒe ʒ ʒolentum ab ʒolentum

Obol. *Altilia alb.* ʒb. hanc per ʒolentum ut ʒol ʒ  
ib ʒe *M. f. linim. quo inungatur locus, in quo sen-*  
iq ʒemittit dolorem. ʒe ʒ ʒolentum ab ʒolentum

Obol. *Altilia alb.* ʒb. hanc per ʒolentum ut ʒol ʒ  
ib ʒe *M. f. linim. quo inungatur locus, in quo sen-*  
iq ʒemittit dolorem. ʒe ʒ ʒolentum ab ʒolentum

Obol. *Altilia alb.* ʒb. hanc per ʒolentum ut ʒol ʒ  
ib ʒe *M. f. linim. quo inungatur locus, in quo sen-*  
iq ʒemittit dolorem. ʒe ʒ ʒolentum ab ʒolentum

Obol. *Altilia alb.* ʒb. hanc per ʒolentum ut ʒol ʒ  
ib ʒe *M. f. linim. quo inungatur locus, in quo sen-*  
iq ʒemittit dolorem. ʒe ʒ ʒolentum ab ʒolentum

Obol. *Altilia alb.* ʒb. hanc per ʒolentum ut ʒol ʒ  
ib ʒe *M. f. linim. quo inungatur locus, in quo sen-*  
iq ʒemittit dolorem. ʒe ʒ ʒolentum ab ʒolentum

Obol. *Altilia alb.* ʒb. hanc per ʒolentum ut ʒol ʒ  
ib ʒe *M. f. linim. quo inungatur locus, in quo sen-*  
iq ʒemittit dolorem. ʒe ʒ ʒolentum ab ʒolentum

etiam in intestinum duodenum, delato eoque vi-  
tioso effervescunt; hinc ex illa effervescencia in  
regione lumborum sentitur frigus, & ad ventri-  
culum delata sursum illa materia dolorem ibi ex-  
citat.

Ab assumpto pulv. sem. zedoar. excrevit 6. ver-  
mes.

## CASUS LXXXII.

**V**ir quidam 43. annor. aliquandiu laboravit  
erysipelate, in pede; & quando novum me-  
dicamentum applicatur pedi, incidit in febrem  
gravem (quia a dolore pedis maxima fit perturb-  
atio in toto corpore & maxime spirituum, hinc  
aliquid potuit latitare in corpore, quod ex illa  
perturbatione motum tunc acquisivit, & ad cor  
delatum, febrem excitavit,) alvus per 3. dies  
fuit adstricta.

29. Nov. A medicamento cholagogo assumpto  
hodie semel dejecit, sed satis copiose; quæ de-  
jecit, acria fuere, ut ipsi quasi lancinaverint ipsam  
anum; habuit febrem, sed non tam gravem ut  
alias; tussis adest, sicca & anhelosa respiratio,  
illaque magis urgent, quando it cubitur, & in  
lecto jacet; causa autem tussis & anhelosa respi-  
rationis videtur esse catharrus aeris & salsus (de  
quo etiam conqueritur, nimirum quod ipsi sub-  
inde aqua salia & naribus effluat,) unde sensum  
ex capite destillant humores acres, qui se in-  
nuant circa bronchia pulmonum, anhelosam re-  
spirationem causant, & ad pulmonum partes sen-  
sibiles tussim siccam excitant.

25. Nov. Melius se habuit hodie quam præce-  
dentibus diebus ab assumta emulsione humores  
acres temperante, febrem quidem habuit, minus  
tamen gravem sed leviorum quam alias; multum  
urinae excrevit, cujus causa videtur esse, quia à  
medicamentis assumtis acres humores sunt leniti,  
contemperati ac ita dispositi, ut educi potuerint,  
per vias urinarias.

## CASUS LXXXIII.

**A**ncilla quædam per octiduum laboravit febre  
quotidianâ, & primò cum invaderet frigus  
sensit in lumbis, quodque per totum cor-  
pus dispersebatur, durabatque per 2. hor. hodie  
delata est in nosocomium, ubi conquestra erat de  
paroxysmo; præterea post frigus cum sensum in-  
calesceret, hemicraniam patiebatur; alvus erat  
segnior & pulsus frequens.

## CASUS LXXXI.

**A**ncilla quædam ante 7. septimanas incidit in  
febrem quotidianam continuam, ubi primum  
in regione lumborum sensit frigus, quod dura-  
vit per sequi horam, & calor, qui illud inse-  
quitur, non tam gravis fuit, in paroxysmo sen-  
sit Ventriculi dolorem; alvus adhuc satis respon-  
det, hæcenus nullum ei adhibuit fuit medica-  
mentum, sed hodie die 16. Nov. in nosocomium  
delata est, ut restitueretur.

## EXPLICATIO.

Febris hujus causa est materia biliosa & du-  
ctu bilario in intestinum duodenum effusa, quæ  
si permisceatur cum humore & ductu pancreatico

## EXPLICATIO.

Febrem hanc continuam quotidianam esse ex casu manifestum est, & ortam à pituita & bilis vitio, in intestino tenui collecta; qui humores, si effervescent, dolorem in lumbis causant; & quia pituita prædominium habet, frigus maxime urget.

Quando lectum petit, venter intumescit, manè verò rursus detumescit, inprimis quando flatu emittit.

## CASUS LXXXIV.

Juvenis quidam annos natus circiter 24. per quadriennium fuit valetudinarius, sed per 6. septimanas pejus se habere cœpit, & conqueritur de frigore continuo, quod sensit in lumbis, cum tensione tumoreque abdominis, frigisque tam continuo urget eum, ut semper igni assidere cogatur, quam primum autem ab eo recedit, frigus graviter illum urget, ut calorem nullum habeat nec sentiat, nisi ab externo igne; dolor etiam ventris & capitis gravativus in parte anteriore ipsum infestat, pulvis celer nec adeo debilis; sitis urget, & quando bibit, statim sentit frigus in lumbis; appetitus aliquo modo urget & alvus laxa est, hætenus autem nihil assumptum, sed die 30. in nosocomium delatus est, ut ad pristinam rediret valetudinem.

## EXPLICATIO.

Ægrum hunc febre continuâ affligi, ex casu satis manifestò apparet; causa autem antecedens fuit, quòd per quadriennium fuerit valetudinarius, quo tempore multum pituitæ potuit colligere, quæ jam causa proxima est hujus mali, omniumque symptomatum; quatenus namque in intestino duodeno, quod pro parte affecta habetur, effervescebat; flatu excitat, unde tensio, tumor, dolorque lumborum & ventris; flatu enim hi ad caput delati dolorem efficiunt gravativum; quia verò tota sanguinis massa inquinata est, continuum frigus ipsum urget.

Quia autem vires ex parte constant, nec ulum in affectus remotionem auxilium est adhibere, illa præscribi debent, qui incidunt, attenuant & à corpore educunt humorem peccantem.

1. Dec. Hodie de decoct. aliquo purg. assumpto ter copiose & quidem cum torminibus deject, hodie quoque retulit se per quadriennium

tumorem glandularum in collo & sub axillis usque in hanc diem sensit, & nullum ad eundem adhibuisse medicamentum, quia autem ad ejus curationem decoctum præscriptum valde conveniens est, quia tumores isti glandularum à vitiatò sanguine viscidiorè originem duxerunt, de eo cras bonum haustum assumat, est autem decoct. sequ.

R. Rad. Apii. s. sic citas apii, s. citas  
Fenic. ana ʒi. s. citas autanum apii  
Rasur. lign. Guajac. ʒiij. s. citas autanum apii  
Pulp. colocynthid. ʒi. s. citas autanum apii  
Pafful. Maj. mundat. ʒiij. s. citas autanum apii  
Coqu. in s. q. aqu. pur. in Colatur. ʒxl.  
Dissolv. s. citas autanum apii  
Syr. de belleb. nigr. ʒiij. s. citas autanum apii  
Misce. s. citas autanum apii

Foris ad discutiendam materiam illam viscidam imponatur omnibus glandulis valde tumidis sequ. empl.

R. Empl. diachyl. c. gummi. ʒij. s. citas autanum apii

Extendatur super alut. Vel quod melius, sapius illinantur glandule tumide sequ. ung.

R. Ung. Martiatum dialth. s. citas autanum apii  
Ecnel. ana q. pl. s. citas autanum apii  
M. s. citas autanum apii

8. 9. Dec. Paulò melius se habet, nisi quòd conqueratur de molestiâ in ano, sentit enim in illo tumores ad instar pollicis, (hi tumores sunt hæmorrhoides;) itaque de sequ. ung. innungat tumores.

R. Ung. populeon. ʒij. s. citas autanum apii  
Bol. armen. ʒj. s. citas autanum apii  
Opii in ol. rosat. dissolv. ʒij. s. citas autanum apii  
M. s. citas autanum apii

His diebus, est nullum haustum de decoct. assumat, tamen singulis hisce binis diebus sexies deject, & quidem copiose; sentit præterea dolorem continuo in ventre, & qui cum insultu affligebat; cum autem tormina tanta essent, frigus sensit in lumbis, sensum ascendens ad regionem ventriculi, quasi glaciæ frigida ad modum ibi hærentis; cum autem tormina hæc paululum desierint, calorem sentit in abdomine, & circa illas partes, quæ antea frigeant.

Esti autem hæc symptomata febrem habuisse comitem videntur, tamen febris non dicenda est, nam

nam nec frigus nec calor dispersus est per totum corpus, quod in febribus contingit, sed saltem in abdomine hæserunt, itaque potius ventris tormenta nominari debent.

Præterea tumor in ano à linim. detumuit.

Aliquod levamen habuit; de ariditate linguae conqueritur; quando tussit, dolorem sentit, quasi caput diffundatur; & hunc sentit incipere à posteriore usque ad anteriorem capitis partem pertendere, cujus ratio est, quia ex vehementi motu concutiantur partes cerebri, & quando ex illo motu partis duræ meningis constitutis processum falcatum se invicem tangunt, dolor ille quasi caput scindens percipitur.

17. Dec. Dolor capitis findens adhuc perseverat; conquestus est hodiè de tumore ventris & inprimis pedum, cujus causa est, quia beneficio ipsius medicamenti humores admodum visci, qui in ipso dominarunt, soluti & fluxiles redditii sunt, & ad partes jam deferuntur; præterea dolorem sensit in pectore sine tussi, quem antea percipiebat cum tussiret. Quia autem à decoct. 30 Nov. præscr. benè se habuit, nisi quod paulò fortius ipsum purgavit, iteretur idem, & loco 3j. pulp. coloc. sumatur 3ß.

18. Dec. Hodiè conquestus est de summo dolore in capite, ut corpus, propter ejus consensum, movere non posset, quando capite proclinat, summum dolorem in fronte percipit, quando illum elevat, quasi grave pondus in capite hæreat, ipsi videbatur. Mucus etiam è naribus non emunctis effluit, & horum symptomatum causa est, quia materia illa soluta in vasa partim recepta & ad caput delata, partim extrà vasa in capite hærente partes sensibiles capitis afficit, unde dolor; itaque quia humores illi qualitate & quantitate peccant, corrigendi ac sensim emendandi sunt, & ita ad humores illos è capite eliciendos sternutatoria hic locum jam non habent, sed aliud quid substituendum, quod humores illos sine irritamento ad sternutationem è capite per nares proliciat, quod nullo alio medicamento præstari potest, quam foliis majoran. tabaci, salv. aut bethonic. in nares immittis.

Annotata ex sectione hujus cadaveris.

Abdomen valdè tumidum fuit, ab aqua, quæ repletum fuit; per paracanthesi enim ultra pintas 4. Belgicas educebatur.

Et hoc notandum in applicatione instrumenti (quod est fibula cava, argentea & longa quæ in fine acuta sit, & in utroque latere duo habeat foramina, ut aqua, quamprimùm intromissum est, per ea intret, quæ etiam stylo argenteo fit prædicta, qui extrahi per necessitate possit,) in paracanthesi, ut duobus digitis transver-

sis infra umbilicum, vitatà lineà albà intromittatur, & si multa aqua in abdomine contenta est, uti in hydrope fit, per intervalla immittatur, & quidem non in uno loco, ne mortificatio adveniat. Vultus emplastro diapalma consolidari potest. Notandum etiam est, hæc apertionem in principio hydropis, inprimis ejus, qui ex febr. ardentibus nimioque potu ortum duxit, locum habet, & ægri quàm multi liberantur, ubi autem malum inveteratum est, aliquod levamen quidem sentiunt ægri, sed tamen non planè extirpatur malum.

Omentum planè sursum erat distractum, versus ventriculum, eratque glandulosum, & intestina prorsus nuda erant, sine omento; & illi, quibus hoc contingit, semper frigent, nisi continuè alisdeant igni, quod & fecit hic mortuus, cum in vivis adhuc esset; Intestina incipiebant rubere, quod erat signum corruptionis & acrimoniæ aquæ in abdomine contentæ.

Mesenterium plurimis glandulis majoribus & minoribus erat refertum; glandulæ magnæ æquabant magnitudinem nucis juglandis, minores autem nucis avellanæ, & paulò minores referebant magnitudinem pisi magni; omnesque glandulæ per totum Mesenter. ita dispersæ erant, totque ut intestina etiam magis versus latera contorta fuerint, substantia glandularum planè gypsea erat; Intestina distenta erant à flatibus, & mox contracta à parte superiore & inferiore ejus distensionis, & in distensione illà observabantur dolores.

Ventriculus valdè parvus erat, & vesiculæ fellicis proximus & per ligamentum vesiculæ firmiter annexus, & qui tale quid habent, delicatiores sunt, potest enim aliquid bilis mediante illo ligamento pervenire ad ipsum ventriculum; unde nausea.

NB. Omentum annectitur ventriculi parte superiore & inferiore, & constituit marsupium, sive cavitatem, in quâ multi status & humores colligi possunt, ut inquit Hippocr.

Pancreas paulò durius erat, quàm debebat, sed non ita tumidum, & hoc contingit, quia per ductum suum se exonerare potuit, quod non item facere potuerunt glandulæ mesenterii. Pancreas æquans magnitudinem duorum pugnorum observavit Cl. Sylv. in sectione mulieris Amstelodami Anno. 1698.

Lien paulò durior erat, quàm debebat, & factis magnus.

Vulgus Medicorum omnes affectus melancholicos lieni tribuit, dicuntque eos, qui magnos ha-

habent lienes, melancholicos esse summos, quod autem falsissimum est, & Cl. Sylv. illos, qui hoc asserunt, perristi referens: Se 30. cadavera secuisse, eorum, qui omnes pro melancholicis in vivis habiti fuerant, & in illis nullum viscum tam bene constitutum reperisse, quam ipsum lienem.

Præterea Amstelodami Cl. Sylv. secuit cadaver alicujus Consilarii, viri valde hilaris & nunquam melancholicæ dediti, in quo reperit lienem quoad longitudinem 14. digitorum transversorum, quoad latitudinem autem 8. digitor. & quoad crassitiem 5. digitor. & si melancholia magnis lienib. est ascribenda, in hoc viro maxime locum habuisset, in quo tamen nunquam ullius melancholicæ vestigia, cum adhuc in vivis esset, notata fuerint.

Vesicula felleis valde magna erat, & viridis coloris, qui color aliàs naturaliter obscurior esse debet.

Vesica urinaria erat urinâ valde repleta, & interna vesicæ substantia erat rubicunda, quod præter naturam fuit, speciem enim inflammationis minabatur, & talis rubor contingit ab acrimoniâ hujusmodi sive urinæ, quæ contenta in vesicâ paulo acrior erat, quam debebat. Diaphragma per 3. digitos transversos annexum erat, ultra cartilagineum costarum in ipsas costas.

Pulmones ubique per totum pectus firmiter annectebantur tam pleuræ, quam ossi sterni, ut cum difficultate separari debebant, uterque lobus pulmonum superior tam dexter, quam sinister durus erat, ac glandulis plenus; inferior autem pars utriusque lobi naturalem consistentiam habebat. Glandulæ quæ sub axillis tumidæ & valde magnæ fuerunt, mollioris erant consistentiæ, quam illæ, quæ fuerunt in omento, & his glandulis applicatum fuit liniment. ac emplastrum, cum mortuus hic in vivis adhuc esset, quæ talem molliem produxerunt; & in affectibus glandularum nihil magis conducit, quam gummata intus adhibere, extus verò linimenta & unguenta, ex ol. è laterib. ung. Martiat. U. Alth. & inprimis Myrrha præ cæteris commendatur in his affectib.

NB. Affectus glandularum familiarissimus est pueris, ubi abdomen valde distentum & durum, & reliquarum partium tabes apparet, German. dicitur das angewachsen. Belg. autem ingef. kerk; voces enim tunc sunt pueri, & supra nominatis medicamentis facile curari potest talis affectus. In pericardio glandula maxima instar parvæ nucis juglandis observabatur, talisque consistentiæ, qualis in omento fuerunt glandulæ. In cordis auriculâ dextrâ macula alba & magna reperiebatur, instar vesiculæ igne combustæ, & membrana quæ talem vesiculam constituat, densa satis erat;

causa autem hujus vesiculæ videtur fuisse humor acris in illa membrana contentus.

Glandulæ, quæ in collo reperiebantur, ejusdem substantiæ erant, ac illæ quæ fuerunt sub axillis, mollioris scil. vi medicamentorum ita dispositæ.

Quatuor ductus salivales observabantur, aspectu satis jucundi; in utraque nimirum genâ primi duo, orti à glandulis conglomeratis seu parotidibus, desinentes in genâ partem internam; alteri duo ductus oriuntur à glandulis conglomeratis colli parte scil. dextrâ, & sinistrâ, terminantur autem lub linguam.

Cranium cum aperiretur intra illud spatium, quod est inter cranium & duram meningem aqua contenta ibi effluebat, multaque aqua erat inter duas meninges, quæ aqua in anteriore capitis parte contenta spumosa erat, quod contingit à flatibus.

Sanguis & aqua reperiebantur in dextrâ cerebri parte & substantiâ, & sanguis nigricantis erat coloris, vasque multo turgebat sanguine; in sinistro autem latere sanguis in substantiâ cerebri reperiebatur, non autem sanguis extravasatus, uti in dextro latere.

## C A S U S LXXXV.

13 Dec. **J**uvenis quidam ætate 8. septimanarum cum valde incalescens maxime sitiret, bibi haurit aquæ frigide; post triduum autem cum vellet opus suum ordinarium aggredi, pistor enim fuit, frigus in regione lumborum sensit, quod instar cinguli ventrem ambiebat, & ex eo tam debilis, ut non potuerit stare; frigore hoc remisso, paulo melius cepit habere, & ante septimanam, videlicet 27. Nov. dolor pectoris utriusque nempe lateris cum ingenti tussi ipsum invasit, cum difficili respiratione conjunctus, tussiendo multa ejecit, & quidem viscida; alvus per 3. dies fuit constipata; pulsus celer ac frequens, sitisque urget.

Die 4<sup>o</sup>. Dec. delatus est in nosocomium, ut ad pristinam deduceretur valetudinem.

## E X P L I C A T I O.

Juvenem hunc pleuritide laborare, colligere licet ex Symptomatibus, quæ illum infestant; conquirerit enim de laterum dolore, difficultate respirandi & tussi.

Pulsus celer & frequens febrem adesse indicat. Videtur autem in hoc juvene peculiarem esse constitutionem & dispositionem sanguinis, & pituitam

tuitam in eo dominare, quod pater ex eo, quia tandiu & quidem per 8. septimanas latitavit malum, antequam in conspectum prodiret; si enim à sanguine bilioso ortum duxisset, brevissimo id temporis spatio sensisset, quod malum autem jam protrahum est, ad nonam septimanam; deinde pituitam ejus causam esse, ex symptomatibus colligitur, dolor enim ipsum non adeo urget, uti in illis, qui pleuritide laborant ex sanguine bilioso; tussis etiam non gravis est, ut aliquem dolorem afferret, quam tussim; si à sanguine bilioso esset pleuritis, vix eam ferre posset æger. Causa autem externa fuit haustus aquæ frigidae, copiosè ab hoc juvene æstuante & sudore madente haustus; nam si primò potuit aërem ingredientem in ipsos pulmones per asperam frigidiorum reddere. 2. Per œsophagum aqua illa frigida transiens & in ventriculo existens clausit suo frigore multos in pulmone & pectore poros, per quos sanguis & vapores transire debebant, unde aliam viam eamque apertam quarunt, unde alii meatus plus justo aperiuntur, poris plus justo apertis sanguis pituitosus se in illos insinuavit, & ob visciditatem suam tandiu ibi hæsit, antequam facta effervescencia seu fermentatione talia pleuritidis symptomata inducere potuisset.

Die. 4. Dec. Assumpsit medicamentum hydragogum, à quo copiosè dejecit, quæ autem ejecit, valde viscida fuerunt.

Die 6. Dec. A trochisc. beccic. materiam valde solutam esse retulit, multaq;e tussiendo rejecit, quæ valde cruda & viscida erant, quæ etiam confirmant pituitam hujus pleuritidis causam esse; si enim à sanguine bilioso, sputa illa fuissent corrupta.

Non inconvenies itaque est, ut materia illa viscida incidatur, attenuetur, & sensim evacuetur, in cuius usum de sequ. decoct. assumat bis in die haustum, & subinde de trochisc. utatur.

R. Rad. Apii.

Fenic. ana. ʒi.

Rasar. lign. Guajac. ʒiiij.

Baccar. Junip. ʒij.

Semi. anis.

Dauc. ana. ʒij.

Coq. s. a. in ag. Pur. in Colatur. ʒxi. dissolv.

Syr. de Sennâ ʒij.

M.

R. Trochisc. Beccic. Alb. ʒij.

8. 9. Dec. Heri die 8. ab apozemate copiosè dejecit; respiratio non tam gravis fuit, quam a lias, hodiè die 9. multa tenuia & spumosa phlegmata tussiendo ejecit, quod signum est materiam

illam crassam aliquo modo esse attenuatam; unde liberior fuit respiratio; quando manè tussit, & quæ ejecit, foetent; assumat itaque de trochisc. & de pilul.

R. Mass. Pil. de cynogloss. ʒi.

F. Pilul. No. viij.

Sumat subinde. j.

10. Dec. Per noctem & hoc die tussis non tam gravis fuit, prout & commodius respirare potuit; non multa phlegmata tussiendo ejecit; quia autem conqueritur de dolore vermiculante, quem per quadriduum sensit in plantâ pedum, illumque magis exacerbare, quando igni affidet. Quia autem hujus doloris causa videtur esse humor acris, cum sanguine delatus ad illas partes, non inconveniens videtur ad liniendum illam materiam acrem, fomentum præscribere, in quod pedes per quadrantem horæ manè & vesperi imponent, in cuius usum

R. Rad. Alib. ʒij.

Fol. Malv.

Viol.

Verbas. ana. M. ij.

Semi. lin.

Fennugrac. ana. ʒi.

Concisa & crasse contusa d. ad. chart.

Quæ dehinc coqu. in aqu. pur. per spatium horæ quadrantis, & balneum hoc servetur, ut iterum possit calefieri, & in agrotantis usum adhiberi.

18. Dec. Habuit hodiè paroxysmum cum levi frigore, & eo urgente assumpsit de decoct. quod autem statim evomuit; & hoc contingere solet, quando in paroxysmo humores moventur, si tunc quid assumitur, evomitur iterum; sed frigore remisso, & cum paululum versatus in calore, qui frigus subsecutus est, iterum de decoct. sumpsit, à quo quinquies dejecit, quoad cætera paulò melius se habuit. Convaluit.

## CASUS LXXXVI.

V Ir quidam ante annos 12. ministravit figulo ad fornacem, ut extraheret vasa coacta, unde ab insigni fornacis aestu admodum incallescens valde sitivit, ut sitim delere non posset; copiosè assumit frigidam, quæ assumtâ cepit tussire, difficulter & anhelosè respirare, & circa præcordia angit, ut non amplius potuerit interesse huic operi, hocque

hocque malum per 12. ann. continuè duravit, à quo tempore illud notavit, quando aliqua facta est aeris mutatio, corpus ejus quoque mutatum fuisse, ab aëre autem sereno melius se habuit, ut & à calidiori; pejus autem ab aëre frigido & nebuloso; tussis quæ ab illo tempore sicca continuè fuit, & adhuc talis est; aëre flante humidiorè tussiendo aliquid ejicit; præterea quando lacticia aut alia humida assumit, in tantum intumescent venter, ut cogatur solvere ligamina, nullumque levamen sentit, nisi status emittat; ante 15. dies pedum & faciei tumorem leucophlegmaticum sensit, qui illum adhuc urget, alvus fatis respondet, & symptomata supra narrata ipsum adhuc continuè comitantur.

### EXPLICATIO.

Difficultas illa respirandi, quæ vir hic laborat, est à materiâ viscidâ, quæ tenaciter impacta est ipsi pulmonum substantiæ, unde commodè distendi non possunt; uti enim sponsia humore viscido infarctâ difficulter distenditur, ita quoque pulmones; & quia in pulmonum substantiâ pituita illa firmiter hæret, tussis sicca causatur.

Materia autem quæ in pulmonum substantiâ hæret, pituita est admodum viscida, quod patet 1. quia pituita copiosè satis in his regionibus, puta Belgicus, generatur, ab aëre humido, qui dominatur, & propter aquarum viciniam.

Quia hic vir plebeus est, utens alimentis, quæ humorem illum generare & augere possunt.

Quia cum adesset cornaci figulinæ humores pituitosi magis inspissati sunt, & particule humida exhalarent, assumpto autem potu liquefacta iterum fuit pituita & deducta ad cor, ex hoc in substantiam pulmonum; & quia continuè generatur pituita, continuum quoque malum per 12. annor. spatium fuit tractum; corpus autem extensum fuit à flatibus, assumpto enim potu aut alio liquore status in intestinis generantur, quia in intestinis maxima pituita copia hæret.

### CURATIO.

Quia leucophlegmaticus tumor, qui aliis symptomatibus supervenit, maximè urget, & reliqua symptomata non adeò urgent, quin adhuc officio suo potuerit fungi (per 12. enim annos fuit vigil nocturnus) & obtinuerit illum se die 7. Nov. in nosocomium contulit, illius habenda est ratio prius, & à leni purgante inchoandum, ut humores leniter per alvum educantur.

Die 8. A medicamento hydragogo quinquies copiosè satis & admodum blandè deiecit; aspe-

ritatem & siccitatem linguæ sentit, quando à somno experscitur, per hor. autem à somno cum experscitur est, humida sit; & hæc linguæ siccitas est à vaporibus, qui in lingua subdident, de nocte cum quiescit, & non movetur, de die autem quia movetur lingua iterum humida redditur.

11. Commodè se habuit, conqueritur de lancinationibus, quas sentit in virgâ, & tunc semper quando hæ lancinationes ipsum urgent, urinam reddere cogitur, hocque malum per 7. septimanas sensit.

12. 13. Conquestus est de linguæ ariditate, quæ ipsi quidem videbatur actu arida, sed ad conspectum tamen humida erat; Urinam commodius excernit, & de dolore pectoris gravativo conqueritur, cujus causa est materia valdè viscida, ipsi pulmonibus impacta, ariditas autem linguæ, quæ ipsi planè arida videtur, actu tamen non erat, est à spiritu acido & bile, in se invicem mistis, si enim à bile solâ, planè arida actu esset, de sequ. decoct. subinde haustum assumat.

*R. Aqu. lig. Guaiac. ʒij.*

*Rad. liquor. Raf. ʒvj.*

*Apri. ʒiʒ.*

*Baccar. Junip. ʒij.*

*Ocul. 69. ʒij.*

*Pulp. Colocynthid. ʒi.*

*F. Decoct. in aqu. p. ad colatur. ʒxl.*

*In quib. dissolv.*

*Syr. de ʒ. Rad.*

*Scannâ. ana. ʒij.*

*Misc. VXXX.*

21. Dec. Conquestus est hodie de tumore scroti & intorione virgæ, ut vix urinam reddere possit, itaque seq. species coq. in cerevis. tenui, madefactaque sponsia in decoct. calidè applicetur ipsis partibus.

*R. Flor. Sambuc.*

*Chamom. Rom.*

*Summit. Melilot. ana. M. j.*

*Fol. Alth.*

*Majoran. ana. M. j.*

*Sem. annis.*

*Cumin. ana. ʒʒ.*

*M. C. grosso modo contus. d. ad chart.*

22. NB. Sponsia madefacta probe iterum debet exprimi, antequam applicetur.

23. 24. Scrotum valdè intumuit, ut & virga valde tumida erat, itaque de sequ. decocto fin-







debat, quod calor inferius ascenderet versus genua, sentiebaturque dolorem, quasi medulla ex ossibus traheretur (quod videtur esse species convulsionis), sed dolor ille remissi iterum, de somno interrupto conquestus est.

2. Levem sensit febrem, sed die 26. & 27. commodè se habuit, noctuque bene quievit, nec sensit febrem; venter qui adhuc mollis fuit, hodie 27. durior erat, & quia tum subito durior factus est, concludendum est, à flatibus duritiem illam esse; præterea conquestus est de obscuritate oculorum, ut tam clarè videre non posset; quia autem ut plurimum hoc contingit ab halitibus melancholicis, versus oculos ascendentibus, sanguinique permixtis, hinc humores oculorum, eo, quo debent modo, non nutriuntur.

8. Jan. Bene se habuit hodie, conquestus est de frigore in pedibus, cuius ratio, quia ex affectu animi, à quo ab initio incidit in hunc morbum, à quo sensum jam liberatur, commoti sunt omnes humores in corpore; hinc pituita partim ibi in loco subsistens, partim jam cum sanguine mixta ad illas partes affluens tale frigus causetur, & quia antea pedes laborabant stupore, non putandum, quasi jam de novo hoc frigoris incommodum primum sentiret, sed graviore stupore urgente frigus non sensit, vel non curavit, cesso autem jam stupore, magis percipit illud frigus, quod bonum est signum, si partes, quæ paralyti laborarunt, iterum sentiunt, quid incommodi ipsis contingat, frigit enim paralyti fore solutam, & notandum est, omnes partes paralyticas esse frigidiores reliquis, & frigus per aliquod tempus adhuc durat, etiam moveantur, frigusque in partibus resolutis non sentiri, nisi sensum auferatur paralytis.

## CASUS XC.

**A**ncilla quadam per 4. menses valetudinaria ante 14. dies incidit in febrem quotidianam, à quo tempore pedes venterque sensum intumescere ceperunt, qui tumor in dies magis augmentum sic expressum: cum olusq. totidem sicut 3. 20. 10. 10. & 27. Dec. Hactenus bene se habuit, sed hodie 24. conquesta est de alio adstrictiore, sanguis ex naribus effluxit, cui alias non assueat, nota autem retulit se per 9. menses non passum esse fluxum menstruum, bonum signum videtur, nempe humores sensum corrigi, emendari, fluxileque reddi; & sæpius Cl. Sylvius observavit talia exempla, ubi per annum menses

subsistere, tandem expurgato probe corpore, liberatoque a pravis humoribus sponte rediisse sine adhibitis medicamentis, quæ vulgo menses morventia dicuntur.

## CASUS XCI.

**V**ir quidam ante 13. septimanas incidit in febrem tertianam intermittentem, quæ duravit per 3. septimanas, & dehinc mutata est in febrem quotidianam continuam, valdeque confusam quæ illum afflixit per 6. septimanas; ante 4. autem septimanas mutata est in quartanam intermittentem. Quando paroxysmus invadit, sentit frigus in lumbis, cum dolore, qui tantus est, ut omnia in lumbis ipsi dilacerari videantur; frigus dispergitur versus partes inferiores, ut quasi in ossibus hærete sentiret; postea sursum ascendit in abdomen, dispergiturque per illud, durans per 3. hor.

Febre continuâ dum laboraret, liberalius assumptum potum, unde hactenus per 6. septimanas sensit pedum tumorem, qui adhuc durat, & dolor capitis, qui illum valde urgebat in febre continuâ, sed tunc factis pedibus plane remissit.

Appetitus satis ipsum urget, noctuque bene quiescit; pulsus robustus est, magnus & frequens fuit in die remissionis; nulla adhuc adhibita sunt medicamenta.

## EXPLICATIO.

Febrem quartanam ortum duxisse ex pituitâ, satis patet ex effectis, & duratione tum febris, per longum enim tempus duravit, & quando ingruit paroxysmus, dolorem & frigus percipit; Causa autem hor. symptomatum est, quia in intestino tenui (vel secund. vulg. in duodeno) duo reperiuntur ductus, biliaris scil. & pancreaticus, qui duo ductus se exonerant in principium illius intestini, vulgo jejuni dicti, quod firmiter lumbis annectitur, & si illi humores, qui ex illis excernuntur, bene se habent, temperata sunt omnia, & ex effervescentiâ, quam institunt, nullum incommodum oritur; his autem male dispositis, sive vitium sit unius, sive alterius, sive utriusque effervescentia fit illorum humorum & phlegmatis, quod semper reperitur in intestino; hinc si bilis predominatur, calor magis est manifestus, si vero frigus, pituita.

Quò autem major sit effervescentia, eò magis distenditur illud intestinum, unde dolor percipitur.

Tumor pedum, qui speciem hydropis minatur, est partim a flatibus, partim a pituita viscida, quæ se exonerat ad partes externas, non autem a vitio alicujus partis seu læsione orta species hydropis, sed a largiore in febre continuâ assumpto potu, unde etiam flatum tumorem pedum sensit.

Itaque in curatione præstandum, ut humores illi alterentur & educantur, itaque de sequ. apozemate lingulis diebus manè haustum assumat.

*R. Cortic. Rad. samb. ʒij.*

*Levistic. ʒij.*

*Rasur. lign. Guajac. ʒij.*

*Cortic. lign. Guaj. ʒij.*

*Baccar. Junip. ʒij.*

*Pulp. colocynthid. ʒj.*

*Sem. Anis.*

*Danc. ana ʒij.*

*Coqu. s. a. ex aqu. pur. in Colatur. ʒi.*

*Dissolv.*

*Syr. de belleb. nigr. ʒv.*

*Spir. Vin. redif. ʒij.*

*Misc.*

NB. Cortices & rad. lign. guajac. solum possent coqui lento igne vase probè clauso, per 24. hor. tanta vis enim ipsis inest antequam reliqua addantur, quia autem a pharmacopoeis hoc non observatur, notandum tamen est, in quis sibi ipsi vellet parare tale decoctum quòd tali modo parari possit.

23. Hodie habuit febrem, frigus duravit per hor. calor per 2. sed neutrum fuit molestum; post calorem sensit dolorem vermiculantem in externis corporis partibus, quasi animalcula per reptarent illas partes, à vaporibus & halitibus biliosis acris ab illas partes delatis, post illum dolorem incidit in sudorem, qui duravit per 3. hor.

3. Februar. hodie assumpsit sal. vol. fixat. Sylviani gr. ij. unde perturbationem in toto corpore sensit, quasi omnia susque deque moverentur, & levem inde habuit febrem.

## CASUS XCII.

Vr quidam per 14. septimanas laboravit febre quartana, quæ illum invasit semper hor. 6. vel tertina, frigus ingruit cum dolore, incipiens in lumbis, dispergiturque per totum corpus & ad caput, unde dolorem patitur; post frigus calor ingruit, & tunc incidit in somnum, quando

se. movet, superiora sudant, inferiora autem non item; in ejus curationem seq. præscripta est mixtura, de quâ subinde cochlear. assumere debet, redeunte autem paroxysmo cochlear. ij.

*R. Ag. card. ben. ʒij.*

*Cochlear. ʒj.*

*Thebriacal. s. ʒij.*

*Antimon. diaphor. ʒij.*

*Syr. quinque Rad. ʒij.*

*M. ʒij.*

Hodie manè hor. 8. habuit paroxysm. cum summo frigore, ut sella, cui infedebat, à tremore quem passus est, moveretur; in frigore valdè deliravit & sitivit, cessante autem frigore cessavit quoque delirium; ingruente calore dolorem capitis molestum passus est, cum aliquid comedit, amara ipsi omnia sapient, & horum omnium symptomatum causa videtur esse pituita acida bili permixta, prædominium autem habente pituita, in quâ abundat spiritus acidus, quæ delata ad caput spiritibus animalibus inordinatum motum conciliavit, itaque utatur rufus de superius præscripta mixt. mabeq. anisq. ni. sigillat.

24. Conquestus fuit de dolore ventris circum bilicum, alvus est adstricta, & quando aliquid exeerit, summâ cum difficultate hoc facit, quia feces admodum indurata, causa autem indurationis est spiritus acidus, junctus oleo & sali, quibus scatent excrementa illa; quod seq. decoct. præstare potest, à quo bis in die haustum assumat.

*R. Rad. Apit.*

*Levistic. ana ʒij.*

*Rasur. lign. Guajac. ʒij.*

*Baccar. Junip. ʒij.*

*Pulp. colocynthid. ʒj.*

*Coqu. in s. q. Aqu. pur. in Colatur. ʒij.*

*Dissolv.*

*Syr. de belleb. nigr. ʒij.*

*Spir. Vin. redif. ʒij.*

*M.*

NB. Lignum Guajac. est egregium ad incidendum quoscunque humores viscidos, ratione salis volat. quo maxime scatet.

## CASUS XCIII.

Vr quidam ante 14. septimanas incidit in febrem quotidianam continuam, paroxysmi fem-

semper magno cum frigore invaserunt, febre autem ante dies aliquot remissa incidit in magnum ventris dolorem totiusque corporis non fuit, nec elurit; per 10. dies non deiecit.

## EXPLICATIO.

Multi hic sunt affectus intricati ab humoribus intricatis, & vario modo vitatiis in corpore contentis; quos humores cum excernere non valeat & ut melius pateat affectus de sequ. mixt. subinde cochl. j. assumat.

*Aqu. petrosel. ʒij. Theriacal. simpl. ʒij. Acet. fillat. ʒvj. Ocul. cancr. ʒij. Antimon. diaphor. ʒj. Laud. Opiat. gr. ij. Syr. quinq. Rad. ʒj.*  
 Jan. Commodè deiecit ab haustu hydragogi. Bene se habuit; conquestus est saltem de dolore in plantis pedum & lassitudine brachiorum.

## CASUS XCIV.

**V**ir quidam, cujus uxor profusio alvi valde fetido laboravit, quâ occasione ei semper adesse coactus intra spatium 7. dierum non dormivit, unde ante 10. dies incidit in febrem continuam, quæ illum circa vespeream invadit hor. 6. ubi primum summum frigus percipit in lumbis, quod deinde per totum corpus dispergitur, duratque aliquando per 3. 4. aut 5. hor. in ipso frigore ut & calore, summum capitis dolorem percipit, ingruente calore valdè fudat, sititque & pulsus debilis reperitur.

## CASUS XCV.

**V**ir quidam ante 4. septimanas levem dolorem in lumbis sensit, unde quasi levem auram ad caput ascendere ipsi videbatur, ut omnia in gyrum fecum ferri putaret, & sedere coactus fuerit; decidit in terram; totius corporis convulsionibus, cum stertore, spumâ ex ore effluente omnium sensum & aliarum perceptionum privatione correptus est; mens finito paroxysmo per 3. dies non constitit; loquela etiam tam diu im-

perita fuit; adhibita fuere medicamenta, unde paroxysmi non tam graves fuerunt.

Per 8. autem dies adeo mitigata sunt symptomata, ut bis vel ter sentiat paroxysmum, & antequam paroxysmus invadat illum, pullationes per totum corpus, inprimis in abdomine sentit, unde dolorem etiam gravem in lumbis totoque ventre & capite; manus dextra subinde contrahitur; inprimis autem pollicem in manu arcte tenet, quæ convulsio in illâ manu illum deserit, & migrat in sinistram; mens tamen in paroxysmis satis constat, pulsus contractus fuit, sed non debilis.

## EXPLICATIO.

Epilepsia virum hunc laborasse & adhuc laborare satis ex circumstantiis & symptomatibus recensitis patet, cum epilepsia alia sit gravior, alia levior; & alia cum sensuum privatione; hæc autem cum levioribus symptomatibus, sensibusque ex parte constantibus invadit; illam in principio, hanc vero adhuc patitur.

Causa autem proxima ipsius motus convulsivi & convulsionis fuit imprimis spiritus acidus volatilis minus acris, ad principium nervorum accedens, illique molestiam inferens, unde convulsio; hinc si considerentur omnia quæ ad motum animale five voluntarium concurrunt, unde bene perficitur, non difficile erit concludere quamam sit causa motus inordinati five convulsionis.

Quia vires satis constant in hoc ægro, de sequ. mixt. subinde cochleare j. assumat.

*Aqu. flor. tilia. ʒij. Theriacal. simpl. ʒvj. Antimon. diaphor. ʒj. Syrup. flor. pæon. ʒj.*

16. 17. Jan. Valdè debilis est pulsus; nihil alimenti assumit; non amplius vomit; Causa pulsus debilioris est sanguis vitiatas, ex quo spiritus generari non possunt, unde minor ventriculorum contractio.

Hodie 18. hor. 2. pomerid. vitam cum morte commutavit.

Annotata ex dissectione cadaver. ipsius. Musculi abdominis valdè tensi erant, sanguisque satis fluxilis ex minimis vasis effluebat.

Intestini coli pars in dextro latere ab omento non tegebatur; alias omentum satis benè se habebat; & minimâ pinguedine perfusum erat.

Vasa in superficie intestinor. valdè turgabant, majoraque quam naturaliter cernebantur.

Intestina tenuia una parte erant diaphana, in altera autem parte obscurioris & nigricantis coloris, uti contingit in gangrænâ, & hoc vitium contingit, si humor acidus valde peccat, unde ingentes dolores excitantur, de quibus etiam ab initio conquestus fuit; adhibitis autem iis, quæ spiritum acidum concentrant, melius se habuit. Intestinum tenue quod sub mesenterio circumlumborum regionem vergit, internâ suâ substantiâ valde erosa erat, & rubra, cæ in parte, quæ vergebat versus latera, albescens autem in illâ parte, quæ tendebat sursum versus ventriculû, signum effervescentiam ex humoribus, qui ex duobus ductibus pancreatico scilicet & bilario eodem deferuntur, & iusto acriores fuere, ibi factam esse, non autem usque adeo versus ventriculû, aliâs magis illa pars infestata fuisset, vapores autem & halitus ex illâ fervescentia excitatos & ad Ventriculû delatos esse satis testantur vomitiones, quas passus est æger, jam defunctus, in suâ vitâ.

Sub Ventriculo ductu transverso debuisset observari intestinum colon, quod in hoc subiecto latebat admodum, ut non commodè potuisset videri, ut aliâs solet.

Observandum est, intestinum colon naturaliter in latere sinistro ad partem ferè summam costarum spuriarum assurgere & à flatibus aut aliâ materiâ viscidâ, in illo contentâ disendi, unde nunquam tumor & dolor percipitur, & tunc sæpius culpatur lien, etsi nullum vitium in liene sæpius observetur, & sæpè talis tumor dolorve recurret; cum autem medicamenta incidentia flatuque discutientia adhibeantur, malum cessat.

In hoc subiecto flexio sygmoidea in latere dextro, ubi incipit intestinum colon assurgere, observabatur, quæ aliâs naturaliter non ita se habebat; sed lusu naturæ tale quid contigisse statuendum; in latere autem sinistro ubi naturaliter illa flexio sygmoidea observatur, de rat, & intestinum hoc colon rectâ descendebat.

Ventriculus in parte superiore & inferiore prominēbat & turgebat, in medio autem coarctabatur.

Phlegma, quid in Ventriculo reperiebatur, nigricantis erat coloris, cujus causam Cl. Sylv. iudicavit fuisse, quia medicamentis, quæ assumptis, lap. hæmatites fuit permixtus, qui talem supeditat tincturam.

Interna Ventriculi substantia quasi inflammata ac erosa erat; à materiâ acri eodem delatâ, unde vomitus; superius autem orificium planè albicantis erat coloris.

Pancreas benè se habebat, succus qui in eo re-

periebatur, subacidus & adstringens erat.

In cavitate abdominis aqua cruenta reperiebatur, sed paucâ quantitate.

In thorace omnia benè se habebant, nihilque præternaturam observabatur in cordis & pulmonum externâ substantiâ.

In cordis dextro ut & sinistro Ventriculo sanguis ater carneâ substantiâ circumvolutus extrahabatur; sanguine probè abluto carneâ substantia reperiebatur, tantaque acrimonia fuit in illâ aquâ, ut membranæ pleræque prorsus abraas essent.

Aqua quæ in pericardio erat, saporis erat acris & subacidi, subdulcis vero in fine sapiebat.

In capite sub tenui meninge sanguis extravasatus observabatur, & in utroque latere sanguis ille reperiebatur, non autem in anteriore, nec in posteriore capitis parte.

Vasâ admodum turgebant sanguine, inprimis in lateribus, unde si res ita se habet, pulsationes molestæ circa tempora percipiuntur.

In Ventriculis cerebri aqua reperiebatur, quæ salsa erat, & paululum acida, uti inter alios & ipse gustavit Cl. Sylvius.

In glandulâ pineali arenulæ observabantur, NB. Circa nervos opticos arteriæ carotides observantur, & quando sanguis copiosior aut acrior per illos defertur, dolor circa radices oculorum notatur.

Plexus retiformis seu rete mirabile Galeni egregiè in hoc subiecto cernebatur. In externis palpebrarum ad extremum canthum utriusque oculi majorem demonstravit Dominus Sylvius duos exiguos ductus; qui tamen admittēbant stylum minimum, prodeuntes ex glandulis, quæ sunt circa radices narium, & ex glandulâ quasi unus ductus primò prodit, qui dehinc in duos dispergitur ramos, qui desinunt in canthum oculi majorem.

## C A S U S X C V I.

**A**NCILLA quædam ante aliquot dies sensit levem calorem in lumbis, unde paulo post angustiam circa præcordia & palpitationem cordis sensit, sibi dehinc videtur aliquid sursum vergere versus fauces, quod semper deglutire coacta fuit, exinde levem patitur vertiginem, ut sedere cogatur; levem lubinde etiam sensit febrem; abdomen est distentum, in primis post alimentum assumptum magis angitur, & per aliquot dies non deiecit.

## EXPLICATIO.

Effervescentiam in intestino tenui circa lumbos fieri, satis manifestum est ex relatis aegri, dum de calore circa regionem lumborum conquesta fuit, materiam autem ex qua effervescentia ista contingit, bilem pituitam esse, ex ductu pancreatico & bilario in illud intestinum delatum, arguit Dominus Sylvius, unde halitus & flatus elevati fufum versus cor, fauces & caput symptomata illa excitant; inprimis autem acidus esse istos halitus arguit contrictio faucium, ut semper in faucibus quid haerere videatur nostrae aegri, quod symptoma speciem suffocationis hystericae (uti vulgo dicitur) denotat, abdomen autem distentum a flatibus provenire verum videtur. NB. Oleum succini, destitutum est in suffocationibus uterinis, scateat enim facile volatili, unde corrigitur spiritus acidus, & ratione olei spiritus volatilis.

Tinctura succini optimè adhibetur in hystericiis affectionibus, sed quia in quibusdam pharmacopoeis non prostat, loco ejus tinctura caliorei praescribatur.

7. Melius se habuit, quoad suffocationem & vertiginem, ut & reliqua symptomata, conquesta tantum fuit, de ardore ventriculi, quasi carbonem vivi in illo essent, & assumpto potu hoc symptoma maxime urget, Germanis dicitur *der fohr*, itaque duabus vicibus sequi pulverem in cochli. cerevisiae assumat.

R. *Cret. alb.*

*Bol. armen. ana ʒss.*

*Mund. char.*

NB. Bolus Armena non tantum praestat uti creta, sed ideo additur, ne ab aegris rejiciatur medicamentum; si sola creta addatur.

## CASUS XCVII.

**A**ncilla quaedam per tres menses laboravit febre quartana, quae ingruit summo cum frigore in lumbis, quod dehinc dispergitur per totum corpus, inprimis autem quia per quatuor septimanas venter pedesque valde intumuerant, ab illo tempore frigus maxime sensit, circa praecordia, ventrem & pedes; frigus, quod valde molestum, durat per duas horas, in quibus valde tremat; calor, qui frigus subsequitur, valde molestus etiam est; antequam paroxysmus illi invadit, valde sitit, non autem in paroxysmo, sed die quoque sequente post paroxysmum; noctu non potest quiescere; alvus non satis re-

spondet. Quia autem sequenti hac nocte expectat paroxysmum, cuius ratio habenda est; de sequi mixtura cochli. j. subinde assumat, & redeunte paroxysmo cochli. iij. assumat.

R. *Agu. fenic. ʒij.*

*Theriacal. simpl. ʒj.*

*Acet. stillat. ʒss.*

*Laud. Opiat. gr. ij.*

*Antimon. diaphor. ʒss.*

*Ocul. Cancr. ana ʒss.*

*Syr. de quinque radic. ʒj.*

*M.*

## CASUS XCVIII.

**V**ir quidam per 8. dies febre quotidianâ laboravit, ubi primò in lumbis sensit summum frigus, quod dehinc per ductum dorsii deferretur ad caput, unde capitis dolorem & vertiginem sensit; noctu non potest quiescere; alvus haecenus fuit constipata, sed assumto prunor. brodio, jam laxa est.

14. A medicamento hydragogo quodam assumto non deiecit, sed sensit dolorem tensionum sub umbilico, qui transverſim fertur ad latus dextrum, & hic dolor est in intestino colo, quia nullum est intestinum, quod transverſim fertur, quam Colon, & quia medicamentum hydragogum debile fuit, ad expellendos viscidos humores, excitati sunt flatus.

## CASUS XCIX.

**F**oemina quaedam per 3. menses laboravit febre quartana, & jam per mensem incidit in tertianam, cum ingruit paroxysmus summum frigus valdeque molestum sensit in lumborum regione, quod dispergitur inde in totum corpus, duratque per 2. hor. calor autem dehinc; qui sequitur frigus, valde molestus est, ut etiam in terram decumbat, ad contemperandum calorem, in calore valde sudat, alvus praeterea satis respondet; noctu non commode quiescit. Itaque de sequi mixtura subinde cochli. j. assumat, & urgente paroxysmo s. aut 6.

R. *Agu. Ment. ʒij.*

*Theriacal. simpl. ʒvj.*

*Acet. stillat. ʒss.*

*Ocul. Cancr. ʒss.*

*Syr. quinque Radic. ʒvj.*

*M.*

25. Conquesta est hodiè de dolore punctorio in dextro hypochondrio, qui subinde recurrit; & melius se habet, præsertim si emittit flatus.

## C A S U S C.

Mulier quædam per 14. dies laboravit doloribus totius corporis & imprimis jam conquesta est de doloribus capitis; febrem sentit quotidie, sed magis de calore, quam de frigore conquesta est; assumsit ante hæc purgans, à quo alvus hæctenus laxa, sed quia jam adhuc in primis dolor capitis & totius corporis durat, febris quoque lenta ipsam comitatur, de sequi mixturâ subinde cochl. j. assumat;

Rx. *Aqu. petrosel.*

*Hyssop. ana ʒiſs.*

*Theriacal. simpl.*

*Acet. stillat. ana ʒſs.*

*Ocul. Cancri ʒſs.*

*Laudan. opiat. gr. ij.*

*Antimon. diaphor. ʒi.*

*Syr. quinque Rad. ʒſs.*

*M. ʒij.*

Hæctenus mediocriter se habuit ab assumptâ mixturâ cum Laudan. opiat. sed conquesta est de dolore artuum, & inprimis ventris; caput foedum fuit ulceribus, quæ ulcera per aliquot septimanas habuit, & suspecta ab aliis habita fuit, quasi specie luis Venereæ sit affecta, quia maritus tali lue correptus est. Hodiè 7. Febr. cum satis bene se habuit, statim in pejus res ejus mutatae sunt, & obijt.

Annotata ex Anatome hujus mulieris.

Aperto abdomine intestina nullo omento tegebantur, sed sursum planè erat retractum, & ad latitudinem 3. digitorum transversorum circumcingebat epatis superficiem, eratque omentum foedi coloris; præterea omentum adhærebat ventriculo. Magna aquæ copia in abdomine erat contenta, & quidem valde acris, quæ suâ acrimoniâ partem intestinorum, quæ hærebat in fundo, abraſit, ut planè nigra, & principium gangrænæ repræsentarent; pars autem intestinorum, ad quam aqua non pervenit, pallidioris erat coloris. Peritonæum etiam ab aquæ acrimoniâ abrasum erat. Pus circa uterum reperiebatur valde foetidum; tubis uteri vesiculæ aquâ repletæ adhærebant. Intestina flatibus valde turgebant, omnium maximè intestinum colon in illâ parte, ubi flexio illa sigmoidea observabatur, quæ alias

naturaliter in sinistro latere notatur, in hoc autem subjecto in dextro latere cernebatur, quod contigit ab ingentibus doloribus, unde intestina veluti contorquebantur. Hepar firmiter annectebatur ventriculo ac diaphragmati, & valdè deorsum prominebat, eratque pallidi coloris. Lien major quàm naturaliter, satisque magnus conspiciebatur; pars superior pallidioris, inferior verò lividioris erat coloris.

In vesiculâ fellis 75. calculi formâ triangulari reperiebantur, sed in paucâ bilis quantitate. Intestinum tenue, in quod inferuntur duo illi ductus bilarius scil. & pancreaticus valdè excoriatus erat; & hoc contingit, quia parvâ in quantitate bilis adfuit, unde acrimonia aliorum humorum acidorum & acrium per ductum pancreaticum eò delatorum à bilis defectu non potuit corrigi, unde excoriatio. Vesica Urinaria formam triangularem repræsentabat, ejusque orificium, quod naturaliter albere debebat, valdè rubebat, & quasi levem inflammationem adesse cernebatur, quod contigit ab urinæ acrimoniâ. Cavernulæ in uteri substantiâ internâ observabantur, quibus inflatis tumeabant uteri tubæ. Ex orificio uteri interno materia viscida & quasi purulenta effluebat, qualis solet excerni in illis foeminis, quæ gonorrhæa laborant. Pulmones undique adhærebant non solum pleuræ, sed & ipsi diaphragmati. Aqua cruenta in latere dextro thoracis observabatur; & dexter lobus pulmonis naturaliter penè se habebat, sed sinister ferè erat consumptus, exiguaque ejus vestigia apparebant, multumque puris & aquæ exhauriebatur, talis, qualis solet excerni in phthysi. Membrana quæ pulmones cingebat, decuplo crassior erat, in lobo pulmonum sinistro exulcerato, quàm in lobo dextro, qui naturaliter se habebat. Vesicula quasi candelâ combusta in cordis superficie apparebat, quod contigit ab humorum acrimoniâ, qui ubi subsistunt, simile quid ob suam acrimoniâ causant. NB. Cum inflaretur ductus thoracicus seu chyliferus, intumescibat vena azygos, & vena cava; cor movebatur, & pulmones extendebantur. In cute capitis foeda notabantur ulcera, quæ cutem tantum & pericranium affecerant; sed cranium nondum aliquid passum est, nisi hinc & illinc levia vestigia apparebant; & hoc notandum in lue venereâ, ubi ulcera ad ossa perveniunt, unde caries ipsorum sequitur, & non solum dolores intolerabiles patiuntur illi, qui hoc affectu correpti sunt, sed & incurabilis est affectus ille, & adhibentur frustra remedia. In cerebri omnia bene se habebant.

## CASUS CI.

**V**ir quidam per 4. septimanas laboravit febre quartanâ, quando ingruit paroxysmus sentit frigus in lumbis, quod instar cinguli ambit abdomen, duratque per 4. hor. calor, qui frigus subsequitur tanto quoque tempore durat, sed non adeo molestus, in calore sentit capitis dolorem; sitit; præterea alvus per aliquot dies fuit constipata; Præscriptus est haustum hydragogus purgans & mixtura temperans humores.

## CASUS CII.

**A** Neilla quædam per 14. dies laboravit capitis gravedine, i. e. *hat den Schnupfen* sed per 2. dies conquesta est de ventris & lumborum dolore ingente, ut & capitis; alvus per 3. dies constipata fuit, itaque cras manè assumat haustum hydragogum.

25. Jan. Semel copiose deiecit; conquesta fuit de summo capitis dolore, ut non loqui, nec loquentes audire sive perferre posset, de sequ. itaque mixturâ cochleatim assumat aliquid sæpius.

*Rx. Aqu. petrosel.*  
*Fenicul. ana ʒij.*  
*Acet. stillat. ʒvj.*  
*Tinct. Cinamom. ʒij.*  
*Ocul. Cancr. ʒß.*  
*Laud. opiat. gr. ij.*  
*Syr. de betonic. ʒij.*  
*M.*

## CASUS CIII.

23. Jan. **V**ir quidam per 8. dies laboravit febre quartanâ; frigus sensit primò in lumbis, quod dehinc in totum corpus diffusum est; sed non est molestum; calor qui frigus subsequitur, molestior est; de summis ventris doloribus conquestus fuit; per 3. dies non deiecit.

27. Hodie habuit febrem, quæ autem non adeo molesta fuit; conqueritur de doloribus circa ossa, qui magis urgent circa vespem, ut noctu non possit dormire, quia autem uxor laborat lue venerea, hæc signa videntur etiam aliquam ejus speciem indicare; de sequ. ergò decocto singulis

diebus haustum manè assumat, & si alvum non deponit, à meridie iterum, & sic bis in die.

*Rx. Rasur. lign. Guajac. ʒiij.*  
*Baccar. Junip. ʒij.*  
*Pulp. colocynthid. ʒj.*  
*Sem. Anis. ʒiij.*  
*Coqu. f. a. ex aqu. pur. ad Colatur. ʒxxx.*  
*in quibus dissolv.*  
*Syr. de helleb. nigr. ʒiij.*  
*Aqu. Theriacal. simpl. ʒj.*  
*M.*

Indies post assumtum decoct. melius se habet.

## CASUS CIV.

**C**larissimus Dominus Sylvius Amstelodami ad foeminam aliquam vocatus fuit, quæ jam per tempus aliquod acerbissimum dentium dolore vexata fuit, cui cum præsens Medicus dentem evelli curavit, malum ad proximum dentem ferpebat, quem Medicus quoque evelli jussit, ita ut brevi aliquot dentes evellerentur; interim illa vix aliquod levaminis cum sentiret, illis tandem fessa malis, tum etiam Cl. Domin. Sylv. in consilium adhibuit, qui postquam nihil noxii in dentibus percepit, miratus imprudentiam prioris Medici, tandem mixturam ad sopiendum dolorem præscripsit, quâ dolor etiam fuit sopitus; quo sopito, medicamentum blandè purgans præscripsit, quo humor educeretur, hocque assumto tanta ventris tormina percepit, ut sibi intestina quæ contorqueri & convelli sentiret, quâ materia e ductâ, plenè planeque restituta est.

## CASUS CV.

22. Jan. **V**ir quidam per 2. menses sanguinem expuit, assumta autem conservâ rosar. sanguinem jam non amplius excernit; per aliquot septimanas conquestus est de dolore pectoris, quando tussit, phlegmata alba ac viscida tussiendo excernit, de sequ. mixturâ assumat.

*Rx. Aq. Hyssop.*  
*Fenic. ana ʒiß.*  
*Acet. stillat. ʒvj.*  
*Tinctur. Cinamom. ʒij.*  
*Ocul. Cancr. ʒj.*  
*Sang. dracon. gr. vj.*

*Syr. quinque Rad. ʒij.*  
M.

23. 24. Jan. Magnum levamen habuit, dolor in pectore planè cessavit, adhuc phlegmata alba & viscida excernit tussiendo.

25. Hâc nocte suffocatus obiit.

### C A S U S C V I.

**V**Ir quidam incidit in aquam frigidam, unde valdè perterritus & frigeffectus sensit dolorem & frigus in lumbis; pulsus est contractior (hic signum est febris,) alvus laxior.

Quia malum ipsi ab extrâ contigit, & his in casibus sudorifera valdè profunt, de sequ. mixturâ cochleatim & sæpius assumat.

*R. Aqu. petrosel. ʒij.*  
*Fenic. ʒj.*  
*Theriacal. simpl. ʒvj.*  
*Acet. stillat. ʒß.*  
*Antimon. diaphor. ʒß.*  
*Syr. quinque Rad. M.*

Optimè se habet.

### C A S U S C V I I.

**V**Ir quidam valdè incallescens se exposuit frigori, ubi brevi post insigni febre correptus est, & sensit dolorem in lumbis, ut & frigus ac calorem, ita ut sæpissimè in die mox incalcescat, mox refrigescat; dolor dehinc ex lumbis dispergitur per totum ventrem, ut omnia intestina quasi contorqueri ipsi videantur; cardialgia adest; alvus segnior, sitit, & quando potum non assumit cochleatim, eum statim evomit; quæ evomit, amara sunt. Dolor in lumbis nonnunquam tantus est, ut in terram sæpè concidat, & nesciat, quomodo se habet; non potest quiescere.

### E X P L I C A T I O.

Causa horum symptomatum deduci potest ab effervescentiâ in intestino tenui factâ, ab humore pancreatico & bilario in intestinum illud effuso, hinc quia spiritus acidus quàm maximè peccat, quod deduci potest ex ingenti dolore; ad varias autem partes spiritus ille acidus delatus varia quoque instituit incommoda; bilis autem ex illâ effervescentiâ sursum ad ventericulum ejuf-

què orificium superius delata vomitum cardialgiamque instituit.

### C U R A T I O.

Ut vitium humorum illorum emendetur, de sequ. mixturâ sæpius cochleatim assumat.

*R. Diascord. Fracastor. ʒij.*  
*Syrup. Card. Bened. ʒiß.*  
*Aqu. theriacal. simpl. ʒß.*  
*Acet. stillat. ʒvj.*  
*Ocul. Camer. ʒj.*  
*Aqu. fenic. ʒiß.*  
M.

2. Melius se habuit post assumt. cholagogum, à quo quater purgatus est, & in omnibus levamen sensit; conquestus est de dolore faucium, itaque coquantur rapæ in aqu. pur. & assumat de jusculo ad gargarisand. fauces.

5. In omnibus levamen habuit, optimeque cum illo fuit.

### C A S U S C V I I I.

9. Maji. Anno 1664.

**J**Uvenis quidam ante 10. septimanas febre tertianâ laboravit, per aliquot autem dies febris quotidiana illum afflixit; quando paroxysmus illum invadit, dolorem sentit in lumbis, & frigus durat per sesquihoram, calor autem per 2. hor. in calore valdè sitit; appetitus alias est prostratus; urgente calore caput dolet; adhibita sunt Vomitoria, non tamen vomuit, non nauseat; alvus satis est laxa; paroxysmus febrilis cum sudore cessat; quia autem uterque humor peccat, bilis nempe & pituita, alterantia commodè hic adhibentur, & quidem in formâ mixturæ præscripta.

10. Pondus in ventre sentit; anticipat febris; frigus non fuit grave; venter subindè tumet; heri fuit immunis à febre; hodiè paroxysmum habuit; pergit in assumptione mixturæ hujus.

*R. Aqu. petrosel & fenic. ana ʒß.*  
*Theriacal. simpl. ʒj.*  
*Acet. stillat. ʒx.*  
*Antimon. diaphor. ʒß.*

12. Maji. Hodie horâ undecimâ antimeridianâ paroxysmus illum investavit; frigus primò sen-



fit in lumbis; quod dehinc secundum dorsum dispersum fuit, duravitque per sesquihoram, calor vero per 2. hor. in calore valde sudavit, ut & postquam paroxysmus penè remisit sine tegumentis corpori adhibitis.

*Laud. Opiat. Gr. ij.  
Syrup. de Fenic. ʒj.  
M.*

Optimè se habet.

## CASUS CIX.

9. Maji. **J**Uvenis quidam sub hypochondrio punctiones sensit, per tempus aliquod subinde remittentes, quod malum contraxit, postquam valde calidos frigidam largiter assumerit; dolores autem tanti fuere, ut vix loqui prædoloribus posset; Medici qui ipsi adfuerunt, judicaverunt esse pleuritidem & venam secare ante 6. dies mandarunt, quod etiam factum, dolores quidem paululum remisserant, sed tamen adhuc satis molesti sunt ipsi; post V. S. anhelosus factus est, & difficilis respiratio ipsum urget. Judicat autem Cl. Sylv. malum illud in ventre & potius intestino tenui locum habere, flatuque ex pituita & bile peccantibus excitatos fuisse, murmura enim subinde in intestinis percipere æger asserit, itaque necessum est, ut flatuum generatio impediatur, flatuque producti discutiantur; 2. ut humores peccantes emendantur, & sensim educantur, itaque præscribatur decoct. ex ingredientibus quæ scatent sale volatili.

12. Maji. Per aliquot noctes non quiescisse retulit, & noctu pejus se habet cum decumbit, quam si de die sedeat; noctu enim sentit dolorem in hypochondrio sinistro, unde quasi aliquid ascendere ipsi videtur, & angere pectus; mirum autem est, quod tale malum non contingat de die, sed de nocte, quando decumbit in lecto; & putat Cl. Sylvius rationem esse, quia quædam plumæ gravem spirant odorem, unde aliquid volatile elevatur, quod corpori nostro se insinuat, & promovet, motum alicujus humoris in eo, qualis qualis ille etiam sit, unde effervescentia tunc contingit, & quæ potest aliquid elevari, quod varia constituit commoda, prout ad varias deferuntur partes; quia autem non planè liber à febre est, & humores peccantes correctionem requirunt, & somnus ut ipsi concilietur, necessum est, ergo sequi mixturam cochleatim assumat.

*Rx. Aqu. petrosel. ʒij.*

*Fenic. ʒj.*

*Acet. stillat. ʒvj.*

*Antimon. diaphor.*

*Oil. Cancr. ana ʒi.*

*Spir. Vin. redif. ʒss.*

## CASUS CX.

9. Maji. **V**Ir quidam portavit onus grave, unde debilior factus in lumbis & sub costis dolorem sentit, subinde febricitat; debilis est, in cruribus circa articulationes cruris tam dextri, quam sinistri potius rigorem, quam dolorem sentit, magis tamen in dextro, quam in sinistro crure; nullus tumor in cruribus observatur; sapor ingratus in ore est, aliàs de nullis amplius symptomatibus est conquestus. Quia vitium in fero esse videtur, ideo præscribitur ipsi purgans hydragogum.

12. Maji. Sudavit, sed paululum, nullum notabile levamen adhuc in pedibus sentit, quod non mirum; quia enim est malum inveteratum, necesse est, ut tractu temporis illud corrigatur.

14. Maji. Vesperi cum decumbit, dolorem capitis sentit, interdiu autem non; manè quando surgit, paululum ambulare potest, sed statim defatigatur, & sedere cogitur; tumor in sinistro pede major, quam in dextro, ut & dolor, (potest autem tumor & dolor dependere à materia ferossâ viscidâ & acri) alvus per duos dies fuit adstricta, sudavit paululum ab assumpto decocto; nihil autem deiecit per alvum, ut educantur humores ferosi.

17. Maji. Maculæ scorbuticæ cum dolore præterea accedunt, quod non tam malum signum, quia ad superficiem sensim malum propellitur. Externe crura illinat sequi. Ungu.

*Rx. Ung. Martiat.*

*Ol. Lumbic. ana ʒij.*

*M.*

20. Maji. In eodem statu fuit, sed hodiè 21. Maji cruris tumor versus inferiora minuitur; in superioribus in eodem statu permanet, dolor in interioribus tumoris est, scil. in musculis, seu eorum carne, humor acris adest, dolor vero hic non est à distensione, melius habet, cum decumbit, pejus autem ubi surgit, idque ad meridiem usque ratio quia sanguinis fluxus, dum extrâ lectum est, non aquè præcedit, qui sanguis, ubi magis hæret, majorem molestim creat, deinde etiam reliqui humores, qui in habitu sunt, dum, cum interdiu magis moventur, malum augent, deinde

deinde tempore somni à spiritibus volatilibus in somno acris ille humor magis temperatur.

Scorbutus sæpe in interioribus est satis vehemens, & tunc nullæ maculæ adsunt, sæpe exteriores partes magis afficit, & tunc maculæ apparent; interdum ubi malum ad extremum pervenit, ut ex interioribus ad exteriora penetret, & tum maculæ similiter apparent. Balneum & fotus hic conveniunt, nisi sumptibus parcendum esset, & tunc Decoct. lign. Guajac. & Baccar. Junip. convenirent.

24. Maji. Pedum tumor non tam durus nec magnus nec etiam tensio tanta. Sensit dolores ventris hodiè, (potest fieri, ut humores, qui in pedibus diu hæserunt, doloremque causarunt, magis soluti sint, & ad intestina delati unde dolor) & pro bono signo habet Cl. Sylv. dolor in pedibus valde diminutus.

1. Junii. Benè se habuit, sed die 2. pejus, & hoc sensit, quod alternis diebus pejus habeat, hinc non dubitandum, quin aliquid febris intercurrat; nullus enim affectus præter febrem per paroxysmos invadit; pejus autem habuit hic æger, quoad dolorem & tensionem in cruribus. Ad fomentandos pedes

R. Rad. Alth. ʒij.

Fol. Absinth.

Abrotan.

Card. Bened.

Matricar.

Summitat. Melilot.

Chamomill. Rom.

Flor. Sambuc. ana. M. j.

Baccar. Junip. ʒijij.

Laur. ʒj.

Sem. Cumin ʒss.

Concis. & Contus. d. ad Chart.

Coq. in f. q. cerevis. tenuior. aut aq.

Cum Decoct. calid. pedes foveantur.

16. Junii. Rigiditas in pedibus & quidem in furis adhuc permanet; tormina in ventre habuit; commodum esset, si liceret instituire fomentum ex Spir. Vin. paratum. Sed interea alia quæ etiam præstantia sunt, non intermitteremus; addantur igitur fomento supra præscripto Fæc. Vin. lbj. quæ in hoc casu egregiæ sunt. Post fotum sequi linimento illinantur suræ, & quidem illo in loco, ubi maximam persensit rigiditatem.

R. Spir. Vin. Rectif. ʒijij.

Campb. ʒss.

Ol. Succin. ʒj.

M.

In tali casu quoque convenit Ol. de lateribus & balsamus Sulphuris.

18. Junii. Circa finem musculorum inprimis in dextro pede in tendinibus puta, majorem rigiditatem sensit, quam aliàs, quod potest esse à materiâ viscidâ eò delatâ, unde ubi difficilior distenditur, ob partes membranosas, facilius autem in partibus carnosis.

## C A S U S CXI.

9. Maji. **V**Ir quidam per aliquot septimanas febre tertianâ laboravit, & adhuc laborat; ingruente paroxysmo frigus sensit in lumbis, quod durat per sesquihoram, calor autem per 4. hor. & in paroxysmo distensionem ventris patitur.

24. Per aliquot noctes valde sudavit, & quidem horam post cum petierit lectum; noctu dum sudat, non quiescit, sed manè & interdiu dormit; in principio sudoris sensit dolorem magis urgentem in hypochondrio sinistro, quam aliàs; alternis diebus febricitat, & dum febricitat, dolor in hypochondriis gravior est, non negandum tamen, cum tam sudet, illum febricitare etiam, ab effervescentiâ enim factâ in intestino tenui, dolor in hypochondrio, & quicquid ad cor deducitur, ibique novam effervescentiâ instituit, febris quoque oritur, & in paroxysmo, tunc sudor erumpit, non autem malum hic sudor videtur signum, & spes est, brevi inde fieri mali solutionem.

25. Maji. Hodiè habuit febrem, frigus duravit ultra horam, calor non molestus fuit; in frigore pulsus frequens & compressior; in calore frequens & dilatator; caput dolet nonnunquam in frigore, nonnunquam in calore, nonnunquam etiam extra paroxysmum ab aliquo acre, quod elevatur ante paroxysmum, & partes capitis sensibiles lancinat; quod autem quædam magis capitis doloribus sint participes, provenit à partium constitutione, quatenus in hoc subiecto partes magis aptæ sunt ad recipiendum vitiosum humorem, quam in alio.

30. Maji. In lumbis tempore paroxysmi dolores lancinantes sensit, non tamen adeo gravis fuit paroxysmus; noctu dolorem cinguli adinstar ventrem ambientem sensit; circa finem autem paroxysmi ventris tumorem habet. Putat Cl. Sylv. circa finem febris aliquam pituitâ viscidâ partem in status jam abire.

14. Hesternâ die assumit lac dulce, unde tormina in ventre sensit, quæ deducenda sunt à lacte coagulato, uti hoc in melancholicis fit, qualis & hic æger est.

NB. In lactis coagulatione pars butyrosa cum caseosa jungitur, serosa verò separatur. Idcirco lac coagulatum per flos volatilia & plantas aromaticas similiaque medicamenta, quale est sequi. corrigitur.

Rx. *Aqu. Menth.*

*Puleg. ana. ℥ij.*

*Theriacal. simpl. ℥iss.*

*Syr. de Fenic. ℥ij.*

*M. assumatur Cochlearim.*

## CASUS CXII.

9. Maji. **V**ir quidam conqueritur adhuc de gravitate totius corporis, imprimis autem artuum inferiorum; alvus semper adstricta est, nisi adhibitis medicamentis laxior redatur.

## CASUS CXIII.

9. Maji. **F**œminæ cuidam circa vespere ventem intumescit; alvus est adstricta; in regione ventriculi compunctiones sentit sub costis; nausea subinde adest; sapor amarus horis matutinis in ore, & tunc incalcescit; manè circa regionem renalem sentit dolorem, qui antrosum vergit, nauseamque excitat; calore accedente melius se habet, & tum aliquid quasi fauces comprehendit; nullum frigus sentit.

## EXPLICATIO.

Malum hoc species est affectionis hypochondriacæ, & pituita viscida & stiptica hic peccat, & illa imprimis ratione visciditatis; bilis autem peccat, quod non possit pertransire pituitam, ut magis vires suas exerat.

## CASUS CXIV.

9. Maji. **F**œminæ quædam quæ hætenus scrophulis laboravit, indies jam pejor habet, & scrophulæ indies excrescunt & duriores fiunt, & subinde suffocatio uterina eam infestat.

10. Maji. Hodie dolores ingentes circa lumbos sentit, ut partes quasi dilacerari videantur; ut igitur magis incidatur & attenuetur pituita vi-

scida in glandulis hærens, de sequentibus pilulis cras manè, quinque assumat.

Rx. *Gumm. Galban. c. acet. pp. ℥℞.*

*Chalyb. pp.*

*Mastic. el. ana. ℥j.*

*Carabes albiss. Gr. xv.*

*Myrrh. Rub.*

*Castor. ana. Gr. XII.*

*Croc. Britannic. Gr. VIII.*

*Trochisc. Albandal.*

*Resin. Jalapp.*

*Scammon. ana. ℥j.*

*Ol. Gran. Junip. Gutt. vi.*

*M. f. a. & f. Pilul. No. L.*

12. Maji. Quinque deiecit à pilulis, & quidem magnâ copîa; antehac pilul. assumsit, illas tamen non tam potenter operatas esse testatur, sed doloribus totius corporis affligitur, ut & capitis dolore tumores scrophularum majores sunt, quam unquam fuere.

19. Maji. Conquesta est de dolore lancinante & pungente capitis, in parte inprimis anteriore; dolorem sentit in lumbis; assumsit de pilulis, à quibus ter deiecit.

7. Junii. Hætenus mediocriter se habuit; pilulis subinde usa est; scrophulæ in sinistrâ colli parte penè curatæ sunt, non item in parte dextrâ, hodiè 23. Jun. conquesta est de summâ capitis gravitate, quam per aliquot dies sentit; non rejicit phlegmata per os, sed in faucibus materiam hædere refert.

Rx. *Fol. Majoran. recent. P. j.*

Aliquot folia terantur, & naribus indantur.

## CASUS CXV.

**M**ulier quædam quartanâ hætenus laboravit, & quidem per 8. septimanas; paroxysmus cum calore ingruit, qui sentitur in lumbis, & semper ferè calor adest, nullum autem frigus; cum febris discedit, venter inflatur; molestissimè tussit; calor, cum ingruit paroxysmus, in lumbis incipit, & in hypochondrio dextro aliquando commoratur, desinit demum in sinistro; durat autem paroxysmus per 12. horas, in quo tussis valde molesta est, eaque sicca, horis matutinis hæmorrhagiam narium satis largam patitur; in principio hydropæ laboravit, & in sinistro hypochondrio apostema habuit; febre discedente totum corpus sudore diffluit; alvus adstricta est; sequenti die post

post paroxysmum tumor ventris illam infestat.  
Præscriptum est sequ. Decoctum.

R. Rad. Levistic. ʒj.  
Apii. ana. ʒj.  
Sem. filer. montan.  
Dauci. ana. ʒij.  
Baccar. Junip. ʒiſs.  
Coqu. ex aqu. pur. ad Colatur. ʒxxx. quibus  
add.  
Syr. de Helleb. Nigr. ʒiij.  
Tinct. Cinamom. ʒſs.  
M.

De hoc Decoct. bis terve in die haustulum  
assumat.

## C A S U S CXVI.

Mulier quædam per longum tempus valetudi-  
naria fuit, unde corpus planè emaciatum;  
phlegmata ejicit multa, magis purulenta quàm  
viscida; aphtis quoque per aliquot dies laboravit,  
& valdè debilis est, ardorem summum in fauci-  
bus sentit & valdè tussit, Phlegmata illa purulen-  
ta exulcerationem pulmonum arguunt, & phtysi  
hanc feminam laborare certum est, quia autem  
de aphtis valdè conquesta, de sequ. utatur me-  
dicamento.

R. Aq. Hord. ʒij.  
Syr. Viol. simpl. ʒiſs.  
Lap. Prunell. ʒſs.  
M.

Obiit.

## C A S U S CXVII.

II. Maji. M Ulier quædam per longum tem-  
pus laboravit ex ulcere colli ve-  
ficæ; unde urinam cum summâ difficultate & sum-  
mis doloribus emittit, itaque de sequ. mixturâ  
subinde cochleatim assumat.

R. Aqu. Petrosel.  
Fenic. ana. ʒiſs.  
Acet. Stillat. ʒſs.  
Tinct. Cinamom. ʒiij.  
Antimon. Diaphor. ʒj.  
Laud. Opiat. Gr. iij.  
Syr. de Fenic. ʒj.  
M.

R. Mass. Pil. de Gynogloss. ʒj.  
Form. Pilul. No. IX.  
Sumat. subinde j.

Ab assumptis pilul. semper sentit levamen.

## C A S U S CXVIII.

9. Maji. M Ulier de summo ventris dolore in  
dextro hypochondrio conquesta  
est, in cujus auxilium sequ. Mixtura est præscr.

R. Aqu. Fenic. ʒij.  
Theriacal. simpl. ʒſs.  
Acet. Stillat. ʒvj.  
Ocul. Cancr. ʒſs.  
Laud. Opiat. Gr. ij.  
Syr. quinq. Rad. ʒvj.  
M.

Quinques in die sumat cochl. j.

## C A S U S CXIX.

9. Maji. A Nte quadriennium ancilla labora-  
vit febre erraticâ, ex quâ restituta  
est, & ante 14. dies incidit in febrem quarta-  
nam, frigus ingruente paroxysmo ipsi non est mo-  
lestum, magis autem calor.

## C A S U S CXX.

9. Maji. M Ulier quædam cum valdè caleret  
se frigido exposuit aëri, eadem  
calecta subito frigus passa est, inde malè se  
habuit, & colli glandulæ tument, præscripta est  
mixtura.

11. Maji. Melius se habet, sed die 12. con-  
questâ est de mensium fluxu, qui typam non ser-  
vat, & fluxus est diminutus & rarior, ut autem  
sanguis magis disponatur, & ad fluxum illum na-  
turalem promovendum de seq. decoct. singulis die-  
bus haustum assumat, & continuet in illo assu-  
mendo, donec illud abfolverit.

R. Rad. Angelic. ʒj.  
Levistic. ʒſs.  
Spic. Nard. Indic.  
Schoenanth. ana ʒſs.  
Fol. majoran.  
Puleg.  
Arthemis. Rubr.

*Sabin. ana. Mj.**Sem. dauc.**Anis.**Cinamom. acut. ana. ʒij.**Baccar. Junip. ʒi.**Coqu. f. a. ex aqu. pur. ad colat. ʒxxx.**add.**Syr. de Arthemis. ʒij.**Spir. Vin. rectif. ʒij.**M.*

## CASUS CXXI.

8. Maji. **M**ulier quædam per aliquot dies febre ardente laboravit; & gravi capitis dolore; præscripta est Mixture cum Laud.

10. Non melius se habuit, ab assumptâ mixturâ, sed ardorem in oculis percipit, alvus segnior est; cras assumat haustum cholagogum.

11. Maji. Paulò melius se habet hodiè, ardor non tantus amplius est in oculis, nec dolor capitis; commodè ab assumpto haustu purgante alvum deposuit, tumor tamen in crure adhuc illam molestat, & videtur humorem non solum ex parte beneficio medicamenti eductum, sed & magis versus illas partes motum.

## CASUS CXXII.

9. Maji. **M**ulier quædam, quæ ante 9. septimanas scetum enixa est, 14. dies post tempus illud exclusionis tumorem & dolorem cruris sentit; tumor est œdematosus, & mulier subinde febricitat. Hoc malum nonnunquam circa pauperculas contingit, quando non benè ab obstetricibus tractantur circa partum.

NB. In puerperis leniter procedendum, & talia, quæ humorem peccantem temperant, imprimis verò roborantia adhibenda.

Hactenus pessimè habuit, hodiè 20. sua mala paululum referre potuit, nempe secundinas nondum esse exclusas, itaque assumat haustum decoct. Casu LXI. præscript. quod ad menses & secundinas expellendas est egregium. Obiit.

## CASUS CXXIII.

9. Maji. **F**œmina quædam per aliquot septimanas subinde febricitavit; cum

ingruit paroxysmus, frigus sentit in lumbis, quod durat per horam, calor autem qui subsequitur; per 3. hor. tussit, quamdiu febricitat; in calore nonnunquam delirat; jam per 2. dies copiosè sudavit, ex summo animi mœrore morbum sibi contraxisse facta est.

## CASUS CXXIV.

10. Maji. **M**ulier quædam per aliquod tempus febricitavit, frigus primò sensit in lumbis, quod dehinc per totum corpus est dispersum; frigus per semihoram duravit, calor autem per 2. hor. & in calore deliravit, febris autem hæc fuit quotidiana intermittens; per aliquot autem dies febris valdè declinavit, attamen aliquot ejus adsunt vestigia, alvus non satis respondet.

Quia autem malum hoc penè superatum est, tamen ut humores magis corrigantur & educantur, citiusque promoveantur, de sequ. decoct. singulis diebus manè bonum haustum assumat.

*ʒ. Herb. Taraxac.**Cichor.**Fumar.**Fenic.**Bethonic. ana. M. j.**Tamarind. ʒij.**Coqu. ex aqu. pur. add.**Syr. de Rhubarb. simpl. ʒijss.**Misc.*

## CASUS CXXV.

10. Maji. **M**ulier quædam per 22. septimanas fluxum mensium non habuit, dolor in utroque ventris latere, venterque turgidus fuit, ante 6. septimanas in summam pedum debilitatem incidit, qui subinde tument, subinde autem detument; ardor in interioribus frigus in exterioribus viget; antequam in hoc pedum malum incidit, quoties per urbem ambularet, vehementissimè tremebat, & post in illud pedum malum incidit; purgantia quoque circa idem tempus fuere adhibita, nullo tamen cum levamine; antè 7. menses animi mœrore affecta est, quem supra dicta mala sunt secuta, præterea imprimis circa regionem lumborum summum sentit ardorem. Malum hoc ad affectionem hypochondriacam refertur.

Tumor ventris à flatibus; tremor autem à pituitâ acidâ, uterque igitur humor hic corrigi debet.

11. Maji. Maximè conqueritur de difficultate & dolore in urinâ reddendâ; urinam omnem non potest commodè excernere; arenulæ in fundo urinalis observantur, itaque de sequ. Mixturâ Cochleatim subinde assumat.

R. *Aq. Petrofel. ʒij.*  
*Fenic. ʒj.*  
*Spir. Vin. Rectif. ʒx.*  
*Salis Rectif. Gut. xii.*  
*Laud. Opiat. Gr. iij.*  
*Syr. quinq. Rad. ʒj.*  
*Misc.*

25. Maji. Alvus segnior, nec à pilul. foetid. No. 5. deiecit; venter magis intumescit, & per 6. menses menstrua non habuit; facies valde formosa, & faciei alicujus ægrotæ minimè similis; quia autem cautè cum iis procedendum, in quibus menses subsistunt, sapius enim fucus latet, cum virgines de subsistentiâ mensium conqueruntur, de sequ. decoct. bis terve in die haustum assumat, donec sequatur dejectio.

R. *Rad. Apii. ʒj.*  
*Levisic. ʒß.*  
*Fol. Majoran. M. j.*  
*Pulv. Rad. Jalap. ʒib.*  
*Tart. Crud. ʒij.*  
*Coqu. ex aqu. pur. in col. ʒxx. dissolv.*  
*Syrup. de Rhubarb. simplic.*  
*Helleb. Nigr. ana. ʒib.*

12. Junii. A decocto venter, qui aliàs adstrictus, jam satis respondet, & menses, qui per 25. septimanas non fluxerunt, heri fluere cœperunt.

14. Junii. De pedum tumore conquesta est, bis deiecit.

R. *Rad. Angelic. ʒß.*  
*Fol. Sabin.*  
*Matricar.*  
*Puleg.*  
*Aribemif. Rubr.*  
*Majoran.*  
*Flor. Chamomill. Rom.*  
*Sambuc. ana. M. j.*  
*Sem. Cumin.*  
*Dauci.*  
*Urtic. Rom. ana. ʒß.*  
*Baccar. Laur. ʒj.*  
*Concis. & contus. grossi. mod. dentur ad chart.*  
*pro fotu pedum, coqu. ex aqu. pur. aut*  
*cerevis. tenui.*

## CASUS CXXVI.

10. Maji. Mulier quædam per annum ferè se male habet, inprimis in sinistro hypochondrio, ubi dolores sensit, jam autem de eodem dolore eodem in loco perseverante conqueritur, & dolor vergit jam à sinistro hypochondrio ad lumborum regionem, & ita ad dextrum hypochondrium. Duabus aut tribus horis post assumptum cibum pejus se habet, & cardialgiam patitur, ubi cor angitur, sudor erumpit, & quando ita angitur, cogitur surgere & ambulare, aliàs pessime se habet, corpus interdum inflatur, appetitus satis bonus; sitis non multum illam infestat, menses non commodè fluent. Omnia hæc symptomata arguunt affectionem hypochondriacam; ut igitur humores temperentur, mixtura præscripta est, & decoct. incidens & attenuans pituitam viscidam, eamque evacuant.

12. Maji. Deiecit quidem, sed nullum levamen sensit, dolores intolerabiles illam urgent, qui tanti, ut difficulter contactum vestimentorum ferre possit, (quod nonnunquam & ut plurimum fit in Colicâ passione,) omnia enim contorqueri in ventre inprimis circa umbilicum ipsi videntur; flatus adsunt, qui tendunt sursum non deorsum, itaque necesse est, ut exhibeatur medicamentum quod dolores sedet, flatusque discutiat.

Flatus ipsam hæcenus valde urserant, unde venter sapius tumuit, sed per convenientia remedia est restituta ad pristinam valetudinem.

## CASUS CXXVII.

10. Maji. Mulier quædam conqueritur de continuo dolore in sinistro hypochondrio, & circa regionem ventriculi, & in regione lumbari; in dextro quoque hypochondrio tale malum sentit, ut & ardorem, dolores autem noctu sunt graviorés, unde non potest quiescere; nausea illam molestat; antehac vermes per superiora & inferiora se excrevisse retulit.

Hic peccat uterque humor, bilis scilicet & pituita, primariò tamen pituita, quæ viscidior est; necesse autem est, ut ad æstum bilis temperantia & incidentia humores viscidos accedamus, ut ad educationem possint deduci.

11. Maji. Valde nauseabunda est, & inclinata ad vomitum, non autem potest pervenire ad illum; igitur cras sequ. Vomitor. assumat.

Rx. *Oxymel. vomitiv.* ℥iij.  
*Aqu. Menth.* ℥ijss.  
 Misc.

12. Maji. Multa biliosa evomuit, dolorem sentit in dextro hypochondrio & lumbis, deinde quoque circa regionem ventriculi; cibum statim evomit, postquam illum assumpsit, potum autem non item; itaque necesse est, ut bilis temperetur, & ejus acrimonia emendetur. Post assumptum cinamomum non amplius vomuit, sed melius se habuit. Post assumptum sem. Zedoar. ℥iij. duos vermes excrevit.

19. Maji. Omnia quæ assumpsit, evomit iterum, & conqueritur de angustia circa præcordia; quæ evomuit, fuerant amara, & paululum viscida; per 12. septimanas non experta est menses, sentit nonnunquam quasi aliquid ad fauces assurgeret, illaque confringeret; hodiè cum tria tantum appeteret pruna Damascena, quæ ipsi suppeditata sunt, ipsique assumptis vomitus cessavit.

30. Maji. Febrem sensit, sed calor & frigus fuere satis levia.

## CASUS CXXVIII.

10. Maji. **V** Ir quidam per 4. septimanas male se habuit, & diarrhæam per illud tempus passus est, unde valdè debilitatus; affligitur quoque tussi, unde non potest noctu quiescere; appetitus est prostratus, quoties aliquid assumere conatur, nauseat; frigus passus est, in dextro crure, exinde pes affectus & demum os ischii. Materiam catarrhosam hic peccare certum est, qualis autem illa sit, ex sequentibus adhuc dicendis patet, interim quoad curationem commodissimum est adhibere medicamenta, quæ discutiant materiam peccantem, & impediunt largiorem alvi fluxum.

Rx. *Rad. Petasid.* ℥j.  
*Rafur. C. C.* ℥ij.  
*Baccar. Junip.* ℥ij.  
*Fol. Card. Bened.* M. j.  
*Coqu. in s. q. aqu. ad Colat.* ℥xxx. add.  
*Syrup. Card. Bened.* ℥ij.  
*Aqu. Theriacal. simpl.* ℥j.  
 Misc.

14. Maji. De immobilitate dextri cruris conquestus hodiè illud commodius movere potuit; tussit valdè, & post longam tussim materiam spumofam & viscidam excrevit, spumofa autem si-

unt partim ex conqassatione & nisu illo in tussi, partim ab aëre admixto sputis serosis, & quando materia valdè tenuis & acris, tunc in delicatioribus Sacch. Alth. & Pilul. de Cynoglossis ad incidendum autem materiam viscidam Troch. Béchic. Alb. si utrumque concurret, vel si adest materia viscida & tenuis, inspissantia & incidentia permisceantur. Obiit.

Annotata ex dissectione ipsius cadaveris.

Pinguedo in abdomine planè erat absunta; Omentum planè sursum erat tractum, & solummodò tegebat intestinum colon; intestina tenuia autem erant omento destituta. Parum aquæ ad 1℔ss. aut ℥iij. tamen in cavitate abdominis reperiebantur. Intestina flatibus erant distenta. Ventriculi orificium superius quasi excoriatum erat, & valdè rubebat. Liquor in ventriculo contineretur, cui aliquid ramentosi innatabat, uti in aphris observatur.

Hepar colore flavo externè penitus erat tinctum. Vesicula fellis admodum parva erat, & parum admodum bilis in eà cernebatur. In intestino tenui, ubi inseruntur ductus bilarii & pancreaticus levius excoriatio erat facta. Pancreas admodum flaccidum erat. In dextrâ pectoris cavitate multa aqua reperiebatur cruenta. Dexter pulmonis lobus pessimè se habebat, & longè durior erat sinistro; quatuor aut quinque foramina observabantur in dextro, ex quibus pus effluebat; in parte ejusdem lobi superiori apostemata deprehendebantur. Sinister pulmonis lobus parte superiori firmiter adhærebat pleuræ, & parte inferiore diaphragmati. In sinistro pectoris latere membrana pleura dicta etiam corrupta erat & excoriata. Lobus pulmonis dexter ubi attigerat diaphragma, eique adhæserat, illo in loco excoriatum erat. Cor firmissimè adhærebat pericardio, & opus habuit vi, quò à pericardio separaretur, eoque separato deprehendebatur plana ejus excoriatio (hoc contingit ab acrimoniâ humoris, qui excoriat partes, facitque eas cum aliis facilius coherere) Cor admodum parvum erat & flaccidum. Interna cordis substantia præter naturam pallesbat. Vasa cerebri posteriora sanguine admodum turgebant, anteriora etiam, sed nullus sanguis in illis erat. Cerebri substantia aliàs benè se habebat.

## CASUS CXXIX.

**V** Ir quidam tussi admodum angitur, & nihil potest tussiendo excernere, unde valdè difficulter respirat, assumpsit mixturam sed exinde nullum levamen sensit, quotidie febricitat; cum in-

vadit paroxysmus, frigus sentit, primò in pedibus, deinde in lumbis; post prandium statim ingruit paroxysmus, & cum per semihoram frigus duravit, incidit æger in somnum, & ex eo expergesfactus, summo sudore corpus ejus est diffusum; respiratio valdè difficilis est, pulsus frequens; sitis maxima eaque continua & summa linguæ ariditas.

16. & 17. Maji. Post assumtum lac dulcis dolorem lancinante & pungentem in sinistro hypochondrio sentit, & causa est lac, quod coagulatur & in status mutatur; quæ ejicit, acriora sunt & calida, à bile quæ deorsum vergit, quod bonum est signum. Melancholicis lac non conducit, quia in illis abit in coagulum.

17. Dolor per totum abdomen; lingua arida; dolor est instar cinguli corpus ambiens, dolor etiam assurgit versus dextram papillam; summa oris amaritudo; phlegmata tenacissima & viscidissima, tussis molesta est, quod fit ab hepate, quod in motu tussis attollitur, intestinaque premit; facillè in aptas incidere posset; quicquid viscidum est, à pituita habet ipsa bilis quando viscida est; dolor ille, qui cinguli instar corpus ambit, in intestinis est, dolor in papilla ab effervescentiâ, in quâ aliquid attollitur, & ad illas partes deferitur; vel quia illæ partes facillè refrigerantur, pejus se habent.

18. Dolor ventris cessat; jam à jugulo usque ad inguen sinistri lateris dolorem sentit; oris amaritudo adhuc perseverat; alvi fluxus durat & linguæ ficitas; ad alvi fluxum extinguitur ferum candens in cerevisiâ, quæ ipsi exhibetur.

19. Tussit adhuc, & dolor totius lateris notatu abiit, sed alius dolor subito accessit, circa insertionem ductus bilarii; lingua adhuc arida est.

22. & 23. Conquestus est de summâ linguæ ariditate, ut & de ingenti siti; os amaricat; nec calorem nec frigus notabile sentit; lingua quoque livido colore tincta est; ariditas autem linguæ dependet partim à biliosis halitibus; qui ad os deferuntur, quod patet ex oris amaritudine, bilis enim quoad sal lixiviosum quod in eâ est, vim siccandi habet; partim quoque à causâ externâ linguæ ficitas deduci potest, quia æger hic semper aperto ore, quamdiu ægrotavit, respirationem duxit; ratio autem est, quod ægri aliqui aperto ore respirent, quia aër per nares inspirationem non sufficit ad inspirationem, propterea aperto ore ducere quoque debent spiritum; hoc quoque locum habet in iis, quibus nares sunt obstructæ, à quacunque causâ etiam id proveniat. Lividitas linguæ etiam à bile est, nihil enim est in corpore nostro, quod magis tingat aliquid, quàm bilis. Ad ariditatem linguæ præstantissimum est Decoct. Fol. Semperviv. Maj. Solan. Sem. Aquileg. Semperviv. autem prævalet,

& sufficit vel succus expressus, vel Fol. semperviv. Maj. à quo suprema pellicula est abstracta, quod folium dehinc linguæ imponitur; præstantissimum quoque est sequ. medicamentum.

R. Succ. Semperviv. ℥iij.

Syr. Viol. simpl. ℥i.

M. f. linctus, de quo sapissimè lingat.

3. Junii. Hodie multa phlegmata purulenta partim tussiendo, partim vomendo excrevit, & si quis præcedentia Symptomata in hoc ægro probè observaverit, inflammationem in pulmonibus adfuisse probabiliter concludet; valdè debilis est, & difficulter admodum respirat; in natibus tumorem quasi in principio fientis gangrenæ observari solet, natesque sensim rubere incipiunt, cui tumori applicetur empl. diapsalm. præterea ad expectorationem materiæ purulentæ de sequ. Decoct. subinde assumat haustum.

R. Rad. Liquirit. Raf. ℥8.

Fol. Tussilag.

Rad. ana. M. j.

Heder. Terr. M. ij.

Papul. Maj. Mundat. ℥ij.

Cog. ex aqu. pur. ad Colatur. ℥xxx. add.

Syrup. Turubin. ℥i.

NB. Omnia antimonialia in phasis profunt; si modò ritè parentur, & paucâ quantitatè exhibeantur, inprimis si vires robustæ satis sunt; in hoc autem ægro talia adhibere inconveniens foret; ob summam ejus debilitatem.

4. Junii. Vomuit purulenta, & valdè debilis est.

5. Obijt.

Annotationes ex ejus Sessione.

Pinguedo in abdomine planè consumpta erat. Primo intuitu intestinorum detracto omento intestinum colon planè obliquò ductu ab ossè coxendicis versus ventriculū transferebatur. Omnia intestina flatibus erant distenta, inprimis autem ipsum intestinum Colon; intestina tenuia valdè rubebant, purpureumque colorem habebant; quem tam immensè rubrum in inflammatis intestinis nunquam observavit Cl. Sylvius, sed potius notavit colorem ex rubro nigrescentem. Intestina quæ in profundo hærebant, magis rubebant, quàm quæ in patulo sita erant, & ratio hæc est, quia hic mortuus, cum adhuc in vivis decumberet, multum potum assumpsit, inde per materiam potulentam id quod effervesfactum in intestino illo temperatum qui-



quidem est, sed ad alia intestina tenuia scil. propulsum ibique hærens & aliis humoribus corruptis occurrens majorem corrosionem & inflammationem instituit. Ventriculus valde ad latus dextrum inclinabat. Epar admodum flaccidum erat. Lien longè durioris substantiæ quàm epar.

Multum bilis in folliculo fellis continebatur, & quas attigerat partes folliculus fellis illa flavebant valde, quod fit à bilis acrimoniâ. Fibre in intestinis valde rigide erant, & beneficio illarum motum peristalticum fieri judicat Cl. Sylv. Mesenterium tantillum erat membranosum, & omni pinguedine destitutum intestinum tenue, quod sub mesenterio fertur, & in quod inferuntur duo illi ductus, pancreaticus nempe & biliaris internâ substantiâ suâ cruentum erat, & partes ejus abraas, inprimis illo in loco, ubi est egressus istorum ductuum; cruentum autem erat usque ad ventriculi orificium inferius. Ventriculi rugæ à materiâ foedâ & nigricante planè erant obliterate. Pancreas admodum laxum erat, & immisso tubulo in ductum pancreaticis totum pancreas cum omnibus vasis attollebatur, nec non vasa innumerabilia in ejus superficie. NB. Quinque vix digitos transversos distat insertio utrorumque ductuum, à ventriculi orificio inferiori in intestino. Pulmones in utroque latere adhærebant pleuræ, magis tamen in sinistro, ubi tanta erat adhæsiō, ut summa cum difficultate facta est separatio inprimis circa costam 6. & 7. legitimam, inter diaphragma, pulmonem & pleuram materia purulenta ac foeda hærebat, magnâ satis quantitate & ultra pintam j. exhauriebatur. Dexter pulmonis latus inferior planè à materiâ illâ purulenta consumptus erat, nec vestigia illius apparebant. Diaphragmatis substantiâ illâ in parte incipiebat corrumpi ab acrimoniâ puris. In sinistro pulmonis lobo apostema erat, & aliquid materiæ purulenti exhauriebatur, qualis hic mortuus in vitâ suâ & quidem paucos dies ante mortem magnâ satis quantitate tussiendo excrevit. Ubi erat apostema in lobo sinistro scil. inferiori, ibi etiam observabatur corruptio istius lobi. Ex cavitate thoracis sinistra parte exhauriebatur aqua cruenta, colorem vini rubelli referens, qualis aqua quoque bonâ quantitate continebatur in ipso pericardio. Cor admodum flaccidum erat, omnique sanguine vacuum, in reliquis quoque vasis nullus planè observabatur sanguis; pulmones admodum turgidi erant, & tamen nulla durities in illis observabatur. Diaphragma costis notis & extremis adhærebat; Dura mater firmissimè adhærebat cranio. Vasa cerebri sanguine admodum turgibant, aliàs nihil in cerebro notabile observabatur.

## CASUS CXXX.

10. Maji. **V**ir quidam febricitat, & quidem febre tertiana, quâ laboravit per totam hyemem; frigus per horam, calor per semihor. durat; frigus sentit in ventre: in frigore quoque magis sitit, quàm in calore, alvus est adstricta. Pituitam viscidam vergentem ad faldedinem peccare putat Cl. Sylv. itaque decoctum incidens præscripsit.

## CASUS CXXXI.

11. Maji. **M**ulier quædam per longum tempus scorbut oris laboravit, & manè materiam admodum viscidam ejecit summâ cum difficultate; siccitas gutturis adest. Oris collationem.

*R. Rad. Bistort. 3ij.*

*Fol. Salv.*

*Flor. Rosar. rubr. ana. M. j.*

*Sem. Levistic. 3j.*

*Alum. crud. 3ij.*

*Cog. f. a. ex. a. pur. in Collat. 3xvj.*

*distolv.*

*Mell. Rosat. 3i.*

*Acet. Vin. potens. 3ib.*

*Misc. f. Gargarismus.*

Ad phlegmata crassa & viscida commodius dissolvenda.

*R. Ag. Hyssop. 3ij.*

*Fenic. 3i.*

*Acet. dest. 3vj.*

*Spir. Vin. rectif. 3ij.*

*Ocul. Cancr. 3b.*

*Syr. quinq. Rad. 3j.*

*Misc.*

Assumat Cochleatim.

14. Maji. De summo æstu in faucibus conquiescit fuit; apertis quamplurimis obducta est lingua; de sequ. decocto subinde assumat haustum.

*R. Rad. Alib. 3ij.*

*Fol. Malv.*

*Semperviv. Maj. ana. M. j.*

13

Rasur.

Rasur. C.C. ni enit  
 Semen. Aquileg. anas. ʒij.  
 Coqu. ex aqua purgata Colat. ʒxxx. add.  
 Syrup. Viol. simpl. ʒij.  
 Misc.

## C A S U S CXXXII.

**V** Ir quidam sexagenarius hactenus de difficili respiratione conquestus nulla medicamenta in sui auxilium assumere voluit, cum autem jam debilem & mortem metuens sit, petit remedium quod est sequens.

R. Ag. Hyssop.  
 Fenic. ana. ʒj.  
 Acet. stillat. ʒvj.  
 Tinct. Cinamom. ʒijj,  
 Ocul. Cancr. ʒb.  
 Syr. quinq. Rad. ʒj.  
 Misc.

13. Maji. Postquam assumpsit medicamentum die in diem commodius respirat, noctu autem gravior est anhelatio; vespere venter tumet & distenditur; assumpto alimento per 3. horas pejus habet, unde cibum non assumit, quamvis fames urgeat ipsum; per biduum non deiecit.

19. Hac nocte bene habuit, sed hodie post meridiem anhelatio de novo illum infestavit ob defectum medicamenti; retulit enim si ad manus semper haberet medicamentum supra prescriptum melius se habere; appetitus est prostratus; appetit & quidem sæpe hoc vel illud edulii genus, sed quando ipsi offertur, ab illo abhorret. NB. Semel biduo tantum deiecit, & de pedum dolore conqueritur; non potest incedere, nisi ab alio ducatur.

28. Maji. Hac nocte pejus habuit; pulsus valde debilis est; phlegmata fecda & cruenta excremit.

4. Junii. Obiit.

Annotata ex Sectione Cadaveris ejus.

Diffectis abdominis muscularis humiditas in ipsis observabatur, in primis inter musculos & peritonæum. Pinguedo planè consumpta erat; nullum omentum, quod intestina tegeret; observabatur, sed omne sursum tractum erat ad ventriculum, eratque fecdi coloris; omenti pinguedo erat fusca. Aqua multa in abdomine continebatur colore flavo, sapore subamaro & paululum acido. Intestina tenuia flatibus admodum turgabant, in primis illud intestinum in quod inferantur ductus biliaris & pan-

creaticus. Inflato ductu pancreatico intumescabant penè omnia mesenteria vasa.

NB. Intestinum Colon mediantibus aliquot membranulis firmiter annexum erat vesiculæ biliaræ, an per illas membranulas aliquid bilis transfunderet ad intestinum colon, illudque ad deponenda excrementa irritet, non est negandum. Pancreas valde flaccidum erat; Ventrilus penitus occupabat latus sinistrum & in medio contortus erat, ita ut quasi duplex videretur, flatibusque erat distensus. Epar obscuriorem habebat colorem, quam debebat naturaliter, & planè situm erat in latere dextro, nec ullo modo uti naturaliter debet, inclinabat ad latus sinistrum.

Pulmonis dexter lobus ut & sinister erant obscurioris & subfusci coloris, qualis observari solet in suffocatis & strangulatis. Dissecto sinistro lobo multum effluebat sanguinis, & apparebant initia inflammationis, ex dextro lobo dissecto etiam aliquid sanguinis effluebat, sed non in tantâ quantitate. Cor valde inclinabat ad latus sinistrum, & valde magnum erat, quantum Cl. Sylvius non observavit, cum tamen 250. cadavera dissecuisset. Cordis ventriculi & auriculæ valde repletæ erant sanguine, hinc si tantâ copiam non potest propelli, pulsus debilis est, & vix sensibilis. Substantia cordis admodum flaccida erat, cum tamen debebat esse admodum dura, & sine ullo labore à vasis separabatur. Mediastinum cruentum erat coloris, quod naturaliter album referre debet. Propter temporis angustiam nihil amplius poterat examinari.

## C A S U S CXXXIV.

10. Maji. **V** Ir quidam sub hypochondrio sensit punctiones per tempus aliquod subinde remittentes, subinde iterum accedentes; non commode sternutat; per totam noctem sudat; Medicus judicavit esse pleuritidem, cum tamen neque tussit, neque alia pleuritidii convenientia symptomata sentiat; & ideo sanguinem per V. S. extrahi curavit, unde malum quidem quodammodo mitigatum. Malum autem magis sedem in ventre aut potius intestinis habet; murmura sentit; status peccant, ut & bilis & pituita; longè magis tamen pituita quam bilis, flatuum igitur generatio hic impediri debet, & status producti discutiri.

Medicamentum ergo conveniens pituitam viscidam incidens & leviter evacans prescriptum est. Febris ipsi supervenit, à qua curatus est.

## CASUS CXXXV.

**V**Ir quidam olim iſtero laboravit, & quidem per 3. ſeptimanas; appetitus eſt proſtratus, & in ore amaritudinem ſentit.

*R. Eleſt. hydragog. ʒb.  
 ē Succ. Roſar. ʒij.  
 Conſerv. Roſ. Pallid. ʒj.  
 Crem. Tartari ʒj.  
 M. ſ. Conditum.*

Sumat pro lubitu ad quantitat. nuc. moſchat. ut alvus laxior ſervetur.

## CASUS CXXXVI.

**V**Ir quidam cum valde incaluerit, frigori ſe expoſuit, unde in febrem quotidianam continuam incidit, quæ febris plane erraticâ facta eſt; mox enim tertio, mox quarto die invadit, in ipſa febre capitis dolor adest, & ſitis; nullum frigus ſentit, ſed tantum calorem. Præſcripta eſt mixtura.

18. Maji. Heri habuit febrem, calorque gravior fuit, duravit per totam noctem; dolor in ſiniſtro hypochondrio permanet, quando reſpirat profundius dolor augetur; abdomen tenſum eſt; ſenſit rugitus & flatus in ventre, quibus emiſſis melius habet; quando autem nullos emittit flatus, pejus habet, & reſpiratio difficilis eſt à majori efferveſcentiâ factâ. Dolor in inteſtino eſt, quia ibi nulla alia pars eſt, quæ ſedes ejus doloris eſſe poſſit; præterea tenſio iſtius loci idem confirmat. NB. Loco acet. ſtillat. ſpiritus nitrî ad flatus diſcutiendos admifceri poſſeſt.

25. Benè ſe habuit; niſi quòd de ſurditate & ſibilo aurium inprimis ſiniſtræ conqueſtus eſt, quæ ſubinde recurruſt; nihil autem præſtantius eſt, quàm ſi ſumatur panis albus adhuc calidus admodum, diſſectus in duas partes, Spir. Vin. maderactus & applicatus.

## CASUS CXXXVII.

14. Maji. **F**œmina quædam ex opere ſuo valde calefactâ aëri frigido ſe expoſuit & malè habere cœpit, unde purgatio menſtrua non tam commode proceſſit, uti debuifſet; ſenſit præterea internum calorem valde urentem,

externè autem nullus in partibus notatur, pulſus non aded frequens eſt; aſſumit quidem purgans; ſed irritò cum ſucceſſu.

## CASUS CXXXVIII.

6. Maji. **M**ulier quædam, quæ phlegmata ſpumoſa ac viſcida ejicit, ſeq. condit. aſſumere debet.

*R. Conſerv. Roſar. pallid. ʒj.  
 Eleſt. ē Succ. Roſar. ʒb.  
 Rad. Jalapp. ʒb.  
 Crem. Tartari ʒij.  
 M.*

Aſſumat ſubinde ad quantitat. nuc. moſchat.

## CASUS CXXXIX.

18. Maji. **M**ulier quædam conqueritur de dolore in ſiniſtro hypochondrio, ſub coſtis ſpuris; appetitus dejectus eſt; gravatur ab alimentis; naſeat & prona eſt ad vomitum; alvus adſtrictior eſt; biduo ac triduo ſemel deject; raucedo adest, vergit ſemper hæc agra ad triſtitiâ. Quoniam pituita in illâ peccat, ad incidendam & educendam eam.

*R. Maſſ. Pil. ſætid. Maj. ʒj.  
 Ol. deſt. carioph. Gutt. ij.  
 M. & ſ. pilul. No. xv.*

Aſſumat vèſperi, cum lectum pòtere velit, No. iij. ſi inde non deſicit, cras iterum iij.

## CASUS CXL.

14. Maji. **M**ulier quædam de tumore in pedibus, ſine dolore tamen, conqueritur; non habet motum in pedibus, ſunt enim debiles, ut vix ſuſtentare poſſint corpus, alvus eſt ſegniòr; tumor pedum ſi prematur digito, nulla manent veſtigia.

Quia hæc mulier agit annum 73. & humores ſeroli & pituitoſi in illâ abundant, & non negandum, aliquid ſtatuoſi intercurre, de decoct. incidente & evacuante pituitam ſubinde bonum haſtum aſſumat.

## CASUS CXLI.

**M**enses ancillæ euidam diutius suppressæ fuerunt; & inde levis fatuitas, ob vapores per sanguinis circulationem ad caput delatos.

R. *Aqu. puleg.* ℥iſs.

*Iberiacal. simpl.* ℥ſs.

*Laud. Opiat. gr. j.*

*Syrup. stachad.* ℥j.

*Misc.*

Bis terve in die haustulum assumat.

## CASUS CXLII.

**V**etula de dolore oculorum conqueſta eſt, itaque ſequenti collyrio ſæpius lavare debet oculos.

R. *Aqu. ſenic.*

*Rosar. ana* ℥j.

*Sief. alb.* ℥ſs.

*Vitrioli Alb. gr. ij.*

*Misc. exauſſimè.*

## CASUS CXLIII.

25. Maji. **I**nſans quinque annor. per 3. ſeptimanas febricitavit & quidem primò febre tertianâ intermittente, jam autem duplici tertianâ ſeu quotidiana; in ipſo paroxyſmo frigus per ſemihoram durat; calor autem ad 4. hor. extenditur, frigus primò in dorſo ſentit, quod dehinc per totum corpus diſpergitur; paroxyſmus ſemper duas poſtponit horas; tempore frigoris valde lit; in principio cum primis diebus febricitaret, ex ſternutatione incidit in narium hæmorrhagiam, à quo tempore grumofum ſanguinem ex faucibus excrevit, tamen nec tuſſiendo, nec ſcreando; ſtatim cum illâ ſanguinis excretionem apparuerunt maculæ purpureæ, quæ jam lividæ factæ ſunt & æquant piperis granum; facies tumida & quali leucophlegmatica; pedes veſperi tument; alvus laxa; præſcriptus eſt ab alio Medico hauſtus ſubinde aſſumendus, ille tamen nullo cum ſucceſſu adhibitus eſt. In malo hoc ſanguinis acrimonia peccat, quæ corrigenda eſt. De ſequ. mixturâ quater in die propinetur

infanti cochlæare j. & redeunte paroxyſmo cochlæaria iij.

R. *Aqu. plantag.* ℥ij.

*Iberiacal. simpl.* ℥ſs.

*Acet. ſillat.* ℥ij.

*Ocul. Cancr.* ℥j.

*Sang. dracon. gr. v.*

*Antimon. diaphor.* ℥ſs.

*Syr. Gard. Bened.* ℥j.

*Misc.*

## CASUS CXLIV.

**V**ir quidam ante veſperam per 9. dies malè habere cœpit, & tum caluit, & doluit circa hypochondria & præcordia, os amaricat, & omnia quæ aſſumit amarum ſaporem ſapiunt; dolor jam gravativus & diſtendens per totum corpus eſt diſperſus, à quo ipſum caput non eſt immune; tuſſit; tuſſiendo viſcida excernit, alvus medio modo ſe habet; non quieſcit; frigus nullum ſentit, ſed tamen calorem.

Bilis primariò hic peccat, quod facilè ſatis ſymptomata demonſtrant; pituitam quoque peccare patet ex materiæ viſcidæ excretionem, quæ tuſſiendo rejicitur, ut & dolor gravativus & diſtendens, & alvus ſerè adſtriſta, ad corrigendos itaque & præparandos humores peccantes præſcribatur mixtura conſueta. Quia alvus eſt ſegnior, præſcribatur hauſtus hydragogus.

4. Junii. A medicamento bis dejeçit; conquæſtus eſt de lincinationibus in lumbis cum dolore, ſed non tantæ fuere, uti prius; ſenſit murmura, interdiu paulò melius habet, quàm veſperi, & noctu lincinationes ipſi videntur ex lumbis ad thoracem aſſurgere, unde reſpiratio paulò difficilior & tuſſis excitatur; utrumque humorem pituitam putæ & bilem peccare ex præcedentibus ut & ex præſentibus ſymptomatibus patet; à pituitâ enim viſcida ſtatus, à bile autem ætus excitantur. Hactenus optimè habuit, hodiè die 27. Junii conquæſtus eſt de tuſſi, & de puncturâ in pectore, quando tuſſit venter tument, angiturque in ventre; quando inſpirat dolor in ſuperiore loco, quando exſpirat in inferiore pectoris parte ſentit. In inſpiratione dolet pectus, quia dum abdomen flatibus diſtensum eſt, majori vi diaphragma deprimitur, ut impedimenta illa removeat, inprimis in concuſſione illâ tuſſis; folliculus felliconcutitur, bilisque excernitur, quæ ſtatus generat, unde inprimis in eo loco hypochondrii dolor

lor sentitur. Os sternum non ita sequitur motum diaphragmatis, ut colicæ; unde illud magis afficitur, si motus fiat vehementior, & diffusio major. Uterque humor peccans corrigendus & evacuandus per conveniens decoct. phlegmagogum nempe.

R. Ung. Martiat.

Ol. d. absynth. ana ʒij.

M. inungat pectus, ubi dolet.

## CASUS CXLV.

**V**ir quidam ex itinere valde incalescens aëri frigido se exposuit, unde in dolorem totius corporis incidit; alvus satis respondet; febris adest continua.

A corpore calefacto magis moti ac soluti sunt humores in corpore, hinc & pituita magis soluta, & ad habitum corporis delata, à vento autem frigido corpus afficiens coagulata, & in partibus corporis subsistens dolorem totius corporis excitat.

Utatur consueta Cl. Sylv. mixturâ. In omnibus levamen habet; sudat nonnunquam, dum enim aded calet, & impeditur sudor, quando augeatur; hoc autem calor, quando novus accedit paroxysmus, tunc fit, quando augeatur, & impeditur sudor, etsi enim hic ager febre continuâ quoque laboraret, tamen continuâ febres suos quoque habent paroxysmos.

21. Deliravit.

25. Dolorem sentit in capite, quando tussit, (dolor fit in tussi, si aër exspiratus & propulsus in cerebrum; id afficit,) heri commodè deiecit, & optimè se habet. Tempore æstivo inprimis spir. volatil. & aqua pereunt, unde Sal lixiviosum & spiritus acidus acriora sunt in corpore. Fermentatio minor fit æstate; quia aqua deest in corpore; in aciculis Spadani est spiritus acidus temperatus à Spir. volatil.

5. Jun. Multum sanguinis è naribus excrevit, & valde debilis est.

6. Jun. Obiit.

## CASUS CXLVI.

21. Junii. **J**uvenis quidam 21. annos natus, ante 3. menses cum noctu sub tecto decubisset, circa collum sensit frigus cum dolore lancinante, ita ut ab eo tempore adhuc usque

torticollis factus sit; dolor ille scapulis communicatus est, & primò dextro quoque brachio, dehinc sinistro; ut & pedibus, cum summâ motus impotentia, ita ut nec incedere, nec stare posset; sed semper decumbere coactus fuerit, nihilque manibus apprehendere potuerit; motus quidem in manibus & pedibus adhuc aliquis est, sed exiguus, & magno labore artus moventur; sensus tamen est exquisitus; pedes nonnunquam sursum trahuntur, & tunc sentit dolorem in scapulis; motis manibus etiam dolorem in scapulis persentiscit; venter per 8. septimanas tumuit; flatusque multos emisit; pulsus frequens est; alternis diebus magis sitit; alvus satis respondet; appetitus viget; noctu cum somniat, perterretur, aliàs benè dormit. Quæritur, qualis sit affectus, & quæ curandi ratio? Distinguendi sunt affectus, qui in hoc ægro sunt; 1. considerandus ille qui observatur in motus difficultate; & alter; qui spectat febrem ventriculi tumorem. Ab externo frigore caput affectum est, ut & omnes humores in capite contenti. Collum quoque primariò affectum videtur, ex intorsione colli; in collo autem musculi primariò moventes collum, & nervi qui ex vertebis transeunt ad artus ab humore viscido ibi hærente nervosque premente, ne pateat liber aditus spirituum animalium ad artus. Scapulas quoque affectas esse patet, quando movet pedes aut brachium, tunc enim sentit dolorem in scapulis. Materia autem circa scapulas hærens habet aliquam in se acrimoniam, hoc patet ex convulsione; pedes enim nonnunquam sursum trahuntur, tuncque nullum dolorem nisi in scapulis sentit. Dehinc corpus abundare pituitâ, non tantum communis viscus ratio in hoc ægro suadet, sed & copiosi flatus illud indicant, quos emittit.

Totum sanguinem affectum judicat Cl. Sylv. & hunc ægrum labore insuper principio hydropis acicis, cui conjuncti sunt flatus; nec judicandum ascitem nullos flatus habere conjunctos, quod falsum, & contrarium sæpissimè observavit Dominicus Sylvius.

Flatus sunt à pituitâ viscidâ; obstructa sunt aliquot vasa lactea; unde rupto & effusio chyli in cavitatem abdominis, ut ita acicis; à pituitâ quoque febris excitari potest.

## CURATIO.

Blandis sudoriferis hic ager est curandus, ab acrioribus autem abstinendum, e. gr. ab usu lign. guajac. id enim ob acrimoniam hic non conducit, sed omnia quæ sale volatili non acriori ab-

undant, hic conveniunt, quæ ab Authoribus urinam movere dominatur.

De sequ. decoct. bis terve in die haustum assumat.

*Rad. Apii.*

*Fenic. ana ʒj.*

*Baccar. Junip. ʒij.*

*Sem. siler. montan.*

*Urtic. Rom.*

*Saxifrag. ana ʒij.*

*Coqu. ex aqu. pur. ad*

*Colat. ʒxxx.*

*add.*

*Syr. de quinque Rad. ʒijj.*

*Spir. Vin. redif. ʒij.*

*Misc.*

22. Manum dextram melius movere potuit, ut & collum, quam heri.

23. Pejus habet quam heri, caput non potest movere ullo modo; quin doleat maxime collum; febricitavit & deliravit; quod autem febris major quam heri & pridie fuerit, causa videtur esse, quia pituita acida à compedibus suis magis liberata, bilisque ei permixta majorem effervescentiam & ita majorem febrem excitavit. Spiritus enim acidus quo magis liber est, & à materia viscidâ pituitosâ, in quâ hæret, magis liberatus, calorem quoque producit; nam quod liberior est, eò majorem producit calorem; hoc observamus, si spiritus acidus exponatur aëri, partes aciores & calidiores avolant, & phlegma manet; quod si autem spiritus acidus pituita viscidâ adhuc est permixtus, frigus excitat. Afusus spiritus acidus limaturâ Martis majorem excitat effervescentiam, quam si affundatur Sali Tartari, & ratio hæc est, quia in Marte est aliquid olei. Succus pancreaticus si jungatur bili, & sit acidior ac fluidior, producit bilem aruginosam. Delirium à bile est, omnes enim affectus, in quibus observatur delirium, illi omnes à bile ortum ducunt, & delirium accidit à perturbato motu ipsorum spirituum animalium, ut & ejus impuritate; utile enim est aliquid volatile, quod facile jungitur spiritibus animalibus, qui etiam sunt volatiles. Diversa possunt ad caput assurgere, quæ faciunt inclinationem ad somnum; quædam etiam quæ lincinationem iterum excitant à somno. Ubi spiritus acidus peccat, ab acidis est abstinendum, & ad contemperandum æstum valde conducit phlegma Vitrioli & acet. sed non ad acidum superius est ascenden- dum; in phlegmate enim Vitrioli summa Leniendi vis, propter spiritus volatiles, & Sulphur vo-

latile; omne phlegma tam Vitrioli, quam acet. summam habet vim temperandi bilem, Nucha ægri inungatur sequ. linim.

*R. Ol. lumbic.*

*Vulpin. ana ʒj.*

*Castor. ʒj.*

*M.*

In affectis nervis hæc selecta sunt, valde enim leniunt Ol. lumbic. & vulpin. & Ol. Castor. ob salem volat. roborandi vim habet. Cum adhuc ipsi adessemus, pessimè se habuit, valdeque deliravit, videbaturque ipsi caput funicular pulv-nari alligatum esse; pulsus qui ante dimidiam hor. compressior fuit, cum in agone versaretur, valde frequens, liberior & robustior erat, & ita vitam cum morte commutavit.

*Annotata ex Sectione Cadaveris ejus.*

Abdomen valde turgebat, pressoque abdomine humor ex naribus effluebat.

Dissecto abdomine aqua spumosa ad aliquot cochlearia effluebat; intestina admodum turge- bant flatibus, ut vix sine læsione illorum potuerit aperiri abdomen. Intestina tenuia multa aqua erant repleta, flatibusque distenta. Intestinum colon, quod in sinistro latere fertur, & tunc constituit flexum Sigmoidem, mirè erat distortum, flatibus distentum, & in medio abdominis reliquis intestinis instar C inflexi e. gr. J Intestinum colon cum intestinis tenuibus præter naturam co- hærebat ventriculo. Liquori, qui in intestinis tenuibus hærebat, quasi ramenta ipsi permixta fuissent, videbatur, nullaque pituita, quæ alias observatur cum spumâ bullisque elevatis, ut solet in effervescentiâ fieri. Ventriculus admodum distentus erat flatibus, & liquoris aliquid in ipso reperiebatur. In mesenterio glandula admodum tumefacta duræque erant, quales in scrophulis solent observari, materiamque Medicis gypseam dictam in se continebant. Externe in collo nihil potuit observari læum. Vasa sanguinea admodum turgebant sanguine, caroque muscularia admodum flaccida erant. Cutis in collo minoribus glandulis erat infarcta. Indissolubiler fere dura meninx cranio adhærebat. Omnia vasa cerebri tam exteriora quam interiora sanguine admodum turgebat, piaque meninx quali leviter in- flammata videbatur. Substantia cerebri obscu- rior, sanguineque saturatior erat. Aqua satis copiosa in cerebri ventriculis saporis subsalsi & pa- rum acidi continebatur. Ductus inferior falcis

admodum magnus erat: quantus nunquam a Cl. Sylvio fuit observatus. Propè primum cerebri ventriculum anfractus & cavitas quasi observabatur, quales nunquam notavit Cl. Vir Domin. Sylvius. Circa sextum per nervorum multa hærebant aqua.

## CASUS CXLVII.

21. Junii. **M**ulier quædam per 14. menses valæterudinaria fuit; interim tamen uterum gestavit, & ante 4. menses peperit filium, ante 8. autem dies frigus sensu molestum, quod duravit per 14. hor. & calor per 2. tantum, qui mediocris; & hæc symptomata quotidie patitur; dehinc etiam dolor adest circa præcordia & sitis; assumto cibo valdè angitur; leniter sudat, sed fudor est frigidus; palpitationem in lumbis in parte magis anteriore sentit; noctu non potest quiescere; unde capitis dolor; alvus satis respondet.

Hic affectus potest dici affectio hypochondriaca, qui comitem habet febrem algidam; pituitam autem peccare pater ex frigore summo, quod dependet à pituita.

23. Hæc bene se habuit; per 7. hor. duravit frigus; angitur in regione lumbari & magis parte anteriore; per 5. dies non deiecit; hodie nihil medicamentorum assumpsit, unde paroxysmus hesternus fuit gravior, & commodus quidem esset purgatio, quia alvus segnior, sed quia nullum commodum datur purgandi tempus; ob febrem, videndum quomodo in crastinum diem se habeat; frustra enim adhibentur medicamenta, si in ipso paroxysmo febrili adhibeantur, nihil enim agunt, si aut in principio paroxysmi ante declinationem ejus exhibeantur; latius ergo esto, si nullum alias commodum datur purgandi tempus, ut illud observetur quando febris declinatio adest. Non amplius tantum frigus, sed horror adhuc adest; ab ineunte æstate tulssit, ab assumto autem hoc medicamento per octiduum non tantum tulssit.

26. Ab assumto hydragogo commodè deiecit; hodie manè bene se habuit, sed post meridiem iterum male; videtur ipsi cor innatare aqua ab halitibus & vaporibus ex effervescentia in intestino tenui facta affurgentibus, & à saliva magis soluta & deglutita.

## CASUS CXLVIII.

**M**ulier quædam de continuâ alvum deponendi necessitate conquesta est; quæ deiecit, sunt pituitosa & aliquo modo ejusita.

Tenelmo hæc mulier laborat, qui excitatus est à materia viscida acri adhærente intestino crasso; de sequentibus suppositoriis subinde unum immitat in anum.

R. Pulv. Rad. aristol. Rot.

Myrrh. Rubr.

Mastic.

Oliban.

Litharg. aur.

Lapid. calaminar. ana 3℔.

Thereb. coct. q. s.

M. f. s. a. Suppositoria ad longitud. articuli digitorum.

## CASUS CXLIX.

25. Junii. **M**ulier quædam conqueritur de dolore capitis & colli; qui per 6. septimanas duravit; non quievit per aliquot noctes ob dolorem dentium auriumque; Collum totum scrophulis tumidum & rigidum; menses ordinatè fluunt; cum febre & frigoris modo incidit in id malum; sæpe nudis pedibus incessit, ulsupavit externa, non interna. Potest dici affectus hic catarrhus, ut vulgò solet, dolor dentium & aurium subinde gravior, subinde levior; causa est humor pituitosus, quod probant scrophule; & serofus, quod dentium dolor auriumque subinde affligens affirmat.

R. Mass. Pil. Cochiar. 3j.

Resin. Jalapp. ʒi.

M. f. pilul. No. xxx.

Quotidie v. assumat.

## CASUS CL.

**J**uvenis per 3. septimanas inflammationem in pede habuit sinistro cum febre, ab illo tempore de angustia, ardore faucium, pectorisque dolore conquestus est; nullum saporem in cibis percipit; per 4. dies non deiecit. Præscriptus est

haustus hydragogus & mixtura consueta, quod in faucibus remittit, nec & sitis per cupineb. Hodie die in conquestus est de tussis, inprimis noctu urgente, dolorem sentit circa cartilaginem ensiformem, quando tussit, sicciora non potest deglutire, partim propter salivæ defectum, partim quia illa partes excoriata fuere, unde minus apta ad promovendam deglutionem; noctu ob tussim molestam non potest quiescere, ad leniendos igitur dolores acres, de sequi decoct. subinde haustam assumat.

R. Rad. alth. 3ij

Liquirit. Raf. 3℥

Fenic. 3j.

Fol. rufflag.

Hyssop. ana Mj.

Rafur. C. C. 3ij.

Coq. ex aqu. pur. in Colatur. 3xx.

Dissolv.

Syr. jujub. 3ij.

M.

### ICVASU S. CLII.

PUella quædam conqueritur per 3 septimanas se male habuisse, frigus in lumbis sensit, durasse ad hunc diem, ubi primo calorem percipit, dolorem capitis patitur, nec non quandoque insultus epilepticos; intra 3. septimanas semel deiecit; dolorem per totum corpus quoque sentit, ut vix tegumenta ferre possit.

A pituita acidâ primarium malum dependere putat Cl. Sylv. & vult adhiberi medicamenta sale volat. abundantia. Alvus per aliquot dies & septimanas fuit adstricta, quod deducit Domin. Sylv. a spir. acid. Adhibenda ergo quæ bilem augent, ut sunt Sal Tartari it. Oleum Tartari per deliqu. quod spir. acid. contemperat.

### CASUS CLII.

JUVenis quidam cum valde incallescere, ante ostiduum adivit mare, & se in colavit; post balneum iterum incallescens largiter frigidum assumpsit potum, a quo tempore incidit in febrem, uti mox incaluit, mox friguit, molestiam præterea in lumbis sensit, & adhuc sentit, præterea tussit & tussiendo cruenta excernit, dolorem per totum corpus sentit inprimis in pectoris latere dextro, eoque magis quando respirat & tussit;

difficilis adest respiratio; pulsus durus, celer & frequens, sitis intensa. Pleuritide hunc ægrum laborare manifestum est ex symptomatibus relatis, adest enim febris, dolor pectoris, difficilis respiratio, sitis & tussis. Omnes humores male affectos esse judicat Domin. Sylv. idque ab exteriori frigore, cum in balneum se recepisset, & ab interno frigore, dum potum frigidum copiose hauserit contractum. Et jam calor acris in illo ægro percipitur, tamen per calidam debet curari. Propinetur mixtura consueta.

14 Julii. Hodie majorem perturbationem in lumbis sensit, & calor acrior, omniaque symptomata graviora sunt quam heri, tussendo sputa cruenta excernit; alternis diebus pectus habet & hinc concludendum febrem tertianam continuam intercurrere, & ob novam exacerbationem febrilem symptomata graviora hodie acceruit, quam heri.

### CASUS CLIII.

ANcilla per 3 dies dolores per totum corpus inprimis in capite sensit, idque a frigore externo contraxit, per 4 dies non deiecit, dolores quoque circa præcordia habet, omnia potulenta, quæ assumpsit, iterum evomit, quæ denique capiunt laporem amarum, noctu non quiescit, pulsus præter naturam frequentior, menses alias bene se habent. Assumat mixtur. consueta.

### CASUS CLIV.

12 Julii. PUella quædam conqueritur de dolore circa præcordia, continuo vomitu, & faucium ardore, noctu non quiescit.

R. Diascord. Fracast. 3℥.

Syrup. myrtin. 3℥.

Laud. Opist. 3j.

Aqu. Chimon. 3℥.

Misc.

14 Julii. Dolorem sentit in urinae redditione; sedimentum urinae purulentum est, ab exulceratione colli vesicæ; ab assumtis cibis gravatur; omnia evomit, ut vix aliquid possit assumere. Obiit.





## C A S U S CLIX.

Juvenis quidam valde pituitosus de gravi auditu conquestus; præterea & de serolo tumore in inferioris maxillæ parte anteriore circa latus menti, cui sequentia sunt prescripta.

R. Mass. Pil. satid. Maj.

Cochiar. ana. 3℥.

Ol. cariohyll. Gutt. iij.

M. f. pilul. No. xxv.

Deaurentur. Dosis No. iij.

Ad gravem auditum.

R. Ol. castor. 3ij.

Succin. ʒj.

M.

Excipiatur Gutt. j. aut ij. gossypio, & in cavitate auris immittatur.

Ubi dolor ex distensione membranarum aut peritonæi a flatibus, tum olea conducunt, quæ partes illas reddunt magis explicabiles.

R. Ung. alb. simpl. an. ʒss.

Martiat. ana ʒij.

Ol. lilior. alb. ratione statum discutientium externè valdè conducit, cui si jungatur nardin. & chamæmel. magis penetrat, dilcutit solvit & temperat acrimoniam.

Annotata ex sessione pueri de summis & immensis abdominis doloribus dum adhuc in vivis esset, coquerentis.

Abdomen admodum turgebat, eoque dissecto aqua colore ex albo viridescente instar feri lactis effluebat. Omnis abdominis pinguedo consumta erat; Inter peritonæum & omentum satis magna quantitas materiæ lactæ coagulata, tam ratione coloris, quam consistentiæ non abssimilis continebatur ad ʒij. Membrana intestina tegens admodum crassa & quasi cornea facta erat, intestinisque firmiter adharebat. Peritonæi pars in superiore parte dextrâ tam dura erat, ut tangenti facillè (quoad consentitiam,) pro cartilagine haberi potuisset. Ex cavitate quam constituit omentum alligatum fundo ventriculi sinistræ lienis parti & intestino colo aqua flava ad aliquot cochlearia exhauriebatur. Intestina in se invicem coælitæ erant, & non nisi summâ cum difficultate separari poterant.

## C A S U S CLX.

Juvenis pannifex annorum circiter 30. ante 15. menses sensit circa sinistrum hypochondrium in concursu notharum costarum cum suis cartilaginibus, dolorem, qui angebatur, quotiescunque vel leviter tantum tussnet, nunc autem dolorem cum alvi segnitie per 6. circiter menses passus est; incidit postea in motus difficultatem in brachio dextro, & quidem circa humerum, adeo ut vix humerum movere posset; ubi motu continuato membrum magis incalcebat; motus liberior redditus est, interim ab opere desitens frigus molestum patiebatur, ab humero usque ad cubitum, quod frigus cessavit, postquam thoraci insuta est pellis ovina, idque malum continuavit circiter 2. menses, quo tempore tumore cedematoso & frons & faciei pars superior occupata est, & quidem tanto, ut foveam facillè admitteret, & ab imposito piteo notabile signum remaneret; post illud tempus totum brachium subito redditum est immobile, remanente motu solo in manu & cubito; potuit flectere brachium, sed non a corpore removere, nec id hoc tempore potest, & totum malum remanet in brachio & humero. Inter alia & quidem pauca remedia in sinistro brachio fonticulus excitatus est ante 3. menses circiter, qui per unum circiter mensem servatus est apertus; interim dolores habuit conjunctos graves, & tantos, ut coactus fuerit fonticulum claudere. Eodem tempore dolor, gravis excitatus est in sinistro humero, cum motus impotentia, quæ hætenus adhuc permanet, licet post curatum fonticulum sublati est dolor. Eodem tempore quo in sinistro brachio excitatum est malum præfatum, obortus est quoque tumor in sinistro genu, cum dolore non quidem gravi, sed motum impediēte, cum levi claudicatione, adeo ut vix per hor. quadrantem ambulare, nec nisi cum incommodo sedere queat; durante hoc, alvus fuit segnior, appetitus autem toto tempore integer, & potius auctus, quam diminutus; sitis nunquam urit, somnus fuit commodus; non potest cogitare ager, unde malum ipsi acciderit & ortum duxerit; vix hætenus aliquid tentatum est, per remedia, nisi quod in dextra pedis parte internâ applicatus fuerit fonticulus, à quo nullam habuit molestiam, semelque atque iterum purgantia ac sudorifera sine ullo tamen levamine sunt adhibita.

## EXPLICATIO.

Quo nomine hic affectus sit nominandus, difficile dictu est, nullum enim nomen, quod ei commodissime conveniat, vix excogitari potest, ad speciem paralyseos imperfectam quidem referri potest, quia in paralyti quacunque nullus notabilis observatur dolor, qui hic præstet est, merito autem ad motus impotentiam ad rigorem scilicet refertur, in frigore enim est rigiditas, quæ hic observatur, in paralyti autem partis laxitas, quæ hic abest.

2. Si in parte paralytica frigus agro molestum, illud tamen in paralyti molestum non est.

Ergo hic affectus ad paralytin non est referendus. NB. Nervi à pituita non possunt comprimi, nisi ea abeat in gypseam substantiam.

Pituitam, & in ea spiritum acid. in hoc agro peccare, manifestò ex eo patet, nempe quia fames est aucta, fames autem non augetur, nisi ab acidis.

3. Aliquid acre adest patet, ex humore, qui è fonticulo brachii sinistri effluxit, unde ager dolorem sentit; & hoc manifestum est argumentum, si humor ex parte effluit causans dolorem, acrimoniæ adest certissime, humoris autem acris ratione sit dilaceratio partium.

Pars affecta videntur musculi cum sui tendinibus, ad quos defluxit humor, non quidem quantitate, sed qualitate acrimoniæ scilicet peccans;

si enim quantitate peccasset humor, tumorem excitasset, quod non contigit, quia autem dolor adest, merito ab acrimoniâ illius humoris malum deducitur. Locus autem à quo humor ille ad humerum & brachium delatus sit, statuitur intestinum tenue, quod sub mesenterio defertur & ad latus sinistrum seu hypochondrium sinistrum tendit, in quo prava facta fuit effervescencia, malam autem esse effervescenciam partes ex dolore, quem sensit ager in hypochondrio sinistro, & ex adstrictiore alvo. Via autem ordinariæ statuuntur, per quas humor ille acris ad partes dictas humorum fluit. &c. affectus defertur, hoc patet ex humere ex fonticulo effluente. Cl. Sylvius putat fonticulum in parte nimis sensili locatum fuisse, unde dolor tantus exortus fuerit. Tumor qui notatur in facie, est ab humore viscido in partibus faciei mollioribus restagnante.

## CURATIO.

In his consistit ratio curandi, ut humor excitans dolorem corrigatur, & temperetur. 1. Ut humor correctus educatur, quod commodè præstari potest, si adhibeatur decoct. ex radicibus aperientibus ut apii, fœnic. levistici. lign. guajac. addit. bacc. junip. & omnibus aromaticis & feminibus quæ temperant humorem acrem, & simul educunt. NB. Satiùs est plantas adhibere ficas, quàm recentes, quia ex recentibus sal volat. non bene elici potest.



# R E M E D I A

## S Y L V I A N A.

### 1. Pulv. sternutatorius.

R. Rad. helleb. alb.  
Fol. Majoran.  
Flor. lilior. conv. ana ℥j.  
M. f. pulv.

### 2. Alius.

R. Fol. Nicotian. ℥j.  
Flor. carioth. ℥ss.  
Rad. liquirit. ℥j.  
M. f. pulv. tenuissimus.

### 3. Ad suffocationem uterinam.

R. Aqu. puleg. ℥ij.  
Cinamom.  
Hysteric. ana lbss.  
Syr. de fenic. ℥ss.  
M. Dos. subinde cochl. j.

### 4. Ad Clavos pedum.

Valet Cera viridis.

### 5. Ad Dysenteriam.

R. Laſſis. Vaccin. ℥j.  
Therob. Venet. in ovi vitell. dissolut. ℥ss.  
Mell. Rosar. ℥j.  
M.  
F. Enema.

Ubi malum ingravescit, iterandum est aliquoties.

### 6. Ad eandem.

R. Rhabarb. el. ℥j.  
Diascord. Fracasor. ℥ss.  
Aqu. Cinamom. ℥ij.  
Plantag. ℥ss.  
Conf. Alkerm. ℥ss.  
M. sumat æger subinde cochl. j.

### 7. Ad eandem.

R. Rhabarb. el. leviter tost. ℥j.  
Diascord. Fracasor. ℥j.  
Conf. Alkerm. ℥ss.  
Syr. Myrtin. ℥ss.  
Aqu. plantag. q. s. M.  
F. haust.

### 8. Scammonii præparatio, ut sine ullo incommodo usurpari possit.

R. Scammon. gr. xv.  
Terantur in mortar.  
Additis aqu. Cinamom. ℥ij.  
Et Aqu. Meliss. q. s.

Effund. sensim emulso lactea, remanente in fundo materiâ nigricante & piceâ; emulsioni lacteæ add. Juleb. rosac. ℥ij. & f. haustus.

NB. Sine ullis torminib. agit, quod debet.

### 9. Ad Variolarum eruptionem.

R. Aqu. petrosel.  
Fenic. ana ℥j.  
Acet. still. ℥ss.  
Ocul. Canc. ℥ss.  
Syr. quinque Rad. ℥j.  
M.  
Detur ægro subinde cochl. j. per tot. aggritudinis tempus.

Nota. Si gr. ij. aut iij. Ol. dest. anis. Rhabarb. jungantur, sapor ejus ingratus omnino non percipietur.

### 10. In delirio, ad somnum conciliandum.

R. Hord. mundat. ad crepatur. coct. ℥j.  
Sem. papav. alb. ℥ij.  
Cucumer. ℥ij.  
Cum decoct. hord. q. s. f.  
Emulso, cui add.  
Syr. diacod. ℥ss.  
Aqu. Rosar. ℥j.  
Cinamom. ℥ss.  
Misc.

11. Tinctura Cinamomi.

℞. Cinamom. pulv. q. placet.  
Spir. Vin. rectif. q. s.  
M. pon. in digest. & extrabe.  
Tinct.

12. Aqu. theriacal. simplex.

℞. Theriac. Andr. Vet. ℥j.  
Spir. Vin. rectific. ℥iij.  
Misc. pon. in digest. & extrab. Tinct.

13. Electuar. diaprunum, seu Cholagogum.

℞. Pulp. prunor. acido-dulc. ℥x.  
Cremor. Tartar.  
Scammon. opt. ana ℥ij.  
Rhabarb. el. ℥x.  
Cinamom. acut. ℥ij.  
Sacchar. clarific. ℥xvj.  
M. f. s. a. Electuar.  
Dosis à ℥iij. ad ℥℥.

14. Electuar. Hydragogum.

℞. Baccar. Junip. in aqu. font. vel pluv. coctar.  
expressar. & ad pulp. consistent. redactar.  
Pulp. Tamarindor. ana ℥iij.  
Rad. Falapp. ℥℥.  
Scammon. el. ℥j.  
Cinamom. acut.  
Sem. fœnic. dulc. ana ℥ij.  
Sacch. clarificat. ℥x.  
M. & f. Elect.  
Dosis à ℥iij. ad ℥℥.

15. Electuar. de Sennâ.

℞. Pulp. prunor. lb℥.  
Tamarind. ℥ij.  
Fol. senn. mundat. ℥iij.  
Scammon. elect. ℥℥.  
Sem. fœnic. dulc. ℥ij.  
Rad. acori. ℥j.  
Sacchar. clarificat. lbj.  
M. f. Electuar.  
Dosis à ℥vj. ad ℥j.

16. Electuar. Phlegmagogum.

℞. Uvar. passar. à nucl. mundatar. in aqu. co-  
ctar. expressar. & ad pulp. consistent. redac-  
tar. ℥viij.  
Mann. Calabrin. ℥ij.

Turbith Gummos.

Agaric. leviss. ana ℥j.  
Trochisc. albandal. ℥ij.  
Sem. Anis. ℥iij.  
Cinamom. ocul. ℥ij.  
Macis. ℥j.  
Sacch. clarificat. lbj.  
M. f. Electuar. Dosis à ℥vj. ad ℥j.

17. Syrupus de Sennâ.

℞. Fol. senn. mandat. ℥ij.  
Sem. fœnic. dulc. ℥ij.  
Infund. in cucurb. vitr. alemb. cæco testâ per  
24. hor. in Aqu. Tartarifat. q. s.  
Colatur. add.  
Sacch. clarificat. ℥xvj.  
Coqu. igne lent. ad consist.  
Syrup. Dosis ab ℥ij. ad ℥iij.

Aqua Tartarifatâ fit, quando in aqua commu-  
ni soluta est Tar. alb. quantitas ad mediocrem  
aciditatem.

18. Syrupus de Rhabarb. simpl.

℞. Rhabarb. el. ras. & incis. ℥ij.  
Cinamomi acut. ℥ij.  
Infund. p. 24. hor. in aqu. Tartarifat. q. s.  
Colatur. q. s. add.  
Sacch. clarificat. ℥xvj.  
M. f. Syrup.  
Dosis ab ℥℥. ad ℥iij. vel ℥iij.

19. Syrup. de Helleb. nigro.

℞. Rad. hellebor. nigr. crasse pulverisat. ℥ij.  
Sem. anis. ℥ij.  
Infund. in aqu. Tartarifat. q. s.  
Colatur. q. s. add.  
Sacch. clarificat. ℥xvj.  
M. f. Syrup.  
Dosis ab ℥j. ad ℥ij. si solus usurpatur.

20. Syrupus de Colocynthide.

℞. Pulp. colocynthid. à sem. mundat. ℥j.  
Infund. in aqu. Tartarifat. q. s.  
Colatur. add.  
Succ. liquirit. inspissat. ℥℥.  
Sacch. clarific. ℥xvj.  
& sub coctionis finem add.  
Tinct. Cinamom. ℥j.  
M. f. Syrup. Dosis ab ℥℥. ad ℥vj.

## 21. Elixir proprietatis.

℞. Aloës opt.

Croc. Britannic. ana ʒi.

Extrab. c. Spir. Vin. redif. q. s. Tinct.

Interim. Myrrh. rubr. ʒi.

Assund. Spir. Vin. redif. &amp; Vitrioli q. s. ut

Eliciatur Tinctura.

Bina Tinctura confund. & per ʒ. 8. aut 10.  
in Mar. Balneo digerantur.

## 22. Balsamus Sulphuris.

℞. Flor. Sulphur. ʒij.

Assund. Spir. Terebinth. Venet. ʒiiij. Diger.  
in cinerib vel aren. Baln. igne lento, & coqu.  
ad flor. totalem dissolutionem in balsam. rubicun-  
dum.

## 23. Decoctum Vulnerarium.

℞. Rad. aristol. rot. ʒij.

Fol. sanicul. mar.

Alchymill.

Pyrola.

Consolid. Saracen.

Veronic. ana Mj.

Coqu. ex aqu. pur. ad Colar. ʒxx.

add.

Oxymel. simpl.

Syr. de Sympht. Fernel. ana ʒij.

Mundificat, attenuat &amp; restitit putredini.

## 24. Conveniens remedi. in omni hæmorrhagiâ.

℞. Aqu. plantag. ʒij.

Cinamom.

Acet. stillat. ana ʒß.

Sang. dracon. ʒß.

Lapid. hæmatid. gr. vij.

Syrup. myrtin. ʒj.

Assumat æger cochlearum, tollit enim omnem  
sanguinis fluxum.

## 25. Ung. ad Scabien.

℞. Salpetr.

Alum. crud.

Sulph. viv.

Zingib. alb. ana ʒß.

Olei Rosac. q. s.

M. f. ung.

## R E M E D I A

## EXTRAORDINARIA

à Cl. D. Sylv. in Colleg. ætivo privatim habito communicata.

2. Ung. Nicotianæ ad ulcera deplorata præ-  
stantissimum.

℞. Resin. ʒviij.

Thereb. Cypr. ʒiij.

Ol. Nicotian.

Ol. hyperic. ana ʒij.

Solvatur primò cera in oleis, post resinam ad-  
de tandem thereb. spatulâ continuò agitando,  
soluta ferv. usui.

Oleum nicotian. paratur ex succ. nicotian. de-  
purato, cum infusione flor. hypic. & pomor.  
momord.

## 2. Potio ad accelerand. part. probatissima.

℞. Aqu. lilior. alb.

Puleg.

Chamad. ana ʒi.

Cinamom. ʒß.

Borrac. Venet.

Succin. prepar. ana ʒij.

Croc. orient. ʒß.

Ol. dest. cinam. Gutt. iij.

M. pro 2. dosibus.

## 3. Clyster egregius in Epilepsiâ.

℞. Rad. Angelic. ʒij.

Fol. Majoran.  
Eulog. ana. Mj.  
Baccar. laur. Zij.  
Coqu. in f. q. aqu. contr.  
In Colatur. Zij.  
Dissolv.

Bened. laxat. Zij.  
Ol. nardin. 3ß.  
M. & f. Clyster.

4. Ad Clavos pedum.

R. Gum. Galban. in acct. solut. 3j.  
Pic. naval. 3ß.  
Empl. diach. simpl. 3j.  
Salis armoniac. 3j.  
M. f. empl. quod ponatur cum pann. tertio  
aut quarto die semper mutando super ver-  
ruc. & clavos pedum.

5. Contrà Lumbricos.

R. Sem. Zedoär. 3ij.  
Pulv. Rad. Jalapp. 3j.  
Croc. orient. 3j.  
M. & f. pulv.  
Senior capiat bis terve 3j.  
Infans & paulò adultior à 3ß. ad 3j. & ij.

6. Ad dolorem sedandum hæmorrhoidum cæcar.

R. Farin. bord.  
Sem. lin. ana 3j.  
Flor. Sambuc.  
Verbasc. ana. Mj.  
Fol. Malv. Mij.  
Coqu. in lact. ebulyrat. ad consist. cataplasin.

7. Ad Epiphoram.

R. Ung. Rosæ. 3ij.  
Lap. calaminar. pp. ana 3ß.  
Camph. gr. V. M. f. Ung.

8. Ad ardorem in guttute.

R. Rad. alth. 3ij.  
Fol. Malv. Mij.  
Casur. CC.  
Sem. aquileg. ana 3ij.  
Coqu. in q. f. aqu. bord.  
In Colat. 3xv.  
Dissolv.  
Syr. Fajub. 3iß.

Lap. prunell. 3ij.  
M. f. gargarisimus.

NB. Si fortè quid de eo deglutiat, nihil pe-  
riculi inde metuendum.

8. Ad dolorem in auribus.

R. Ol. Succin. 3j.  
Castor. 3j.  
M. insillet azer. Gutt. 1j. gossypio, idque im-  
pone in aur.

10. Decoct. ad lochia perseverantia ex frusto pla-  
centæ in utero hærentis.

R. Rad. Bistort. 3ij.  
Spic. Indic.  
Schananth. ana 3ß.  
Fol. Majoran. Mj.  
F. decoct. ex Vin. alb. & aqu. pur. ana p.  
Agu. in Colat. 3xv.  
Dissolv.  
Syrup. de arthemis. 3ij.  
M. summat bis terve in die ad 3ij. aut iij.

11. Decoctum egregium ad obstructions men-  
sium.

R. Nard. Indic.  
Schananth. ana 3ß.  
Fol. arthemis.  
Sabin.

Majoran. ana Mj.  
Coqu. ex aqu. & Vin. ana q. f.  
Ad Colat. 3xxv.  
add.

Syr. de arthemis. 3ij.  
Agu. Theriacal. simpl. 3j.  
M.

Sumat bis terve in die, donec prodeant men-  
ses.

12. Contrà Vermes.

R. Corn. Cerv. pp. 3iß.  
vel.  
Corallin. 3iß.  
Mercur. dulc. 3j.  
Scammon. 3ij.  
Sacchar. albiss. in aqu. absynth. dissolut. 3ij.  
Misc. & f. s. a. tabellæ.

## 13. Vinum Hippocraticum.

R. Sacch. albiss. lbxvj.

Cinamom. Acut. lbj.

Zingib. 3ß.

Cariophyll.

Nuc. moschat.

Mac. ac. s. lobol. sigis. ni smethyris.

Galang.

Granor. Paradys. ana 3iß.

Vin. Generos. Mens. ix.

Laß. vaccin. dulc. Mens. ix.

M.

## 14. Extractum ad faciendum Vin. Hippocratic.

R. Cinamom. acut. elect. 3iij.

Zingib. 3ß.

Macis.

Nuc. moschat.

Cariophyll. ana 3j.

Granor. Paradis. 3iijß.

Piper. gr. iijj.

Contus. gross. mod. affund.

Spir. Vin. 3xv.

Stent in loco tepid. vitro bene clauso, ut Tinctura eliciatur.

## 15. Aqua perfumata.

R. Benzoin. 3ij.

Styrac. 3j. Ladan. opt.

Ireos flor. ana 3ß.

Balsam. Peruv. Gutt. viij.

Agu. Rosar. fragr. lbj.

Diger. in Maris Balneo add.

Zibeth. gr. j. aut ij.

Mosch. &amp; Ambr. pro lubitu.

## 16. Ad erosionem faucium à bile.

R. Herb. heder. terr.

Violar. ana Mj.

Hord. mundat. 3iß.

Coqu. in s. q. aqu. in.

Calat. lbj. dissolv.

Mell. Rosar. 3iß.

Spir. Vitrioli Gutt. viij.

M. f. Gargarismus.

## 17. Pulsus fragrantissimus vestibus aspergendus.

R. Rad. Ireos flor. 3iijj.

NB. Ex hac vermiculi generantur.

Rad. cyperi rotund. 3ij.

Flor. Rosar. rubr. Mj.

Lavendul. Mij.

Stæchad. Arab.

Gumm. Benz. ana 3iß.

Styrac. calam. 3j.

Rorismar. Mij.

Mosch. 3j.

Zibeth. gr. xv.

M. f. pulv. grossus.

## 18. Pilulæ ad ciendos menses.

R. Gumm. galban. c. acer. pp. 3j.

Chalyb. pp.

Castor. opt.

Myrrh. rubr.

Mastich. el. ana 3ß.

Aloës Rosar. 3j.

Resin. Jalapp.

Trochiss. de Myrrh.

Alhandel.

Diagrid. ana gr. xv.

Ol. carioph.

Mac. ana Gutt. iij.

M. f. pilul. No. lxxx. Dosis No. iijj. ad

v. vel 3ß. vesperi.

## 19. Potio antiscorbutica.

R. Raphan. rustican.

Tamarind.

Rad. cichor. ana 3ij.

Rhabarb. el. 3ß.

Fol. brassic. rubr.

Nasturt. aquat.

Cochlear. ana Mijß.

Rad. Bistort.

Sem. Anis.

Fenic. ana 3ß.

Heder. terr.

Fumar.

Beccabung. ana Mß.

Pom. citr. No. j.

Concis. affund. Vin.

Alb. Mens. iß.

Bibat æger singulo mane haust. &amp; tantum vini semper rursus affundatur, quantum absumtum fuit. NB. Omnes species recentes esse debent, exceptis seminibus.



20. Contra tussim.

R. Rad. loquirir. R. Rad. diiij.  
Spec. diareos. R. Rad. diiij.  
Diarragac. frig. R. Rad. diiij.  
Croc. gr. vj.  
Sacch. cand. alb. ad pond. omnium.  
M. f. pulv. subtilissimus. Sumat quantum  
cuspidi cultri comprehendere potest, pro una  
vice.

21. Pulv. sternutatorius.

R. Flor. lil. convall.  
Lavend.  
Anthos. ana R.  
Fol. bethon.  
Violar.  
Sal. ana gr. viij.

Sem. nigell. R.  
M. f. pulv. subtilissimus.  
Add.  
Spec. diamech. dulc. gr. v.  
Ol. lign. rhod. Gutt. ij.  
Misc.

22. Epithema in capitis dolore ab ardore febrili.

R. Aqu. Rosar. ana R.  
Card. Bened. ana R.  
Acet. Lavend. 3vj.  
Opil thebaic. gr. vj.  
M. f. Epithema.

Ejus pars calefacta linteo, fronti & capiti apponatur, & si linteum exsiccatum fuerit, iterum madefiat; in delicatioribus aqua cinnamom. addi potest.



Exhibe eger in cubili mane parat & tunc vi  
in semper tunc affundat, quantum splumina  
tunt. NB. Omnes ictus recentes esse debent  
exhibe feminibus.

IN-  
Says Liviana

# I N D E X

## CASUM & MEDICAMENTORUM.

**Casus I.** De Viro ventris torminib. & febre quart. affecto. Pag. 5.

II. De Puella Hysterica. *ibid.*

III. De Puella febre tertiana laborante. *ibid.*

IV. De Vetula Ophthalmica. *ibid.*

V. De Viro febre intermittente laborante. *ibid.*

VI. De Foemina angustis circa praeordia vexata. *ibid.*

VII. De Puella scrophul. affecta. *ibid.*

VIII. De Viro summo aestu afflicto. *ibid.*

IX. De Viro multis humoribus pituitosis scatente. *ibid.*

X. De Viro à flatibus vexato. *ibid.*

XI. De Viro, qui ab acrib. humoribus vexabatur. *ibid.*

XII. De Viro, de ventriculi debilitate conquirente. *ibid.*

XIII. De Vetula, de angust. circa praeord. & tussi conquirente. *ibid.*

XIV. De Puella Melancholia hypochondriacā laborante. *ibid.*

XV. De Muliere febre tert. laborante. *ibid.*

XVI. De Viro pituitosis humor. scatente. *ibid.*

XVII. De Viro Afcite & febre erat. continuā laborante. *ibid.*

XVIII. De Foeminā passione hysterica laborante. *ibid.*

XIX. De Viro à flatibus vexato. *ibid.*

XX. De Viro acidis humoribus scatente. *ibid.*

XXI. De Viro tussi laborante. *ibid.*

XXII. De Foemi. angustis praeord. labor. *ibid.*

XXIII. De Foeminā febre intermittente affecta. *ibid.*

XXIV. De Muliere de flatibus in lumb. conquirente. *ibid.*

XXV. De Puellā à vaporib. biliof. in lumb. vexata. *ibid.*

XXVI. De Virg. hytter. passione affecta. *ibid.*

XXVII. De Virg. quae ex flatulentia & febre decumbit. *ibid.*

XXVIII. De Viro tussi laboranti. *ibid.*

XXIX. De Muliere, quae ardore faucium cum febre contin. laborat. *ibid.*

XXX. De Viro à flatulentia vexato. *ibid.*

XXXI. De Viro tussi laborante. *ibid.*

XXXII. De Viro febre imminuta laborante. *ibid.*

XXXIII. De Virg. Sanguinolentia gingivar. affecta. *ibid.*

XXXIV. De Virg. scrophul. laborante. *ibid.*

XXXV. De Viro febre quotid. contin. laborante. *ibid.*

XXXVI. De Viro à ructib. acti. vexato, cum corporis debilitate & pedum tumor. *ibid.*

XXXVII. De Viro alvo adstricta laborante. *ibid.*

XXXVIII. De Viro flatulentia, febre quotidiana cum capitis dolore & pedum tumore laborante. *ibid.*

XXXIX. De Viro tulli & adstricta alvo laborante. *ibid.*

XL. De puero delirio affecto. *ibid.*

XLI. De Puellā febre quotidiana laborante. *ibid.*

XLII. De Viro in quo bilis abundabat. *ibid.*

XLIII. De Viro febre cum summis pedum doloribus laborante. *ibid.*

XLIV. De Puellā febre intermittente laborante. *ibid.*

XLV. De Viro febre cum pectoris dolore laborante. *ibid.*

XLVI. De Viro de haemorrhoidibus in ano tumefactis conquirente. *ibid.*

XLVII. De Viro epileptico. *ibid.*

XLVIII. De Viro de pruritu in toto corpore conquirente. *ibid.*

XLIX. De Viro alvo adstricta laborante. *ibid.*

L. De Viro, qui de Urina ardore & dolore in pene conquerebatur. *ibid.*

LI. De Viro qui de artuum & aliis symptomatibus conquerebatur. *ibid.*

LII. De Viro epileptico & hydropico. *ibid.*

LIII. De Viro febre laborante. *ibid.*

LIV. De Alio Viro febre laborante. *ibid.*

LV. De Alio febre laborante. *ibid.*

LVI. De Viro delirio affecto. *ibid.*

LVII. De Viro tulli & angust. circa praeordia laborante. *ibid.*

LVIII. De Viro, qui de alvo adstricta, tussi, erisipelate, & febre conquestus est. *ibid.*

LIX. De Viro Afcite laborante. *ibid.*

LX. De Viro variis symptomatibus affecto. *ibid.*

LXI. *ibid.*

# INDEX CASUUM

CASUS. LXI. De Viro quodam febre laborante.

CASUS.

XCVIII. De Viro quodam febre quotidianâ affecto. *ibid.*

XCIX. De foemina quodam febre quartanâ laborante. *ibid.*

C. De Muliere febre quotidianâ laborante. 58.

CI. De Viro quodam febre quartanâ laborante. 59.

CII. De Ancillâ quâdam Coryza laborante. *ibid.*

CIII. De Viro quodam febre quartanâ laborante. *ibid.*

CIV. De foemina quâdam dentium dolore vexatâ. *ibid.*

CV. De Viro phryifico. *ibid.*

CVI. De Viro quodam febre laborante. 60.

CVII. De alio, qui febre laborat. *ibid.*

CVIII. De Juvene febre tertianâ labor. *ib.*

CIX. De Juvene hypochondriaco. 61.

CX. De Viro febre laborante. *ibid.*

CXI. De Viro febre tertianâ labor. 62.

CXII. De Viro de totius corporis gravitate alvique adstrictione con-

querente. 63.

CXIII. De foemina affectione hypochond. laborante. *ibid.*

CXIV. De foem. scrophulis affectâ. *ibid.*

CXV. De foem. quartanaria. *ibid.*

CXVI. De foemina phryifica. 64.

CXVII. De Muliere ulcere vesicae affect. *ibid.*

CXVIII. De Muliere de summis in hypochondr. dextris doloribus con-

querente. *ibid.*

CXIX. De Ancilla febre quartanâ & erraticâ laborante. *ibid.*

CXX. De Muliere febre laborante. *ibid.*

CXXI. De Muliere febre ardente laboran-

te. 65.

CXXII. De Muliere febricitante. *ibid.*

CXXIII. De Alia muliere febricitante. *ibid.*

CXXIV. De Alia febricitante. *ibid.*

CXXV. De Muliere mensium obstructione laborante. *ibid.*

CXXVI. De Muliere hypochondriacâ. 66.

CXXVII. De Alia Mul. hypochondr. *ibid.*

CXXVIII. De Viro tussi & diarrhæa affecto. 67.

CXXIX. De Alio Viro, tussi labor. *ibid.*

CXXX. De Viro febre tertianâ labor. 69.

CXXXI. De Muliere oris scorbuto labor. *ibid.*

CXXXII. De Viro sexagena. difficili respir.

labor. 70.

CXXXIII.

CXXXIII.

LXII. De Viro paralyfi laborante. 31.

LXIII. De Viro febre continuâ laborante. 32.

LXIV. De Viro febre errat. laborante. 33.

LXV. De Puellâ Variol. laborante. *ibid.*

LXVI. De Muliere de oculorum dolore conquerente. 34.

LXVII. Annotata in sectione mulieris cussidam extinctâ continet. *ibid.*

LXVIII. De Ancilla suffocatione matricis laborante. 35.

LXIX. De Muliere quâdam febricitante. 36.

LXX. De Viro febre tert. contin. laborante. *ibid.*

LXXI. De Vetal. de dolore in mictione & alius symptom. conquerente. 37.

LXXII. De Viro febre errat. labor. *ibid.*

LXXIII. De Viro febre tert. labor. 38.

LXXIV. De Muliere quâdam febre affectâ. *ibid.*

LXXV. De Ancilla scrophul. laborante. 39.

LXXVI. De foemina Anginâ laborante. *ibid.*

LXXVII. De Viro febre quart. labor. 40.

LXXVIII. De Ancillâ febre labor. 42.

LXXIX. De Viro hæmorrhagiâ narium affecto. 43.

LXXX. De foemina angust. circa præcord. &c labor. 45.

LXXXI. De Ancillâ febre quotid. contin. labor. *ibid.*

LXXXII. De Viro erysipelate labor. *ibid.*

LXXXIII. De Ancillâ febr. quotid. labor. *ib.*

LXXXIV. De Juvene febre contin. labor. 46.

LXXXV. De Juvene pleuritid. labor. 48.

LXXXVI. De Viro asthma & dyspnœa laborante. 49.

LXXXVII. De Muliere Vomit. cruento &c. labor. 50.

LXXXVIII. De Puellâ febr. quotid. labor. 52.

LXXXIX. De Viro febre continuâ labor. *ib.*

XC. De Ancillâ febre quotid. labor. 53.

XCI. De Viro febre tert. intermittent. labor. *ibid.*

XCII. De Viro lab. febr. quart. 54.

XCIII. De Viro febre quotid. continua laborante. *ibid.*

XCIV. De Vir. febre contin. lab. 55.

XCV. De Viro Epilept. *ibid.*

XCVI. De Ancillâ hysterica passione affectâ. 56.

XCVII. De Ancillâ febre quartanâ & principio hydropis laborante. 57.

# INDEX CASUUM.

CASUS.

- CXXXIV. De Viro hypochondriaco. *ibid.*  
 CXXXV. De Viro Icteric. 71.  
 CXXXVI. De Viro febre quotidianâ labor. *ibid.*  
 CXXXVII. De Fœminâ mensium obstructio-  
 ne labor. *ibid.*  
 CXXXVIII. De Fœminâ phlegmatibus viscid.  
 scatente. *ibid.*  
 CXXXIX. De Muliere hypochondriacâ. *ibid.*  
 CXL. De Muliere de tumore in pedi-  
 bus conquerente. *ibid.*  
 CXLI. De Ancillâ quâdam de mensium  
 suppressione conquerente. 72.  
 CXLII. De Vetula de oculorum dolore  
 conquestâ. *ibid.*  
 CXLIII. De Infante febricitante. *ibid.*  
 CXLIV. De Viro hypochondriaco. *ibid.*  
 CXLV. De Viro de doloribus totius cor-  
 poris conquerente. 73.  
 CXLVI. De Juvene torticollo. *ibid.*  
 CXLVII. De Fœminâ hypochondriacâ. 75.  
 CXLVIII. De Muliere tenefimo laborante. *ibid.*

CASUS.

- CXLIX. De Muliere de capitis & colli  
 dolore conquerente. *ibid.*  
 CL. De Juvene de inflammatione in  
 pede cum febre laborante. *ib.*  
 CLI. De Puellâ Epilepticâ. 76.  
 CLII. De Juvene febricitante. *ibid.*  
 CLIII. De Ancillâ de doloribus totius cor-  
 poris conquerente. *ibid.*  
 CLIV. De Puellâ de dolore circa præ-  
 cordia &c. conquerente. *ibid.*  
 CLV. De Puellâ Febre quotidiana labo-  
 rante. 77.  
 CLVI. De Aliâ Puellâ febre laborante. *ibid.*  
 CLVII. De Viro qui de lingua siccitate,  
 & faucium ardore &c. con-  
 queritur. *ibid.*  
 CLVIII. De Puellâ de summis oculorum  
 doloribus conquerente. *ibid.*  
 CLIX. De Juvene valdè pituitoso de gra-  
 vi auditu &c. conquesto. 78.  
 CLX. De Juvene hypochondriaco. *ibid.*

## F I N I S.

# REMEDIA SYLVIANA.

1. Pulv. Sternutatorius.
2. Alius Pulv. Sternut.
3. Ad Suffocationem Uterinam.
4. Ad Clavos Pedum.
5. Ad Dysenteriam.
6. Aliud ad eandem.
7. Aliud ad eandem.
8. Scammonii preparatio, ut sine ullo incommodo usurpari possit.
9. Ad Variolar. Eruptionem.
10. In delirio ad somnum conciliandum.
11. Tinctura Cinamomi.
12. Aqua Theriacalis simplex.
13. Electuar. Diaprunum seu Chologogum.
14. Electuar. Hydragogum.
15. Electuar. de Sennâ.
16. Electuar. Phlegmagog.
17. Syrupus de Sennâ.
18. Syrup. de Rhabarb. simpl.
19. Syrup. de Helleb. Nigro.
20. Syrup. de Colocynthide.
21. Elixir. Proprietatis.
22. Balsamus Sulphuris.
23. Decoctum Vulnerarium.
24. Conveniens Remed. in omni hæmorrhagiâ.
25. Ung. ad Scabiem.

## REMEDIA EXTRAORDINARIA SYLVIANA.

1. Ung. Nicotianæ ad Ulcera deplorata præstantissimum.
2. Potio ad accelerand. partum probatissima.
3. Clyster egregius in Epilepsiâ.
4. Empl. ad Clavos pedum.
5. Contra Lumbricos.
6. Ad sedandum dolorem hæmorrhoidum cecarum.
7. Ad Epiphoram.
8. Ad Ardorem in gutture.
9. Ad dolorem in auribus.
10. Decoct. ad Lochia perseverantia ex frusto placente in utero hærentis.
11. Decoctum egregium ad mensium obstructions.
12. Contra Febrës.
13. Vinum Hippocratic.
14. Extract. ad faciend. Vin. Hippocr.
15. Aqua Perfumata.
16. Ad erosionem faucium à Bile.
17. Pulv. Fragrantissimus vestibus aspergend.
18. Pilulæ ad ciendos menses.
19. Potio Antiscorbutica.
20. Contra tussim.
21. Pulv. Sternutatorius.
22. Epithema in capitis dolore ab ardore Febrili.

## LECTOR.

**C**Oronidis loco addere placuit Indicem Menstruarum Plantarum; sive Catalogum singulorum Mensium Annique temporum, in quibus hæc vel illæ Plantæ Medicae; & in quo loco vel solo floreant atque proveniant, Botanices Studiofis, ut speramus & optamus, valdoperè proficuum. Vale.

## MARTIUS.

**I**N hoc Mense florent.] *Acacia Germanica* juxta vias & sepes. *Bellis* in hortis. *Chilidion* in locis humid. *Fragaria* in hort. *Porrum* hoc mense seritur in hort. *Tussilago* in rivis. *Viola purpurea* juxta vias.

## APRILIS.

**I**N hoc Mense florent.] *Acetosella* in loc. nemos. & arenosis. *Bellis* in hortis. *Buxus* hoc mense novella germina profert. *Cochlearia Epatica stellata*, & *Fragaria* in hort. *Fraxinus* in sylvis opacis. *Geranium* in loc. opacis & desertis. *Porrum* hoc in Mense seritur. *Primula veris* in loc. campestribus & sylvis. *Pulmonaria* in dumetis opacis & umbrosis. *Salix* in loc. udis. *Satyrion* in campis, sylv. ac vineis. *Taraxacum* in loc. herbosis. *Teucrium* in loc. asperis, aridis & apricis. *Vinca* in solo fecundo.

## MAJUS.

**I**N hoc Mense florent.] *Abies* perpetuo viret, montibus gaudet saxosis; & hoc mense foliis renovatur. *Acetosa* & *Acetosella* in hort. *Alchimilla* in pascuis. *Anagallis* hoc in mense floret, & per tot. æstat. in hort. vinetis & arvis. *Anagallis aquatica* in rivulis. *Aristoloch.* & *Bellis* in hort. *Branca ursina* in loc. humid. *Buglossa* in loc. campestribus & arvis. *Calcatrippa* in hort. *Caprifolium* in dumetis. *Charesfol.* & *Cochlearia* in hort. *Consolida* in loc. campestribus. *Cyanus* in agris. *Cynosbatus* in dumetis. *Epatica stellata* in hort. *Fraxinus* in sylv. opacis. *Fumaria* in hortis & vineis. *Geranium* in loc. opacis & desertis. *Hispida* in loc. siccis. *Lichen* in loc. udis & umbrosis. *Ligustrum* juxta sepes. *Lilium convallium* in sylvis. *Melium*

*Solis* in hort. *Nummularia* in campis. *Nymphaea* in aquis. *Papaver erraticum* inter segetes. *Plantago* in loc. herbosis. *Pæonia* in hort. *Polygonatum* in sylvis & collibus. *Quinque folium* in loc. arenos. & campestribus. *Rosa* in hort. *Ros Solis* in loc. campestribus & palustribus. *Rosmarinus* in hort. *Salix* in loc. udis. *Sanguisorba* in hortis. *Soponararia* juxta vias & rivulos. *Satyrion* in camp. pratis & sylvis. *Saxifraga* in loc. asperis ac fabulosis. *Scord.* in loc. humid. *Serpillum* in locis fabulos. & apricis. *Sideritis* in loc. apric. montan. & fabulosis. *Symphitum* in pratis & hort. *Thlaspi* in loc. incultis. *Teucrium* in loc. herbos. & asperis. *Tormentilla* in loc. herbos. & arenosis. *Vinca* in solo fecundo.

## JUNIVS.

**I**N hoc Mense florent.] *Acetosa* quæ etiam semine target. *Adiantum* in Gallia. *Narbonensi.* *Ageratum* in hortis. *Agrimonia* juxta sepes. *Alchimilla* in pascuis. *Alkekengi* in vineis. *Alfina* in hortis & vinetis. *Anagallis aquatica* in rivulis. *Aneth.* in loc. arenos. & aprico. *Aquileg.* in hort. & fundo pingui. *Aristoloch.* in hort. *Atriplex* in Sylv. *Basilic.* & *Bethon.* in hortis. *Bugloss.* in loc. campestr. & arvis. *Calamintha* in arvis. *Calcatrippa* in hort. *Cannabis* in agris. *Caprifol.* in dumetis. *Card.* *Bened.* *Cepa* & *Chamaedrys* in hort. *Cichorium* juxta vias. *Cicuta* in pratis. *Filipendula* in solo herboso. *Fraxinella* in rupibus. *Fumaria* in hort. & vineis. *Hedera terrestr.* in loc. arenoso. *Horminum* in solo opimo. *Hyoxyamus* floret incultus. *Lichen* in locis udis & umbrosis. *Ligustrum* juxta sepes. *Lilium* in hortis in pingui solo. *Matricaria*. *Mentha Saracenica* & *Mespilus* in hortis. *Meum* in hortis & locis mont. *Millefolium* juxta vias. *Muscus terrestr.* in sylvis. *Nigella* in hort. *Nymphaea* in aquis. *Ononis* & *Origanum* in campis. *Papaver erraticum* inter segetes. *Plantago* in loc. herbos. *Portulaca* in loc. arenos. & fabulosis. *Py-*

rola in sylv. humid. *Quingefol.* in loc. arenosis. *Rosa*, *Scabarinus*, *Ruta*, & *Sanguisorba* & *Santcula* in hort. *Scabiosa* in arvis. *Scord.* in loc. humid. *Secale* in agris. *Spica* in hort. *Stachas citrina* in loc. arid. & sabulosis. *Veronica* in dumetis.

## JULIUS.

**I**N hoc Mense florent.] *Abfynth.* vulgare passim. *Acerasa* hoc mense semine target. *Adiantum* in Gall. Narbonensi. *Agrimonia* juxta sepes. *Althea* in loc. humid. *Aneth.* in loc. arenof. & apricis. *Angelica*, *Anis.* & *Apium* in hort. *Aquilegia* in hort. pingui in fundo. *Atriplex* in Sylvis. *Basile.* in hort. *Bethonica* in hort. & pratis. *Calamintha* in arvis. *Cardiaca* juxta sepes. *Card.* *Bened.* in hort. *Centaur.* minus in hort. & prat. sabulosis. *Cepa*, & *Chamedrys* & *Chamaepitys* in hort. *Cicuta* in pratis. *Coriandr.* *Cynogloss.* & *Endivia* in hort. *Erysimum* juxta vias. *Eupatorium* in loc. uliginosis. *Filipendula* in solo herbofo. *Fenicul.* in hort. *Hedera* terrestr. in loc. arenosis. *Horminum* in solo opimo. *Hyoscyamus* floret incultus. *Hypericum* floret etiam incultum. *Hyssopus* in hortis. *Lagopus* inter segetes. *Levisticum* in solo umbrofo. *Majorana* in hort. *Marrubium* floret incultum juxta vias. *Melissa*, *Mentha*, & *Mentha Saracenic* in hort. *Meum* in hort. & locis montanis. *Nasturt. aquatic.* in rivulis & paludibus. viretque perpetuo. *Nigella* in hortis. *Olea* in locis fsecis argilosis. *Ononis* & *Origanum* in campis. *Parietaria* juxta sepes. *Pastinaca* sylvestris in loc. campeftribus. *Persicaria* in loc. palustribus. *Peucedanum* in hort. & montibus opacis. *Pimpinella* in solo pingui, sed inculto. *Pulegium* in loc. cult. & incultis. *Salvia*, *Spica*, *Spinachia* & *Thymus* in hortis. *Verbascum* in loc. arenosis. *Verbena* juxta muros & vias, *Vincetoxic.* & *Virga aurea* in sylvis.

## AUGUSTUS.

**I**N hoc Mense florent.] *Abfynth.* in hort. *Adiantum* in Gallia Narbonensi. *Althea* in loc. humidis. *Amaranthus* in hort. *Aneth.* in loc. arenoso & aprico. *Atriplex* in sylvis. *Centaur. minus* in hort. & pratis arenosis. *Chamaepitys* & *Endivia* in hortis. *Erysimum* juxta vias. *Eupatorium* in loc. uliginosis. *Fenicul.* *Hyssop.* & *Imperatoria* in hort. *Lapulus* in solo pingui. *Majorana* in hort. *Milium* in solo arenoso humid. *Morus* fructum fert matur in hort. *Nasturt. aquatic.* in rivul. & paludibus viretque perpetuo. *Pastinaca* Sylvestr. in loc. campeftrib. *Persicaria* in locis palustribus. *Pimpinella* in solo pingui, sed inculto. *Pulegium* in loc. cult. & incultis. *Salvia* in hort. *Sambuci* bacæ hoc

in mense maturescunt. *Spinachia* in hort. *Verbena* juxta muros & vias. *Vincetoxic.* & *Virga aurea* in sylvis.

## SEPTEMBER.

**A**Lhekengi fert fructus maturos in vineis.

## OCTOBER.

**A**Cacia Germanica fert fructus juxta vias. *Mespilus* fert fructus in hortis.

## VER.

**I**N hoc tempore florent.] *Acacia* German. *Chelidonium* majus juxta sepes. *Chenit.* *Cornus*, *Epatica nobilis* & *Aris nostras* in hort. *Napus* in agris. *Pastifitis* in loc. humid.

## ÆSTAS.

**Æ**Stivo tempore florent.] *Adiantum* in Gallia Narbonensi. *Anagallis* in hort. vinei. & arvis. *Agrimonia* juxta sepes. *Bellis*, *Borrago*, *Calendula* & *Cariophyllus* hortens; in hort. *Chelidonium* majus juxta sepes. *Cuscuta* floret adnascens passim herbis & fruticibus potissimum artice, lino & lupulo. *Eupragia* in loc. sabulosis. *Filix* in sylv. *Galega* in hort. *Genista* in loco arenoso & aprico. *Jacea* in hort. & agris. *Jasminum* in hort. *Eduea* in solo pingui. *Lapathum* in loc. incultis. *Lotus hortens.* in hort. & pratis. *Malva* floret passim inculta. *Melilotus* in locis saxosis. *Mercurialis* in vineis. *Nasturt. hortens.* vere sentitur æstate autem floret in hort. *Nepeta*, *Papaver sativum* & *Petru-selinum* in hort. *Polygonum* in loc. incultis. *Prunella* in loc. campeftrib. & herbosis. *Primaria* in pratis & arvis. *Ribes* hoc tempore maturescunt. *Rubus idæus* in æstatis principio floret, in ejus autem fine fructus maturefcit. *Sambucus* floret juxta sepes. *Satureja* in hort. *Succisa* in loc. campeftrib. pratis & juxta arva. *Vermicularia* in muris, locisque arenosis.

## AUTUMNUS.

**A**Cacia German. fert fructus juxta sepes. *Anisi semen* hoc tempore maturefcit. *Olea* maturos hoc tempore dat fructus. *Sorbus* maturos hoc tempore fert fructus.

**U**T autem Benev. Lector rite scire  
etiam possit, in quo vel quibus  
mensibus hæc vel illa Planta floreat;  
Plantas omnes, quarum in præcedenti  
Catalogo fit mentio, juxta ordinem Al-  
phabeticum positas huc quoque ponere  
non displicuit.

A.

**A**Bies in Majo foliis renovatur, &c.  
*Abfynth.* vulgare floret Julio & Augusto.  
*Acacia* Germanica floret Mens. Martio.  
*Acetosa* flor. Majo.  
*Acetosella* flor. Aprili & princip. Maji.  
*Adiantum* æstate flor.  
*Ageratum* flor. Junio.  
*Agrimonia* ferè totà fl. æstate.  
*Alchimilla* fl. Majo & Junio.  
*Alkekengi* fl. Junio, fructus fert ante Autumn.  
*Althea* fl. Jul. & Aug.  
*Amaranthus* fl. Augusti.  
*Anagallis* fl. Majo, & hinc per tot æstat.  
*Anagallis aquatica* fl. Majo & Junio.  
*Anethum* fl. Jun. Jul. & Aug.  
*Angelica* fl. Julio.  
*Anysum* feritur mense Mart. flor. Jul. & sem.  
maturefcit Autumnio.  
*Antirrhinum* fl. Majo & Junio.  
*Apium* fl. Julio.  
*Aquilegia* fl. Junio & Julio.  
*Aristolochia* fl. Majo & Junio.  
*Arnica* fl per tot. ferè æstatem.  
*Arum* folia dat mense Martio; flores autem Jun.  
*Atriplex* fl. Junio, Julio, & Augusto.

B.

**B***Ardana* fl. Jun. & Julio.  
*Basilicum* fl. Jun. & Julio.  
*Bellis* fl. per. integram æstatem, præcipue autem  
verno tempore.  
*Betula* julos prodit Martio, quibus Aprili folia  
succedunt.  
*Barrago* fl. Jun. Jul. & Aug. usque in Septembr.  
*Branca Ursina* fl. Maj.  
*Buglossa* fl. Majo & Jun.  
*Bursa pastor.* fl. Aprili.  
*Buxus* viret perpetuo, Aprili tamen novella ger-  
mina profert.

C.

**C***Alamintia* fl. Jun. & Jul.  
*Calcatrippa* fl. Majo & Jun.  
*Caltha* florere incipit Majo, floretque per integ.  
æstatem.  
*Cannabis* fl. Junio.  
*Caprifolium* fl. Majo ac Junio.  
*Cardiaca* fl. Julio.  
*Card. bened.* fl. Jun. & Julio.  
*Cariophyllus hortens.* fl. Jun. atque in multam æst.  
*Centaur. min.* fl. Jul. & Aug.  
*Cepa* fl. Jun. & Jul.  
*Chæresolium* fl. Maj.  
*Chamadrys* fl. Jun. & Jul.  
*Chamæpytis* fl. Jul & Aug.  
*Chelidon. majus.* fl. primo statim vere, & per mule:  
æstatem.  
*Chelidon. minus* fl. Martio.  
*Cheiri* fl. April. Maj. & ultra.  
*Cichorium* fl. Jun.  
*Cicuta* fl. Jun. & Jul.  
*Cochlearia* fl. April & Majo.  
*Consolida* fl. Majo.  
*Coriandrum* fl. Jul.  
*Cornus* florere incipit vere.  
*Cuscuta* fl. Jun. Jul. & Aug.  
*Cyanus* fl. Majo.  
*Cynoglossum* fl. Julio.  
*Cynosbatus* fl. Majo.

E.

**E***Ndivia* fl. Jul. & Aug.  
*Epatica nobilis* florere incipit veris initio.  
*Epatica stellata* fl. Aprili & Majo.  
*Erysimum* fl. Jul. & Augusto.  
*Eupatorium* fl. Jul. & Aug.  
*Euphrasia* fl. Jun. Jul. & Aug.

F.

**F***Abaria* fl. Julio & Aug.  
*Filipendula* fl. Jun. & Jul.  
*Fanicul* fl. Jul. & Aug.  
*Fragaria* fl. Mart. & Aprili.  
*Fraxin.* fl. April & Maj.  
*Fraxinella* fl. Junio.  
*Fumaria* fl. Majo & Junio.  
*Fumaria bulbosa.* fl. Aprili.

G.

**G***Alega* fl. æstate.  
*Gallium* fl. Majo & hinc totà æstate.



*Geranium fl. potissimum April. & Majo.*  
*Glycyrrhiza fl. Julio.*

H.

**H**edera terrestr. fl. Aprili potissimum;  
Hedera arborea fl. Autumno, & baccas fert  
hyeme.  
Herniaria fl. Jun. & Julio.  
Hispidula fl. Majo & Junio.  
Horminum fl. Jun. & Julio.  
Hyoisyanus fl. Jun. & Julio.  
Hypericum fl. Julio.  
Hysopus fl. Jul. & Aug.

I.

**J**acca fl. April. Majo ac tota ferè æstate.  
Juglandis juli & folia erumpunt Martio, nuces  
autem maturescunt Autumno.

L.

**L**actuca fl. æstivo tempore.  
Lagopus viget Julio potissimum.  
Lapathum fl. Majo & Julio.  
Larix flor. Vere.  
Levisticum fl. in primis mense Julio.  
Lichen fl. Majo & Junio.  
Ligustrum fl. Majo & Jun.  
Lilium fl. Junio.  
Lilium Convallium fl. initio Maji.  
Lotus fl. Jun. Jul. & Augusto ejusdem anni, quo  
fata est.  
Lupulus fl. Aug.

**M**ajorana fl. Jul. & Aug.

Malva fl. Majo & seqq. mens.  
Marrubium fl. Iul.  
Matricaria fl. Iun. & Iul.  
Melilotus fl. integrè æstate.  
Melissa fl. Iulio.  
Mentha fl. Iulio.  
Mentha Saracenicæ fl. Iun. & Iulio.  
Mercurialis fl. per integræ æstat.  
Mespilus fl. Iunio, fructus autem fert Octobri.  
Meum fl. Iun. & Iul.  
Miliium fl. Aug.  
Miliium Solis fl. Majo.  
Millefolium fl. Iur.  
Morus dat fruct. maturum Aug.

N.

**N**apus fl. à Vere in æstatem.  
Nasturt. aquat. fl. Iul. & Aug.  
Nasturt. hortensè feritur vere; & fl. æstate.  
Nepeta fl. Iun. Iul. & Aug.  
Nigella fl. Iun. & Iul.  
Nummularia fl. Majo.  
Nymphaea fl. Iun. & Iul.

P.

**P**apaver sativum fl. mediâ æstate.  
Papaver erraticum fl. Majo & Iun.  
Parietaria fl. Iul.  
Paris herba fl. April. & Majo.  
Pastinaca sylvestr. fl. Julio & Aug.  
Perfoliata fl. Iunio.  
Persicaria fl. Iul. & Aug.  
Petasites fl. veris initio.  
Petroselinum fl. Iun. & Iul. & Aug.  
Peucedanum fl. Iulio.  
Pimpinella fl. Iul. & Aug.  
Plantago fl. Majo & Iunio.  
Paeonia fl. Majo.  
Polygonum fl. integrè ferè æstate.  
Polygonatum fl. Majo.  
Porrum feritur Martio & Aprili.  
Portulaca fl. Iunio.  
Primula veris fl. Aprili.  
Prunella fl. Iunio & hinc ferè integræ æstate.  
Ptarmica fl. Maj. Iun. & Iulio.  
Pulegium fl. Iulio & Aug.  
Pulmonaria fl. Aprili.  
Pyræla fl. Iunio.

**Q**uinquefolium fl. Majo & Iunio.

R.

**R**ibes maturescunt circa festum S. Iohannis.  
Rosa fl. Majo & Iun.  
Ros Solis fl. Majo.  
Ros Marinus fl. Majo & Iunio.  
Rubus fl. æstatis initio, & maturescit in fine ejus.  
Rubus idæus fl. æstatis initio, & maturescit Au-  
gusto.  
Ruscus primo vere turiones promit, & autumno  
semen.  
Ruta fl. Iunio.  
Ruta muraria vivax est toto anno, æstate tamen  
amplius viret, flore & semine caret.

**S** *Abina* viret perpetuò.  
*Salix* fl. Majo & Aprili.  
*Salvia* fl. Iul. & Aug.  
*Sambucus* fl. Majo, Iun. & Iulio, bacca autem  
 maturefcunt Augufto.  
*Sanguisorba* fl. Majo & Iunio.  
*Saponaria* fl. Majo.  
*Satureja* fl. integra ferè æftate.  
*Satyrum* fl. April. & Majo.  
*Saxifraga* fl. Majo.  
*Scabiofa* fl. Iunio.  
*Scolopendria vulgaris* viret per tot. ferè annum.  
*Serpillum* flore menfe Majo protrudit, integra-  
 que æftate fovet.  
*Sideritis* fl. Majo.  
*Solanum* fl. æftate integrâ.  
*Sorbus maturor* fert fructus Autumno.  
*Spica* fl. Iunio ac Iulio.  
*Spinachia* floret ut plurimum Iulio & Aug.  
*Stæchas citrina* fl. Iunio.  
*Succifa* fl. Iul. Aug. & Sept.  
*Symphitum* fl. Majo ac Iunio.

## T.

**T** *Araxacum* fl. Aprili & Majo.  
*Teucrium* fl. Aprili.

*Thlaffi* fl. Majo & maturefcit Iunio.  
*Thymus* fl. Iunio.  
*Trimentilla* florere incipit Majo.  
*Trichemanes* virefcit perpetuò, eftque sterile.  
*Tuffilago* fl. Martio.

## V.

**V** *Aleriana* fl. Majo, Iunio & Iul.  
*Verbafcum* flor. Iulio.  
*Verbena* fl. Iulio & Aug.  
*Vermicularis* flor. maximè æftate integrâ.  
*Veronica* fl. Iunio.  
*Viflorialis* flor. cum aliis aliis speciebus.  
*Vinca* fl. Aprili, Majo, viretque femper.  
*Vincetoxicum* fl. Iul. & Aug.  
*Viola purpurea* fl. circiter finem Martii, ac in-  
 tium Aprilis.  
*Virga aurea* fl. Iul. & Aug.  
*Vitis* fl. Iunio.

## U.

**U** *Lmaria* fl. Iun. & Iul.  
*Urtica* omnes vigent æftate.

F I N I S.

